

Archived version

This version was current for the period set out in the footer below.

Last amendment included: M.R. 196/2013

Version archivée

La présente version était à jour pendant la période indiquée en bas de page.

Dernière modification intégrée : R.M. 196/2013

THE PRESCRIPTION DRUGS COST ASSISTANCE
ACT
(C.C.S.M. c. P115)

Specified Drugs Regulation

Regulation 6/95
Registered January 23, 1995

Definition of benefit year

1 In this regulation, "**benefit year**" means the year beginning on April 1 and ending on March 31 of the next year.

M.R. 61/96

Specified drugs

2 The drugs or other items set out in Schedule A are specified drugs.

M.R. 61/96; 51/2012

Monitored drugs

2.1 The specified drugs or classes of specified drugs set out in Schedule B are monitored drugs.

M.R. 82/2013

LOI SUR L'AIDE À L'ACHAT DE MÉDICAMENTS
SUR ORDONNANCE
(c. P115 de la C.P.L.M.)

Règlement sur les médicaments couverts

Règlement 6/95
Date d'enregistrement : le 23 janvier 1995

Définition

1 Pour l'application du présent règlement, « **année d'indemnisation** » s'entend d'une année débutant le 1^{er} avril et se terminant le 31 mars de l'année suivante.

R.M. 61/96

Médicaments couverts

2 Les médicaments et les autres articles indiqués à l'annexe A sont des médicaments couverts.

R.M. 61/96; 51/2012

Médicaments contrôlés

2.1 Les médicaments couverts qui sont indiqués nommément ou par catégorie à l'annexe B sont des médicaments contrôlés.

R.M. 82/2013

Application for benefits

3(1) An eligible person may apply for benefits by filing an application with the minister. An application must be in a form acceptable to the minister and filed

(a) annually, in which case the application must be filed before March 31 of the benefit year in which the benefits are being claimed; or

(b) on a one-time basis, in which case the application must be filed before March 31 of the first benefit year in which benefits are being claimed under such an application.

3(2) An eligible person who has made an application under subsection (1) must make a separate application for benefits in respect of the purchase of a specified drug not entered on the electronic data storage system referred to in section 9 of the *Prescription Drugs Payment of Benefits Regulation*, Manitoba Regulation 60/96. This application must be filed within six months after the date of purchase.

3(3) [Repealed] M.R. 61/96

M.R. 61/96; 123/2001

Receipts

4(1) An application for benefits referred to in subsection 3(2) shall be accompanied by receipts in a form acceptable to the minister.

4(2) If an eligible person,

(a) is unable to produce a receipt as required under subsection (1) to verify an item of cost of a specified drug purchased in Manitoba because the receipt has been lost or destroyed or is unavailable for a reason satisfactory to the minister; or

(b) applies for benefits in respect of specified drugs purchased in a province or territory of Canada outside Manitoba;

the person shall file with the application such receipts, records, papers or other documents as the minister may require to verify each item of cost of specified drugs and that the purchaser is an eligible person.

M.R. 61/96; 123/2001

Demande d'indemnisation

3(1) La personne admissible peut présenter au ministre une demande d'indemnisation. La demande est en la forme que le ministre juge acceptable et est déposée :

a) dans le cas d'une demande annuelle, avant le 31 mars de l'année d'indemnisation pour laquelle elle est présentée;

b) dans le cas d'une demande unique, avant le 31 mars de la première année d'indemnisation pour laquelle elle est présentée.

3(2) La personne admissible qui a présenté une demande en vertu du paragraphe (1) est tenue de déposer une demande d'indemnisation distincte pour tout achat de médicaments couverts qui n'est pas entré dans le système de stockage électronique mentionné à l'article 9 du *Règlement sur le paiement de prestations pour les médicaments sur ordonnance*, R.M. 60/96. Cette demande distincte doit être déposée dans les six mois qui suivent l'achat des médicaments.

3(3) [Abrogé] R.M. 61/96

R.M. 61/96; 123/2001

Reçus

4(1) Les demandes d'indemnisation visées au paragraphe 3(2) doivent être accompagnées de reçus que le ministre juge acceptables.

4(2) Dans les cas indiqués ci-après, la personne admissible joint à sa demande les reçus, écritures, pièces ou autres documents que le ministre peut exiger afin de vérifier l'authenticité de chaque achat de médicaments couverts et de confirmer que l'acquéreur est une personne admissible :

a) les reçus exigés en vertu du paragraphe (1) qui attestent l'authenticité des achats au Manitoba de médicaments couverts ont été perdus, détruits ou ne sont pas disponibles pour une raison que le ministre estime satisfaisante;

b) la demande d'indemnisation est présentée à l'égard de médicaments couverts achetés dans une province ou un territoire du Canada autre que le Manitoba.

R.M. 61/96; 46/99; 123/2001

Coming into force

5 This regulation comes into force on February 1, 1995.

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur le 1^{er} février 1995.

Le ministre de la Santé,

January 18, 1995

James C. McCrae
Minister of Health

Le 18 janvier 1995

James C. McCrae

SCHEDULE A

ANNEXE A

SPECIFIED DRUGS

MÉDICAMENTS COUVERTS

Effective April 16, 2014

Entre en vigueur le 16 avril 2014

PART 1

PARTIE 1

Any one of the following:

- ABILIFY – 2, 5, 10, 15, 20 AND 30 MG TABLETS
- ACCEL-AMLODIPINE – 5 AND 10 MG TABLETS
- ACCU-CHEK AVIVA TEST STRIPS – TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR
- ACCU-CHEK COMPACT TEST STRIPS – TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR
- ACCU-CHEK EASY BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS – TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR
- ACCU-CHEK FASTCLIX LANCETS
- ACCU-CHEK MOBILE CASSETTE TO A MAXIMUM OF 4,000 TESTS PER BENEFIT YEAR
- ACCU-CHEK MULTICLIX LANCETS
- ACCUPRIL – 5, 10, 20 AND 40 MG TABLETS
- ACCURETIC – 10/12.5 AND 20/12.5 MG TABLETS
- ACCURETIC – 20 MG/25 MG TABLETS
- ACCUTANE – 10 AND 40 MG TABLETS
- ACCUTREND BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS – TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR
- ACEBUTOLOL (SANIS) – 100, 200 AND 400 MG TABLETS
- ACETAZOLAM – 250 MG TABLETS
- ACETAZOLAMIDE (AA PHARMA) – 250 MG TABLETS
- ACETEST
- ACETOXYL – 10 AND 20% GEL
- ACULAR – 0.5% OPHTHALMIC SOLUTION
- ACYCLOVIR (SANIS) – 200, 400 AND 800 MG TABLETS
- ADALAT XL – 20, 30 AND 60 MG EXTENDED RELEASE TABLETS
- ADVAIR 125 – 125/25 MCG METERED DOSE INHALER
- ADVAIR 250 – 250/25 MCG METERED DOSE INHALER

Les médicaments suivants :

- ABILIFY – 2, 5, 10, 15, 20 ET 30 MG, COMPRIMÉS
- ACCEL-AMLODIPINE – 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- ACCU-CHEK AVIVA, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE – MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- ACCU-CHEK COMPACT, BANDELETTES – MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- ACCU-CHEK EASY, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE – MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- ACCU-CHEK FASTCLIX, LANCETTES
- ACCU-CHEK MOBILE, CASSETTE – MAXIMUM DE 4 000 TESTS PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- ACCU-CHEK MULTICLIX LANCETTES
- ACCUPRIL – 5, 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- ACCURETIC – 10/12,5 ET 20/12,5 MG, COMPRIMÉS
- ACCURETIC – 20 MG/25 MG, COMPRIMÉS
- ACCUTANE – 10 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- ACCUTREND, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE – MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- ACEBUTOLOL (SANIS) – 100, 200 ET 400 MG, COMPRIMÉS
- ACÉTAZOLAM – 250 MG, COMPRIMÉS
- ACETAZOLAMIDE (AA PHARMA) – 250 MG, COMPRIMÉS
- ACETEST
- ACÉTOXYL, GEL DE 10 ET 20 %
- ACULAR – 0,5 %, SOLUTION OPHTALMIQUE
- ACYCLOVIR (SANIS) – 200, 400 ET 800 MG, COMPRIMÉS
- ADALAT XL – 20, 30 ET MG, COMPRIMÉS À LIBÉRATION PROLONGÉE
- ADVAIR 125 – 125/25 MCG, AÉROSOL DOSEUR
- ADVAIR 250 – 250/25 MCG, AÉROSOL DOSEUR

- ADVAIR DISKUS - 50/100, 50/250 AND 50/500 MCG POWDER FOR INHALATION
- ADVANTAGE BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS - TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR
- ADVANTAGE COMFORT BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS - TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR
- AEROCHAMBER
- AEROCHAMBER WITH MASK
- AEROSAL CLOUD ENHANCER
- AGGRENOL - 200 MG/25 MG CAPSULES
- A-HYDROCORT - 100, 250, 500 AND 1000 MG/VIAL INJECTION
- AIROMIR - 100 MCG/DOSE METERED DOSE INHALER TO A MAXIMUM OF 4,400 DOSES PER BENEFIT YEAR
- AJ-VANCOMYCIN - 500 MG AND 1 G INJECTION
- ALDACTAZIDE
- ALDACTONE - 25 AND 100 MG TABLETS
- ALESSE - 21 AND 28 TABLETS
- ALKERAN - 2 MG TABLETS
- ALKERAN - 50 MG INJECTION
- ALLERGY VACCINES
- ALLERJECT - 0.3 MG/0.3 ML AND 0.15 MG/0.15 ML INJECTION
- ALLOPRIN - 100, 200 AND 300 MG TABLETS
- ALPHAGAN - OPHTHALMIC SOLUTION 0.2%
- ALPRAZOLAM (SANIS) - 0.25 AND 0.5 MG TABLETS
- ALTACE - 1.25, 2.5, 5, 10 AND 15 MG TABLETS
- ALUPENT - 10 MG/ML SYRUP
- ALUPENT INHALATION AEROSOL TO A MAXIMUM OF 4,500 DOSES PER BENEFIT YEAR
- ALUPENT INHALATION SOLUTION
- ALVESCO - 100 AND 200 MCG INHALER - TO A MAXIMUM OF 4,400 DOSES PER BENEFIT YEAR
- ALYSENA 21
- ALYSENA 28
- AMCORT - 0.1% TOPICAL CREAM
- AMIODARONE (SANIS) - 200 MG TABLETS
- AMLODIPINE-ODAN - 5 AND 10 MG TABLETS
- AMLODIPINE (RANBAXY) - 5 AND 10 MG TABLETS
- AMLODIPINE (SANIS) - 5 AND 10 MG TABLETS
- AMLODIPINE (SIVEM) - 5 AND 10 MG TABLETS
- AMOXICILLIN (SANIS) - 125 MG/5 ML AND 250 MG/5 ML SUGAR FREE ORAL SUSPENSION
- ADVAIR DISKUS - 50/100, 50/250 ET 50/500 MCG, POUVRE POUR INHALATION
- ADVANTAGE, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE - MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- ADVANTAGE COMFORT, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE - MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- AÉROCHAMBRE
- AÉROCHAMBRE AVEC MASQUE
- FACILITANT DE NUAGE AÉROSOL
- AGGRENOL - 200 MG/25 MG, CAPSULES
- A-HYDROCORT - 100, 250, 500 ET 1 000 MG/AMPOULE, INJECTION
- AIROMIR - 100 MCG/DOSE, AÉROSOL DOSEUR, MAXIMUM DE 4 400 DOSES PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- AJ-VANCOMYCIN - 500 MG ET 1 G, INJECTION
- ALDACTAZIDE
- ALDACTONE - 25 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- ALESSE - 21 ET 28, COMPRIMÉS
- ALKERAN - 2 MG, COMPRIMÉS
- ALKERAN - 50 MG, INJECTION
- VACCINS ANTIALLERGIQUES
- ALLERJECT - 0,3 MG/0,3 ML ET 0,15 MG/0,15 ML, INJECTION
- ALLOPRIN - 100, 200 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- ALPHAGAN - 0,2 %, SOLUTION OPHTHALMIQUE
- ALPRAZOLAM (SANIS) - 0,25 ET 0,5 MG, COMPRIMÉS
- ALTACE - 1,25, 2,5, 5, 10 ET 15 MG, COMPRIMÉS
- ALUPENT - 10 MG/ML, SIROP
- ALUPENT, AÉROSOL POUR INHALATION, MAXIMUM DE 4 500 DOSES PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- ALUPENT, SOLUTION POUR INHALATION
- ALVESCO - 100 ET 200 MCG, AÉROSOL, MAXIMUM DE 4 400 DOSES PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- ALYSENA 21
- ALYSENA 28
- AMCORT - 0,1 %, CRÈME TOPIQUE
- AMIODARONE (SANIS) - 200 MG, COMPRIMÉS
- AMLODIPINE-ODAN - 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- AMLODIPINE (RANBAXY) - 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- AMLODIPINE (SANIS) - 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- AMLODIPINE (SIVEM) - 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- AMOXICILLIN (SANIS) - 125 MG/5 ML ET 250 MG/5 ML, SUSPENSION ORALE SANS SUCRE

- AMOXICILLIN (SANIS) – 250 AND 500 MG TABLETS, AND 125 MG/5 ML AND 250 MG/5 ML ORAL SUSPENSION
- AMOXICILLIN (SIVEM) – 250 AND 500 MG CAPSULES AND 250 MG/5 ML ORAL SUSPENSION
- AMSA P-D
- ANAFRANIL – 10, 25 AND 50 MG TABLETS
- ANANDRON – 50 MG TABLETS
- ANCEF – 1 G/VIAL USP POWDER FOR INJECTION
- ANDRIOL CAPSULES
- ANDROCUR – 50 MG TABLETS
- ANDROCUR DEPOT – 100 MG INJECTION
- ANSAID – 50 AND 100 MG TABLETS
- ANZEMET – 50 AND 100 MG TABLETS
- APIDRA – 100 IU/ML INJECTION
- APO-ACEBUTOLOL – 100, 200 AND 400 MG TABLETS
- APO-ACYCLOVIR – 200, 400 AND 800 MG TABLETS
- APO-ALFUZOSIN – 10 MG TABLETS
- APO-ALLOPURINOL – 100, 200 AND 300 MG TABLETS
- APO-ALPRAZ – 0.25, 0.5, 1 AND 2 MG TABLETS
- APO-AMILZIDE
- APO-AMIODARONE – 200 MG TABLETS
- APO-AMITRIPTYLINE – 10, 25, 50 AND 75 MG TABLETS
- APO-AMLODIPINE – 5 AND 10 MG TABLETS
- APO-AMOXI – 125 AND 250 MG SUGAR FREE ORAL LIQUID
- APO-AMOXI CAPSULES AND SUSPENSION
- APO-ANASTROZOLE – 1 MG TABLETS
- APO-ATENIDONE – 50/25 AND 100/25 MG TABLETS
- APO-ATENOL – 50 AND 100 MG TABLETS
- APO-ATORVASTATIN – 10, 20, 40 AND 80 MG TABLETS
- APO-AZATHIOPRINE – 50 MG TABLETS
- APO-BACLOFEN – 10 AND 20 MG TABLETS
- APO-BECLOMETHASONE – 0.05% NASAL SPRAY
- APO-BICALUTAMIDE – 50 MG TABLETS
- APO-BISOPROLOL – 5 AND 10 MG TABLETS
- APO-BRIMONIDINE – 0.2% OPHTHALMIC SOLUTION
- APO-BROMAZEPAM – 1.5, 3 AND 6 MG TABLETS
- APO-BUSPIRONE TABLETS
- APO-CANDESARTAN – 4, 8, 16 AND 32 MG TABLETS
- APO-CANDESARTAN/HCTZ – 16/12.5 MG TABLETS
- APO-CAPTO – 6.5, 12.5, 25, 50 AND 100 MG TABLETS
- AMOXICILLIN (SANIS) – 250 ET 500 MG, COMPRIMÉS ET 125 MG/5 ML ET 250 MG/5 ML, SUSPENSION ORALE
- AMOXICILLIN (SIVEM) – 250 ET 500 MG, CAPSULES ET 250 MG/5 ML, SUSPENSION ORALE
- AMSA P-D
- ANAFRANIL – 10, 25 ET 50 MG, COMPRIMÉS
- ANANDRON – 50 MG, COMPRIMÉS
- ANCEF – 1 G/AMPOULE USP, POUDRE INJECTABLE
- ANDRIOL, CAPSULES
- ANDROCUR – 50 MG, COMPRIMÉS
- ANDROCUR DEPOT – 100 MG, INJECTION
- ANSAID – 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- ANZEMET – 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- APIDRA – 100 U/ML, INJECTION
- APO-ACEBUTOLOL – 100, 200 ET 400 MG, COMPRIMÉS
- APO-ACYCLOVIR – 200, 400 ET 800 MG, COMPRIMÉS
- APO-ALFUZOSIN – 10 MG, COMPRIMÉS
- APO-ALLOPURINOL – 100, 200 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- APO-ALPRAZ – 0,25, 0,5, 1 et 2 MG, COMPRIMÉS
- APO-AMILZIDE
- APO-AMIODARONE – 200 MG, COMPRIMÉS
- APO-AMITRIPTYLINE – 10, 25, 50 ET 75 MG, COMPRIMÉS
- APO-AMLODIPINE – 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- APO-AMOXI – 125 ET 250 MG, LIQUIDE ORAL SANS SUCRE
- APO-AMOXI, CAPSULES ET SUSPENSION
- APO-ANASTROZOLE – 1 MG, COMPRIMÉS
- APO-ATENIDONE – 50/25 MG ET 100/25 MG, COMPRIMÉS
- APO-ATENOL – 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- APO-ATORVASTATIN – 10, 20, 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- APO-AZATHIOPRINE – 50 MG, COMPRIMÉS
- APO-BACLOFEN – 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- APO-BECLOMETHASONE – 0,05 %, VAPORISATEUR NASAL
- APO-BICALUTAMIDE – 50 MG, COMPRIMÉS
- APO-BISOPROLOL – 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- APO-BRIMONIDINE – 0,2 %, SOLUTION OPHTHALMIQUE
- APO-BROMAZEPAM – 1,5, 3 ET 6 MG, COMPRIMÉS
- APO-BUSPIRONE, COMPRIMÉS
- APO-CANDESARTAN – 4, 8, 16 ET 32 MG, COMPRIMÉS
- APO-CANDESARTAN/HCTZ – 16/12,5 MG, COMPRIMÉS
- APO-CAPTO – 6,5, 12,5, 25, 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS

- APO-CARVEDILOL - 3,125, 6,25, 12,5 AND 25 MG TABLETS
- APO-CEFADROXIL - 500 MG CAPSULES
- APO-CEPHALEX - 250 AND 500 MG TABLETS
- APO-CHLORPROPAMIDE - 100 AND 250 MG TABLETS
- APO-CILAZAPRIL - 1, 2,5 AND 5 MG TABLETS
- APO-CILAZAPRIL/HCTZ - 5 MG/12,5 MG TABLETS
- APO-CIMETIDINE - 300, 400, 600 AND 800 MG TABLETS
- APO-CIMETIDINE - 300 MG/5 ML ORAL SOLUTION
- APO-CITALOPRAM - 20 AND 40 MG TABLETS
- APO-CLINDAMYCIN - 150 AND 300 MG CAPSULES
- APO-CLOBAZAM - 10 MG TABLETS
- APO-CLOMIPRAMINE - 10, 25 AND 50 MG TABLETS
- APO-CLONAZEPAM - 0,5 AND 2 MG TABLETS
- APO-CLOPIDOGREL - 75 MG TABLETS
- APO-CLOZAPINE - 25 AND 100 MG TABLETS
- APO-DEXAMETHASONE - 0,5 AND 4 MG TABLETS
- APO-DIAZEPAM
- APO-DICLO
- APO-DICLO SR
- APO-DILTIAZ
- APO-DILTIAZ CD CAPSULES
- APO-DILTIAZ TZ - 120, 180, 240, 300 AND 360 MG TABLETS
- APO-DIPYRIDAMOLE-FC - 25, 50 AND 75 MG TABLETS
- APO-DIVALPROEX - 125 MG, 250 MG, 500 MG - ENTERIC COATED TABLETS
- APO-DOMPERIDONE
- APO-DORZO-TIMOP - 20 MG/5 MG/ML OPHTHALMIC DROPS
- APO-DOXAZOSIN - 1 MG, 2 MG AND 4 MG TABLETS
- APO-DOXEPIN - 10, 25, 50, 75 AND 100 MG TABLETS
- APO-DOXY TABLETS AND CAPSULES
- APO-ENALAPRIL - 2,5, 5, 10 AND 20 MG TABLETS
- APO-ENALAPRIL/HCTZ - 5/12,5 AND 10/25 MG TABLETS
- APO-ERYTHRO-E-C
- APO-FAMCICLOVIR - 125, 250 AND 500 MG TABLETS
- APO-FAMOTIDINE
- APO-FENOFIBRATE - 100 MG CAPSULES
- APO-CARVEDILOL - 3,125, 6,25, 12,5 ET 25 MG, COMPRIMÉS
- APO-CEFADROXIL - 500 MG, CAPSULES
- APO-CEPHALEX - 250 ET 500 MG, COMPRIMÉS
- APO-CHLORPROPAMIDE - 100 ET 250 MG, COMPRIMÉS
- APO-CILAZAPRIL - 1, 2,5 ET 5 MG, COMPRIMÉS
- APO-CILAZAPRIL/HCTZ - 5 MG/12,5 MG, COMPRIMÉS
- APO-CIMETIDINE - 300, 400, 600 ET 800 MG, COMPRIMÉS
- APO-CIMETIDINE - 300 MG/5 ML, SOLUTION ORALE
- APO-CITALOPRAM - 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- APO-CLINDAMYCIN - 150 ET 300 MG, CAPSULES
- APO-CLOBAZAM - 10 MG, COMPRIMÉS
- APO-CLOMIPRAMINE - 10, 25 ET 50 MG, COMPRIMÉS
- APO-CLONAZEPAM - 0,5 ET 2 MG, COMPRIMÉS
- APO-CLOPIDOGREL - 75 MG, COMPRIMÉS
- APO-CLOZAPINE - 25 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- APO-DEXAMETHASONE - 0,5 ET 4 MG, COMPRIMÉS
- APO-DIAZEPAM
- APO-DICLO
- APO-DICLO SR
- APO-DILTIAZ
- APO-DILTIAZ CD, CAPSULES
- APO-DILTIAZ TZ - 120, 180, 240, 300 ET 360 MG, COMPRIMÉS
- APO-DIPYRIDAMOLE-FC - 25, 50 ET 75 MG, COMPRIMÉS
- APO-DIVALPROEX - 125 MG, 250 MG, 500 MG - CAPSULES À ENROBAGE ENTÉROSOLUBLE
- APO-DOMPERIDONE
- APO-DORZO-TIMOP - 20 MG/5 MG/ML, GOUTTES OPHTALMIQUES
- APO-DOXAZOSIN - 1 MG, 2 MG ET 4 MG, COMPRIMÉS
- APO-DOXEPIN - 10, 25, 50, 75 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- APO-DOXY, COMPRIMÉS ET CAPSULES
- APO-ENALAPRIL - 2,5, 5,10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- APO-ENALAPRIL/HCTZ - 5/12,5 ET 10/25 MG, COMPRIMÉS
- APO-ERYTHRO-E-C
- APO-FAMCICLOVIR - 125, 250 ET 500 MG, COMPRIMÉS
- APO-FAMOTIDINE
- APO-FENOFIBRATE - 100 MG, CAPSULES

- APO-FENO-MICRO - 67 AND 200 MG - CAPSULES
- APO-FENO SUPER - 100 AND 160 MG TABLETS
- APO-FLUNISOLIDE - 0.025% NASAL SPRAY
- APO-FLUOXETINE
- APO-FLUOXETINE - 20 MG/5 ML SYRUP
- APO-FLUPHENAZINE - 5 MG TABLETS
- APO-FLURAZEPAM
- APO-FLURBIPROFEN
- APO-FLUTAMIDE - 250 MG TABLETS
- APO-FLUTICASONE - 50 MCG NASAL SPRAY
- APO-FLUVOXAMINE - 50 AND 100 MG TABLETS
- APO-FOSINOPRIL - 10 AND 20 MG TABLETS
- APO-FUROSEMIDE
- APO-GABAPENTIN - 100, 300, 400 AND 600 MG TABLETS
- APO-GEMFIBROZIL TABLETS AND CAPSULES
- APO-GLICLAZIDE - 80 MG TABLETS
- APO-GLYBURIDE
- APO-HALOPERIDOL LA - 50 MG/ML LONG ACTING INJECTION
- APO-HYDRALAZINE - 10 MG TABLETS
- APO-HYDRO - 12.5, 25 AND 50 MG TABLETS
- APO-HYDROMORPHONE - 1, 2, 4 AND 8 MG TABLETS
- APO-HYDROXYQUINE - 200 MG TABLETS
- APO-HYDROXYZINE
- APO-IBUPROFEN - 600 MG TABLETS
- APO-INDAPAMIDE - 1.25 AND 2.5 MG TABLETS
- APO-IPRAVENT - 0.06% NASAL SPRAY
- APO-IPRAVENT - 250 MCG/ML INHALATION SOLUTION TO A MAXIMUM OF 4,400 DOSES PER BENEFIT YEAR
- APO-IRBESARTAN - 75, 150 AND 300 MG TABLETS
- APO-IRBESARTAN/HCTZ - 150/12.5, 300/12.5 AND 300/25 MG TABLETS
- APO-K
- APO-KETOCONAZOLE - 200 MG TABLETS
- APO-KETOROLAC - 0.5% OPHTHALMIC SOLUTION
- APO-LAMIVUDINE - 150 AND 300 MG TABLETS
- APO-LAMIVUDINE HBV - 100 MG TABLETS
- APO-LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE - 150/300 MG TABLETS
- APO-LAMOTRIGINE - 25, 100 AND 150 MG TABLETS
- APO-FENO-MICRO - 67 ET 200 MG - CAPSULES
- APO-FENO-SUPER - 100 ET 160 MG, COMPRIMÉS
- APO-FLUNISOLIDE - 0,025 %, VAPORISATEUR NASAL
- APO-FLUOXETINE
- APO-FLUOXETINE - 20 MG/5 ML, SIROP
- APO-FLUPHENAZINE - 5 MG, COMPRIMÉS
- APO-FLURAZEPAM
- APO-FLURBIPROFEN
- APO-FLUTAMIDE - 250 MG, COMPRIMÉS
- APO-FLUTICASONE - 50 MCG, VAPORISATEUR NASAL
- APO-FLUVOXAMINE - 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- APO-FOSINOPRIL - 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- APO-FUROSEMIDE
- APO-GABAPENTIN - 100, 300, 400 ET 600 MG, COMPRIMÉS
- APO-GEMFIBROZIL, COMPRIMÉS ET CAPSULES
- APO-GLICLAZIDE - 80 MG, COMPRIMÉS
- APO-GLYBURIDE
- APO-HALOPERIDOL LA - 50 MG/ML, INJECTION À EFFET PROLONGÉ
- APO-HYDRALAZINE - 10 MG, COMPRIMÉS
- APO-HYDRO - 12,5, 25 ET 50 MG, COMPRIMÉS
- APO-HYDROMORPHONE - 1, 2, 4 ET 8 MG, COMPRIMÉS
- APO-HYDROXYQUINE - 200 MG, COMPRIMÉS
- APO-HYDROXYZINE
- APO-IBUPROFEN - 600 MG, COMPRIMÉS
- APO-INDAPAMIDE - 1,25 ET 2,5 MG, COMPRIMÉS
- APO-IPRAVENT - 0,06 %, VAPORISATEUR NASAL
- APO-IPRAVENT - 250 MCG/ML, SOLUTION POUR INHALATION, MAXIMUM DE 4 400 DOSES PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- APO-IRBESARTAN - 75, 150 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- APO-IRBESARTAN/HCTZ - 150/12,5, 300/12,5 ET 300/25 MG, COMPRIMÉS
- APO-K
- APO-KETOCONAZOLE - 200 MG, COMPRIMÉS
- APO-KETOROLAC - 0,5 %, SOLUTION OPHTALMIQUE
- APO-LAMIVUDINE - 150 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- APO-LAMIVUDINE HBV - 100 MG, COMPRIMÉS
- APO-LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE - 150/300 MG, COMPRIMÉS
- APO-LAMOTRIGINE - 25, 100 ET 150 MG, COMPRIMÉS

- APO-LATANOPROST - 0.005% OPHTHALMIC SOLUTION
- APO-LETROZOLE - 2.5 MG TABLETS
- APO-LEVOCARB TABLETS
- APO-LISINOPRIL - 5, 10 AND 20 MG TABLETS
- APO-LISINOPRIL/HCTZ - 10/12.5, 20/12.5 AND 20/25 MG TABLETS
- APO-LITHIUM CARBONATE - 150 AND 300 MG CAPSULES AND 300 MG TABLETS
- APO-LORAZEPAM
- APO-LORAZEPAM - 0.5, 1 AND 2 MG SUBLINGUAL TABLETS
- APO-LOSARTAN - 25, 50 AND 100 MG TABLETS
- APO-LOSARTAN HCTZ - 50/12.5, 100/12.5 AND 100/25 MG TABLETS
- APO-LOVASTATIN TABLETS
- APO-MEDROXY - 2.5, 5, 10 AND 100 MG TABLETS
- APO-METFORMIN
- APO-METFORMIN TABLETS
- APO-METHAZIDE
- APO-METHOTREXATE - 2.5 MG TABLETS
- APO-METOPROLOL
- APO-METOPROLOL - 25 MG TABLETS
- APO-METOPROLOL (TYPE L)
- APO-METOPROLOL SR - 100 AND 200 MG TABLETS
- APO-MIRTAZAPINE - 15, 30 AND 45 MG TABLETS
- APO-MOCLOBEMIDE - 100, 150 AND 300 MG TABLETS
- APO-MOMETASONE - 50 MCG NASAL SPRAY
- APO-NADOL
- APO-NAPROXEN - 125, 250, 375 AND 500 MG TABLETS
- APO-NITRAZEPAM - 5 AND 10 MG TABLETS
- APO-NITROGLYCERIN PUMPSPRAY - 0.4 MG PUMPSPRAY
- APO-NIZATIDINE - 150 AND 300 MG CAPSULES
- APO-NORTRIPTYLINE - 10 AND 25 MG CAPSULES
- APO-OLANZAPINE - 2.5, 5, 7.5, 10 AND 15 MG TABLETS
- APO-OLANZAPINE ODT - 5, 10 AND 15 MG TABLETS
- APO-OMEPRAZOLE - 20 MG CAPSULES
- APO-ONDANSETRON - 4 AND 8 MG TABLETS
- APO-ORCIPRENALINE SYRUP - 2 MG/ML
- APO-OXAZEPAM
- APO-OXTRIPHYLLINE
- APO-OXYBUTYNIN - 5 MG TABLETS
- APO-LATANOPROST - 0,005 %, SOLUTION OPHTALMIQUE
- APO-LETROZOLE - 2,5 MG, COMPRIMÉS
- APO-LEVOCARB, COMPRIMÉS
- APO-LISINOPRIL - 5, 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- APO-LISINOPRIL/HCTZ - 10/12,5, 20/12,5 ET 20/25 MG, COMPRIMÉS
- APO-LITHIUM (CARBONATE D') - 150 ET 300 MG, CAPSULES ET 300 MG, COMPRIMÉS
- APO-LORAZEPAM
- APO-LORAZEPAM - 0,5, 1 ET 2 MG, COMPRIMÉS SUBLINGUAUX
- APO-LOSARTAN - 25, 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- APO-LOSARTAN HCTZ - 50/12,5, 100/12,5 ET 100/25 MG, COMPRIMÉS
- APO-LOVASTATIN, COMPRIMÉS
- APO-MEDROXY - 2,5, 5, 10 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- APO-METFORMIN
- APO-METFORMIN, COMPRIMÉS
- APO-METHAZIDE
- APO-METHOTREXATE - 2,5 MG, COMPRIMÉS
- APO-METOPROLOL
- APO-METOPROLOL - 25 MG, COMPRIMÉS
- APO-METOPROLOL (TYPE L)
- APO-METOPROLOL SR - 100 ET 200 MG, COMPRIMÉS
- APO-MIRTAZAPINE - 15, 30 ET 45 MG, COMPRIMÉS
- APO-MOCLOBÉMIDE - 100, 150 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- APO-MOMETASONE - 50 MCG, VAPORISATEUR NASAL
- APO-NADOL
- APO-NAPROXEN - 125, 250, 375 ET 500 MG, COMPRIMÉS
- APO-NITRAZEPAM - 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- APO-NITROGLYCERIN PUMPSPRAY - 0,4 MG NÉBULISEUR
- APO-NIZATIDINE - 150 ET 300 MG, CAPSULES
- APO-NORTRIPTYLINE - 10 ET 25 MG, CAPSULES
- APO-OLANZAPINE - 2,5, 5, 7,5, 10 ET 15 MG, COMPRIMÉS
- APO-OLANZAPINE ODT - 5, 10 ET 15 MG, COMPRIMÉS
- APO-OMEPRAZOLE - 20 MG, CAPSULES
- APO-ONDANSETRON - 4 ET 8 MG, COMPRIMÉS
- APO-ORCIPRENALINE - 2 MG/ML, SIROP
- APO-OXAZEPAM
- APO-OXTRIPHYLLINE
- APO-OXYBUTYNIN - 5 MG, COMPRIMÉS

- APO-OXYCODONE/ACET - 5 MG/325 MG TABLETS
- APO-PANTOPRAZOLE - 40 MG TABLETS
- APO-PAROXETINE - 10, 20 AND 30 MG TABLETS
- APO-PEN VK TABLETS AND SUSPENSION
- APO-PERINDOPRIL - 8 MG TABLETS
- APO-PIMOZIDE - 2 AND 4 MG TABLETS
- APO-PINDOL
- APO-PIROXICAM
- APO-PRAVASTATIN - 10, 20 AND 40 MG TABLETS
- APO-PRAZO
- APO-PREDNISON
- APO-PROCAINAMIDE - 375 AND 500 MG CAPSULES
- APO-PROPAFENONE - 150 AND 300 MG TABLETS
- APO-PROPRANOLOL
- APO-QUETIAPINE - 25, 100, 200 AND 300 MG TABLETS
- APO-QUINAPRIL - 5, 10, 20 AND 40 MG TABLETS
- APO-QUINAPRIL/HCTZ - 10/12.5 MG, 20/12.5 MG AND 20/25 MG TABLETS
- APO-QUININE - 200 AND 300 MG CAPSULES
- APO-RABEPRAZOLE - 10 AND 20 MG TABLETS
- APO-RAMIPRIL - 1.25, 2.5, 5, 10 AND 15 MG CAPSULES
- APO-RANITIDINE - 15 MG/ML ORAL SOLUTION
- APO-RANITIDINE - 150 AND 300 MG TABLETS
- APO-RISPERIDONE - 1 MG/ML ORAL SOLUTION
- APO-RISPERIDONE - 0.25, 0.5, 1, 2, 3 AND 4 MG TABLETS
- APO-ROPINIROLE - 0.25, 1, 2 AND 5 MG TABLETS
- APO-ROSUVASTATIN - 10, 20 AND 40 MG TABLETS
- APO-SALVENT CFC FREE - 100 MCG/DOSE METERED DOSE INHALER TO A MAXIMUM OF 4,400 DOSES PER BENEFIT YEAR
- APO SALVENT TABLETS
- APO-SELEGILINE - 5 MG TABLETS
- APO-SERTRALINE - 25 MG, 50 MG AND 100 MG CAPSULES
- APO-SIMVASTATIN - 5, 10, 20, 40 AND 80 MG TABLETS
- APO-SOTALOL TABLETS
- APO-SUCRALFATE
- APO-SULFAMETHOXAZOLE
- APO-SULFATRIM DS
- APO-OXYCODONE/ACET - 5 MG/325 MG, COMPRIMÉS
- APO-PANTOPRAZOLE - 40 MG, COMPRIMÉS
- APO-PAROXETINE - 10, 20 ET 30 MG, COMPRIMÉS
- APO-PEN VK, COMPRIMÉS ET SUSPENSION
- APO-PERINDOPRIL - 8 MG, COMPRIMÉS
- APO-PIMOZIDE - 2 ET 4 MG, COMPRIMÉS
- APO-PINDOL
- APO-PIROXICAM
- APO-PRAVASTATIN - 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- APO-PRAZO
- APO-PREDNISON
- APO-PROCAINAMIDE - 375 ET 500 MG, CAPSULES
- APO-PROPAFENONE - 150 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- APO-PROPRANOLOL
- APO-QUETIAPINE - 25, 100, 200 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- APO-QUINAPRIL - 5, 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- APO-QUINAPRIL/HCTZ - 10/12,5 MG, 20/12,5 MG ET 20/25 MG, COMPRIMÉS
- APO-QUININE - 200 ET 300 MG, CAPSULES
- APO-RABEPRAZOLE - 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- APO-RAMIPRIL - 1,25, 2,5, 5, 10 ET 15 MG CAPSULES
- APO-RANITIDINE - 15 MG/ML, SOLUTION ORALE
- APO-RANITIDINE - 150 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- APO-RISPERIDONE - 1 MG/ML, SOLUTION ORALE
- APO-RISPERIDONE - 0,25, 0,5, 1, 2, 3 ET 4 MG, COMPRIMÉS
- APO-ROPINIROLE - 0,25, 1, 2 ET 5 MG, COMPRIMÉS
- APO-ROSUVASTATIN - 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- APO-SALVENT SANS CFC, 100 MCG/DOSE, AÉROSOL DOSEUR, MAXIMUM de 4 4 0 0 DOSES PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- APO-SALVENT, COMPRIMÉS
- APO-SELEGILINE - 5 MG, COMPRIMÉS
- APO-SERTRALINE - 25 MG, 50 MG ET 100 MG, CAPSULES
- APO-SIMVASTATIN - 5, 10, 20, 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- APO-SOTALOL, COMPRIMÉS
- APO-SUCRALFATE
- APO-SULFAMETHOXAZOLE
- APO-SULFATRIM DS

- APO-SULFATRIM TABLETS AND SUSPENSION
- APO-SULIN
- APO-TAMOX
- APO-TAMSULOSIN CR – 0.4 MG TABLET
- APO-TELMISARTAN – 40 AND 80 MG TABLETS

- APO-TELMISARTAN/HCTZ – 80/12.5 AND 80/25 MG TABLETS
- APO-TEMAZEPAM – 15 AND 30 MG CAPSULES
- APO-TERAZOSIN
- APO-TERBINAFINE – 250 MG TABLETS
- APO-TETRABENAZINE – 25 MG TABLETS
- APO-THEO-LA
- APO-TIMOL
- APO-TIMOP
- APO-TIMOP GEL – 0.5% GEL
- APO-TOPIRAMATE – 25, 100 AND 200 MG TABLETS
- APO-TRAZODONE
- APO-TRIAZIDE
- APO-TRIHEX
- APO-VALACYCLOVIR – 500 MG TABLETS
- APO-VALGANCYCLOVIR – 450 MG TABLETS
- APO-VALPROIC – 250 MG CAPSULES
- APO-VALPROIC – 250 MG/5 ML SYRUP
- APO-VALSARTAN – 40, 80, 160 AND 320 MG TABLETS
- APO-VALSARTAN/HCTZ – 80/12.5, 160/12.5, 160/25, 320/12.5 AND 320/25 MG TABLETS
- APO-VENLAFAXINE XR – 37.5, 75 AND 150 MG TABLETS
- APO-VERAP
- APO-VERAP SR – 120, 180 AND 240 MG SUSTAINED RELEASE TABLETS
- APO-WARFARIN – 1, 2, 2.5, 3, 4, 5 AND 10 MG TABLETS
- APO-ZIDOVUDINE – 100 MG CAPSULES
- APO-ZOPICLONE – 5 AND 7.5 MG TABLETS
- APRI 21
- APRI 28
- ARIMIDEX TABLETS
- ARISTOCORT C – 0.5% CREAM
- ARISTOCORT R – 1% CREAM AND OINTMENT
- ARISTOFORM R
- AROMASIN – 25 MG TABLETS
- ASACOL – 400 AND 800 MG TABLETS
- ASCENSIA AUTODISC BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS – TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR
- ASCENSIA MICROFILL BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS – TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR
- ASMANEX TWISTHALER – 200 AND 400 MCG INHALER
- ATACAND – 4, 8, 16 AND 32 MG TABLETS
- ATACAND PLUS – 16 MG/12.5 MG TABLETS

- APO-SULFATRIM, COMPRIMÉS ET SUSPENSION
- APO-SULIN
- APO-TAMOX
- APO-TAMSULOSIN CR – 0,4 MG, COMPRIMÉS
- APO-TELMISARTAN – 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- APO-TELMISARTAN/HCTZ – 80/12,5 ET 80/25 MG, COMPRIMÉS
- APO-TEMAZEPAM – 15 ET 30 MG, CAPSULES
- APO-TERAZOSIN
- APO-TERBINAFINE – 250 MG, COMPRIMÉS
- APO-TETRABENAZINE – 25 MG, COMPRIMÉS
- APO-THEO-LA
- APO-TIMOL
- APO-TIMOP
- APO-TIMOP GEL – 0,5 %, GEL
- APO-TOPIRAMATE – 25, 100 ET 200 MG, COMPRIMÉS
- APO-TRAZODONE
- APO-TRIAZIDE
- APO-TRIHEX
- APO-VALACYCLOVIR – 500 MG, COMPRIMÉS
- APO-VALGANCYCLOVIR – 450 MG, COMPRIMÉS
- APO-VALPROIC – 250 MG, CAPSULES
- APO-VALPROIC – 250 MG/5 ML, SIROP
- APO-VALSARTAN – 40, 80, 160 ET 320 MG, COMPRIMÉS
- APO-VALSARTAN/HCTZ – 80/12,5, 160/12,5, 160/25, 320/12,5 ET 320/25 MG, COMPRIMÉS
- APO-VENLAFAXINE XR – 37,5, 75 ET 150 MG, COMPRIMÉS
- APO-VERAP
- APO-VERAP SR – 120, 180 ET 240 MG, COMPRIMÉS À LIBÉRATION PROGRESSIVE
- APO-WARFARIN – 1, 2, 2,5, 3, 4, 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- APO-ZIDOVUDINE – 100 MG, CAPSULES
- APO-ZOPICLONE – 5 ET 7,5 MG, COMPRIMÉS
- APRI 21
- APRI 28
- ARIMIDEX, COMPRIMÉS
- ARISTOCORT C – 0,5 %, CRÈME
- ARISTOCORT R – 1 %, CRÈME ET POMMADE
- ARISTOFORM R
- AROMASIN – 25 MG, COMPRIMÉS
- ASACOL – 400 ET 800 MG, COMPRIMÉS
- ASCENSIA AUTO DISC, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE – MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- ASCENSIA MICROFILL, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE, MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- ASMANEX TWISTHALER – 200 ET 400 MCG, INHALATEUR
- ATACAND – 4, 8, 16 ET 32 MG, COMPRIMÉS
- ATACAND PLUS – 16 MG/12,5 MG, COMPRIMÉS

- ATARAX SYRUP
- ATASOL 15
- ATASOL 30
- ATENOLOL (SIVEM) - 25, 50 AND 100 MG TABLETS
- ATIVAN ORAL AND SUBLINGUAL TABLETS
- ATORVASTATIN (APOTEX) - 10, 20, 40 AND 80 MG TABLETS
- ATORVASTATIN (SANIS) - 10, 20, 40 AND 80 MG TABLETS
- ATORVASTATIN (SIVEM) - 10, 20, 40 AND 80 MG TABLETS
- ATROPINE OPHTHALMIC OINTMENT
- ATROPINE SULFATE OPHTHALMIC OINTMENT
- ATROPISOL
- ATROVENT HFA - 20 MCG METERED DOSE INHALER TO A MAXIMUM OF 4,400 DOSES PER BENEFIT YEAR
- ATROVENT NASAL AEROSOL TO A MAXIMUM OF 6,000 DOSES PER BENEFIT YEAR
- ATROVENT NASAL SPRAY
- AURO-AMLODIPINE - 5 AND 10 MG TABLETS
- AURO-AMOXICILLIN - 250 AND 500 MG CAPSULES
- AURO-ANASTROZOLE - 1 MG TABLETS
- AURO-CITALOPRAM - 20 AND 40 MG TABLETS
- AURO-FLUOXETINE - 10 AND 20 MG CAPSULES
- AURO-GABAPENTIN - 100, 300 AND 400 MG TABLETS
- AURO-IRBESARTAN - 75, 150 AND 300 MG TABLETS
- AURO-LAMOTRIGINE - 25, 100 AND 150 MG TABLETS
- AURO-LETROZOLE - 2.5 MG TABLETS
- AURO-LISINOPRIL - 5, 10 AND 20 MG TABLETS
- AURO-LOSARTAN - 25, 50 AND 100 MG TABLETS
- AURO-MIRTAZAPINE OD - 15, 30 AND 45 MG TABLETS
- AURO-NEVIRAPINE - 200 MG TABLETS
- AURO-PAROXETINE - 10, 20 AND 30 MG TABLETS
- AURO-QUETIAPINE - 25, 100, 200 AND 300 MG TABLETS
- AURO-RAMIPRIL - 1.25, 2.5, 5 AND 10 MG CAPSULES
- AURO-SERTRALINE - 25, 50 AND 100 MG CAPSULES
- AURO-TERBINAFINE - 250 MG TABLETS
- AURO-TOPIRAMATE - 25, 100 AND 200 MG TABLETS
- ATARAX, SIROP
- ATASOL 15
- ATASOL 30
- ATENOLOL (SIVEM) - 25, 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- ATIVAN, COMPRIMÉS ORAUX ET SUBLINGUAUX
- ATORVASTATIN (APOTEX) - 10, 20, 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- ATORVASTATIN (SANIS) - 10, 20, 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- ATORVASTATIN (SIVEM) - 10, 20, 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- ATROPINE, POMMADE OPHTHALMIQUE
- ATROPINE (SULFATE D'), POMMADE OPHTHALMIQUE
- ATROPISOL
- ATROVENT HFA - 20 MCG/DOSE, AÉROSOL, MAXIMUM DE 4 400 DOSES PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- ATROVENT, AÉROSOL NASAL, MAXIMUM DE 6 000 DOSES PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- ATROVENT, VAPORISATEUR NASAL
- AURO-AMLODIPINE - 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- AURO-AMOXICILLIN - 250 ET 500 MG, CAPSULES
- AURO-ANASTROZOLE - 1 MG, COMPRIMÉS
- AURO-CITALOPRAM - 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- AURO-FLUOXETINE - 10 ET 20 MG, CAPSULES
- AURO-GABAPENTIN - 100, 300 ET 400 MG, COMPRIMÉS
- AURO-IRBESARTAN - 75, 150 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- AURO-LAMOTRIGINE - 25, 100 ET 150 MG, COMPRIMÉS
- AURO-LETROZOLE - 2,5 MG, COMPRIMÉS
- AURO-LISINOPRIL - 5, 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- AURO-LOSARTAN - 25, 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- AURO-MIRTAZAPINE OD - 15, 30 ET 45 MG, COMPRIMÉS
- AURO-NEVIRAPINE - 200 MG, COMPRIMÉS
- AURO-PAROXETINE - 10, 20 ET 30 MG, COMPRIMÉS
- AURO-QUETIAPINE - 25, 100, 200 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- AURO-RAMIPRIL - 1,25, 2,5, 5 ET 10 MG, CAPSULES
- AURO-SERTRALINE - 25, 50 ET 100 MG, CAPSULES
- AURO-TERBINAFINE - 250 MG, COMPRIMÉS
- AURO-TOPIRAMATE - 25, 100 ET 200 MG, COMPRIMÉS

- AURO-VALACYCLOVIR – 500 MG TABLETS
- AVALIDE 150/12.5, 300/12.5 AND 300/25 MG TABLETS
- AVANDIA – 2, 4 AND 8 MG TABLETS
- AVAPRO – 75, 150 AND 300 MG TABLETS
- AVC CREAM AND SUPPOSITORIES
- AVENTYL
- AVIANE 21 AND 28 – 0.10/0.02 MG TABLETS
- AXID
- AZARGA – 1%/0.5% OPHTHALMIC SUSPENSION

- AZATHIOPRINE (SANIS) – 50 MG TABLETS
- AZMACORT AEROSOL
- AZOPT – 1.0% – OPHTHALMIC SUSPENSION
- BACLOFEN (SANIS) – 10 AND 20 MG TABLETS

- BACTRIM DS
- BACTRIM TABLETS AND SUSPENSION
- BARRIERE HC
- BD LATITUDE TEST STRIPS – TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR

- BD SYRINGE WITH ULTRAFINE NEEDLE – 0.3 CC SYRINGE WITH 6MM/31G NEEDLE
- BEBEN
- BECLODISK DISKHALER
- BECLOVENT ROTAHALER
- BECONASE INHALER
- BEDOZ
- BENAZEPRIL (AA PHARMA) – 5, 10 AND 20 MG TABLETS
- BENOXYL 10% LOTION
- BENOXYL 10 WASH
- BENTYLOL TABLETS, SYRUP AND SLOW RELEASE TABLETS
- BENURYL
- BENZAC W10
- BENZTROPINE – 2 MG TABLETS
- BEROTEC AEROSOL 200 MCG – TO A MAXIMUM OF 1,600 DOSES PER BENEFIT YEAR
- BEROTEC TABLETS
- BEROTEC UDV
- BETACORT SCALP LOTION
- BETADERM – 0.05 AND 0.1% OINTMENT
- BETADERM – 0.1% CREAM
- BETADERM SCALP LOTION
- BETAGAN
- BETA-TIM
- BETOPTIC
- BETOPTIC-S
- BEZALIP SR – 400 MG EXTENDED RELEASE TABLETS
- BG STAR BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS – TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR

- AURO-VALACYCLOVIR – 500 MG, COMPRIMÉS
- AVALIDE – 150/12,5, 300/12,5 ET 300/25 MG, COMPRIMÉS
- AVANDIA – 2, 4 ET 8 MG, COMPRIMÉS
- AVAPRO – 75, 150 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- AVC, CRÈME ET SUPPOSITOIRES
- AVENTYL
- AVIANE 21 ET 28 – 0,10/0,02 MG, COMPRIMÉS
- AXID
- AZARGA – 1 %/0,5 %, SUSPENSION OPHTALMIQUE
- AZATHIOPRINE (SANIS) – 50 MG, COMPRIMÉS
- AZMACORT, AÉROSOL
- AZOPT – 1,0 % – SUSPENSION OPHTALMIQUE
- BACLOFEN (SANIS) – 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- BACTRIM DS
- BACTRIM, COMPRIMÉS ET SUSPENSION
- BARRIÈRE-HC
- BD LATITUDE, BÂTONNETS D'ÉPREUVE – MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- BD, SERINGUE ULTRA-FINE – SERINGUE 0,3CC AVEC AIGUILLE DE CALIBRE 31, 6 MM
- BEBEN
- BECLODISK DISKHALER
- BECLOVENT ROTAHALER
- BÉCONASE, INHALATEUR
- BÉDOZ
- BENAZEPRIL (AA PHARMA) – 5, 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- BENOXYL, LOTION 10 %
- BENOXYL 10, LAVAGE
- BENTYLOL, COMPRIMÉS, SIROP ET COMPRIMÉS À LIBÉRATION PROGRESSIVE
- BENURYL
- BENZAC W10
- BENZTROPINE – 2 MG, COMPRIMÉS
- BÉROTEC, AÉROSOL 200 MCG, MAXIMUM DE 1 600 DOSES PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- BÉROTEC, COMPRIMÉS
- BÉROTEC UDV
- BÉTACORT, LOTION CAPILLAIRE
- BÉTADERM – 0,05 ET 0,1 %, POMMADE
- BÉTADERM – 0,1 %, CRÈME
- BÉTADERM, LOTION CAPILLAIRE
- BÉTAGAN
- BÉTA-TIM
- BETOPTIC
- BETOPTIC-S
- BEZALIP SR – 400 MG, COMPRIMÉS À LIBÉRATION PROLONGÉE
- BG STAR, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE – MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION

- BG STAR LANCETS
- BICALUTAMIDE (ACCORD) – 50 MG TABLETS
- BICNU
- BIONIME RIGHTEST GS100 BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS – TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR
- BIPHENTIN – 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 AND 80 MG CAPSULES
- BIQUIN DURULES
- BISOPROLOL (SANIS) – 5 AND 10 MG TABLETS
- BISOPROLOL (SIVEM) – 5 AND 10 MG TABLETS
- BLENOXANE
- BLEPHAMIDE
- BLEPHAMIDE S.O.P.
- BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR
- BONEFOS
- BRAVO BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS – TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR
- BREEZE 2 BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS – TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR
- BREVICON
- BRICANYL TABLETS
- BRICANYL TURBUHALER TO A MAXIMUM OF 2,200 DOSES PER BENEFIT YEAR
- BROMOCRIPTINE (AA PHARMA) – 2.5 MG TABLETS AND 5 MG CAPSULES
- BRONALIDE
- BUPROPION SR (SANIS) – 100 AND 150 MG TABLETS
- BURINEX – 1, 2 AND 5 MG TABLETS
- BUSCOPAN TABLETS AND SUPPOSITORIES
- CALCIJEX INJECTION
- CALCILEAN
- CALCIMAR
- CALTINE
- CANDESARTAN (ACCORD) – 4, 8, 16 AND 32 MG TABLETS
- CANDESARTAN (SANIS) – 4, 8 AND 16 MG TABLETS
- CANDESARTAN (SIVEM) – 4, 8 AND 16 MG TABLETS
- CANDESARTAN HCT (SIVEM) – 16/12.5 MG TABLETS
- CANDESARTAN/HCTZ (SANIS) – 16/12.5 MG TABLETS
- CAPILLARY BLOOD LETTING BLADES AND DEVICES
- CARBAMAZEPINE (TARO)
- BG STAR, LANCETTES
- BICALUTAMIDE (ACCORD) – 50 MG, COMPRIMÉS
- BICNU
- BIONIME RIGHTEST GS100, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE – MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- BIPHENTIN – 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 ET 80 MG. CAPSULES
- BIQUIN, DURULES
- BISOPROLOL (SANIS) – 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- BISOPROLOL (SIVEM) – 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- BLENOXANE
- BLÉPHAMIDE
- BLÉPHAMIDE S.O.P.
- BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE, MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- BONEFOS
- BRAVO, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE – MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- BREEZE 2, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE – MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- BRÉVICON
- BRICANYL, COMPRIMÉS
- BRICANYL TURBUHALER, MAXIMUM DE 2 200 DOSES PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- BROMOCRIPTINE (AA PHARMA) – 2.5 MG, COMPRIMÉS ET 5 MG, CAPSULES
- BRONALIDE
- BUPROPION SR (SANIS) – 100 ET 150 MG, COMPRIMÉS
- BURINEX – 1, 2 ET 5 MG, COMPRIMÉS
- BUSCOPAN, COMPRIMÉS ET SUPPOSITOIRES
- CALCIJEX, INJECTION
- CALCILÉAN
- CALCIMAR
- CALTINE
- CANDESARTAN (ACCORD) – 4, 8, 16 ET 32 MG, COMPRIMÉS
- CANDESARTAN (SANIS) – 4, 8 ET 16 MG, COMPRIMÉS
- CANDESARTAN (SIVEM) – 4, 8 ET 16 MG, COMPRIMÉS
- CANDESARTAN HCT (SIVEM) – 16/12,5 MG, COMPRIMÉS
- CANDESARTAN/HCTZ (SANIS) – 16/12,5 MG, COMPRIMÉS
- LAMES ET DISPOSITIFS DE SAIGNÉE CAPILLAIRE
- CARBAMAZEPINE (TARO)

- CARBOLITH
- CARBOPLATIN (FLD)
- CARDIZEM – 30 MG TABLETS
- CARDIZEM CD
- CARDURA
- CARVEDILOL (SANIS) – 3.125, 6.25, 12.5 AND 25 MG TABLETS
- CASODEX – 50 MG TABLETS
- CATAPRES
- CEENU
- CEFAZOLIN – 1 G INJECTION
- CELESTODERM V – 0.05% CREAM AND OINTMENT
- CELESTODERM V/2 – 0.1% CREAM AND OINTMENT
- CELESTONE ORAL
- CELESTONE-S EYE DROPS
- CELEXA – 20 MG, 40 MG – TABLETS
- CELONTIN
- CERUBIDINE
- CESAMET – 0.5 AND 1 MG CAPSULES
- CETAMIDE
- CHAMPIX – 0.5/1 MG, 0.5 MG AND 1 MG TABLETS – TO A MAXIMUM OF 165 TABLETS PER BENEFIT YEAR
- CHEMSTRIPS UG
- CHLORAZEPATE (AA PHARMA) – 3.75, 7.5 AND 15 MG TABLETS
- CHLORDIAZEPOXIDE (AA PHARMA) – 5, 10 AND 25 MG TABLETS
- CHLOROPTIC S.O.P.
- CHLORTHALIDONE (AA PHARMA) – 50 MG TABLETS
- CHOLEDYL ELIXIR
- CIPRODEX – 0.3/0.1% OTIC SOLUTION
- CISPLATIN (FLD)
- CITALOPRAM (RANBAXY) – 20 AND 40 MG TABLETS
- CITALOPRAM (SANIS) – 20 AND 40 MG TABLETS
- CITALOPRAM (SIVEM) – 10, 20 AND 40 MG TABLETS
- CITALOPRAM-ODAN – 20 AND 40 MG TABLETS

- CLARUS – 10 AND 40 MG TABLETS
- CLASTEON – 400 MG CAPSULES
- CLICKFINE PEN NEEDLES – 31 AND 32G NEEDLES
- CLINISTIX
- CLINITEST
- CLINORIL
- CLOBETASOL PROPIONATE – 0.05% SOLUTION, CREAM AND OINTMENT
- CLOPIDOGREL (SANIS) – 75 MG TABLETS
- CLOPIDOGREL (SIVEM) – 75 MG TABLETS
- CLORAZEPATE – 3.75, 7.5 AND 15 MG CAPSULES

- CARBOLITH
- CARBOPLATINE (FLD)
- CARDIZEM – 30 MG, COMPRIMÉS
- CARDIZEM CD
- CARDURA
- CARVEDILOL (SANIS) – 3,125, 6,25, 12,5 ET 25 MG, COMPRIMÉS
- CASODEX – 50 MG, COMPRIMÉS
- CATAPRES
- CEENU
- CÉFAZOLINE – 1 G, INJECTION
- CELESTODERM V – 0,05 % CRÈME ET POMMADE
- CELESTODERM V/2 – 0,1 % CRÈME ET POMMADE
- CELESTONE, ORAL
- CELESTONE-S, GOUTTES OPHTALMIQUES
- CELEXA – 20 MG, 40 MG – COMPRIMÉS
- CELONTIN
- CÉRUBIDINE
- CESAMET – 0,5 ET 1 MG, CAPSULES
- CÉTAMIDE
- CHAMPIX – 0,5/1 MG, 0,5 MG ET 1 MG, COMPRIMÉS – MAXIMUM DE 165 COMPRIMÉS PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- CHEMSTRIPS UG
- CHLORAZEPATE (AA PHARMA) – 3,75, 7,5 ET 15 MG, COMPRIMÉS
- CHLORDIAZEPOXIDE (AA PHARMA) – 5, 10 ET 25 MG, COMPRIMÉS
- CHLOROPTIC S.O.P.
- CHLORTHALIDONE (AA PHARMA) – 50 MG, COMPRIMÉS
- CHOLÉDYL, ÉLIXIR
- CIPRODEX – 0,3/0,1 %, SOLUTION OTIQUE
- CISPLATINE (FLD)
- CITALOPRAM (RANBAXY) – 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- CITALOPRAM (SANIS) – 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- CITALOPRAM (SIVEM) – 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- CITALOPRAM-ODAN – 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS

- CLARUS – 10 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- CLASTEON – 400 MG, CAPSULES
- CLICKFINE, AIGUILLES POUR STYLO INJECTEUR – CALIBRE 31 ET 32
- CLINISTIX
- CLINITEST
- CLINORIL
- CLOBETASOL (PROPIONATE DE) – 0,05 %, SOLUTION, CRÈME ET POMMADE
- CLOPIDOGREL (SANIS) – 75 MG, COMPRIMÉS
- CLOPIDOGREL (SIVEM) – 75 MG, COMPRIMÉS
- CLORAZEPATE – 3,75, 7,5 ET 15 MG, CAPSULES

- CLOZARIL
- CO AMLODIPINE – 5 AND 10 MG TABLETS
- CO ANASTROZOLE – 1 MG TABLETS
- CO ATENOLOL – 50 AND 100 MG TABLETS
- CO ATORVASTATIN – 10, 20, 40 AND 80 MG TABLETS
- CO BICALUTAMIDE – 50 MG TABLETS
- CO CANDESARTAN – 4, 8, 16 AND 32 MG TABLETS
- CO CANDESARTAN/HCT – 16/12.5 MG TABLETS
- CO CILAZAPRIL – 2.5 AND 5 MG TABLETS
- CO-CITALOPRAM – 20 AND 40 MG TABLETS
- CO-CLOMIPRAMINE – 10, 25 AND 50 MG TABLETS
- CO CLONAZEPAM – 0.5, 1 AND 2 MG TABLETS
- CO CLOPIDOGREL – 75 MG TABLETS
- CO DILTIAZEM CD – 120, 180, 240 AND 300 MG CAPSULES
- CO DILTIAZEM T – 120, 180, 240, 300 AND 360 MG CAPSULES
- CO DORZOTIMOLOL – 2%/0.5% OPHTHALMIC SOLUTION
- CO ENALAPRIL – 2.5, 5, 10 AND 20 MG TABLETS
- CO ETIDROCAL – 400/500 MG TABLETS
- CO EXEMESTANE – 25 MG TABLET
- CO FAMCICLOVIR – 125, 250 AND 500 MG TABLETS
- CO FLUOXETINE – 10 AND 20 MG CAPSULES
- CO FLUVOXAMINE – 50 AND 100 MG TABLETS
- CO GABAPENTIN – 100, 300 AND 400 MG CAPSULES
- CO IRBESARTAN – 75, 150 AND 300 MG TABLETS
- CO IRBESARTAN HCT – 150/12.5, 300/12.5 AND 300/25 MG TABLETS
- CO LATANOPROST – 0.005% OPHTHALMIC SOLUTION
- COLCHICINE (EURO-PHARM)
- COLCHICINE (ODAN)
- COLESTID
- CO LISINOPRIL – 5, 10 AND 20 MG TABLETS
- CO LOSARTAN – 25, 50 AND 100 MG TABLETS
- CO LOSARTAN/HCT – 50/12.5, 100/12.5 AND 100/25 MG TABLETS
- CO LOVASTATIN – 20 AND 40 MG TABLETS
- COLY-MYCIN M PARENTERAL – 75 MG/ML
- COLY-MYCIN OTIC
- COMBIGAN – 0.2%/0.5% PER ML OPHTHALMIC SOLUTION
- COMBIPRES
- COMBIVIR
- CLOZARIL
- CO AMLODIPINE – 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- CO ANASTROZOLE – 1 MG, COMPRIMÉS
- CO ATENOLOL – 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- CO ATORVASTATIN – 10, 20, 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- CO BICALUTAMIDE – 50 MG, COMPRIMÉS
- CO CANDESARTAN – 4, 8, 16 ET 32 MG, COMPRIMÉS
- CO CANDESARTAN/HCT – 16/12,5 MG, COMPRIMÉS
- CO CILAZAPRIL – 2,5 ET 5 MG, COMPRIMÉS
- CO-CITALOPRAM – 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- CO-CLOMIPRAMINE – 10, 25 ET 50 MG, COMPRIMÉS
- CO CLONAZEPAM – 0,5, 1 ET 2 MG, COMPRIMÉS
- CO CLOPIDOGREL – 75 MG, COMPRIMÉS
- CO DILTIAZEM CD – 120, 180, 240 ET 300 MG, CAPSULES
- CO DILTIAZEM T – 120, 180, 240, 300 ET 360 MG, CAPSULES
- CO DORZOTIMOLOL – 2 %/0,5 %, SOLUTION OPHTHALMIQUE
- CO ENALAPRIL – 2,5, 5, 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- CO ETIDROCAL – 400/500 MG, COMPRIMÉS
- CO EXEMESTANE – 25 MG, COMPRIMÉS
- CO FAMCICLOVIR – 125, 250 ET 500 MG, COMPRIMÉS
- CO FLUOXETINE – 10 ET 20 MG, CAPSULES
- CO FLUVOXAMINE – 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- CO GABAPENTIN – 100, 300 ET 400 MG, CAPSULES
- CO IRBESARTAN – 75, 150 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- CO IRBESARTAN HCT – 150/12,5, 300/12,5 ET 300/25 MG, COMPRIMÉS
- CO LATANOPROST – 0,005 %, SOLUTION OPHTHALMIQUE
- COLCHICINE (EURO-PHARM)
- COLCHICINE (ODAN)
- COLESTID
- CO LISINOPRIL – 5, 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- CO LOSARTAN – 25, 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- CO LOSARTAN/HCT – 50/12,5, 100/12,5 ET 100/25 MG, COMPRIMÉS
- CO LOVASTATIN – 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- COLY-MYCIN M PARENTÉRAL – 75 MG/ML
- COLY-MYCIN OTIQUE
- COMBIGAN – 0,2 %/0,5 % PAR ML, SOLUTION OPHTHALMIQUE
- COMBIPRES
- COMBIVIR

- CO METFORMIN – 500 AND 850 MG TABLETS
- CO MIRTAZAPINE – 30 MG TABLETS
- COMTAN – 200 MG TABLETS
- CO NABILONE – 0.5 AND 1 MG TABLETS
- CONCERTA – 18, 27, 36 AND 54 MG TABLETS
- CONGEST
- CONTOUR BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS – TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR
- CONTOUR NEXT BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS – TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR
- CO OLANZAPINE – 2.5, 5, 7.5, 10 AND 15 MG TABLETS
- CO OLANZAPINE ODT – 5, 10 AND 15 MG TABLETS
- CO ONDANSETRON – 4 AND 8 MG TABLETS
- CO PANTOPRAZOLE – 40 MG TABLETS
- CO PAROXETINE – 10, 20 AND 30 MG TABLETS
- CO PRAVASTATIN – 10, 20 AND 40 MG TABLETS
- CO QUETIAPINE – 25, 100, 200 AND 300 MG TABLETS
- CO RAMIPRIL – 1.25, 2.5, 5 AND 10 MG TABLETS
- CO RANITIDINE – 150 AND 300 MG TABLETS
- CORDARONE
- CORGARD – 40 AND 80 MG TABLETS
- CO RISPERIDONE – 0.25, 0.5, 1, 2, 3 AND 4 MG TABLETS
- CO ROPINIROLE – 0.25, 1, 2 AND 5 MG TABLETS
- CO ROSUVASTATIN – 10, 20 AND 40 MG TABLETS
- CORTATE – 1% CREAM AND OINTMENT
- CORTEF
- CORTENEMA
- CORTIFOAM
- CORTIMENT
- CORTISONE ACETATE
- CORTISPORIN OINTMENT, EYE/EAR SOLUTION AND OTIC SOLUTION
- CORTODERM – 0.1% OINTMENT
- CORZIDE
- CO SERTRALINE – 25, 50 AND 100 MG CAPSULES
- CO-SIMVASTATIN – 5, 10, 20, 40 AND 80 MG TABLETS
- COSMEGEN
- COSOPT OPHTHALMIC SOLUTION
- CO SOTALOL – 80 AND 160 MG TABLETS
- COTAZYM
- COTAZYM ECS
- CO METFORMIN – 500 ET 850 MG, COMPRIMÉS
- CO MIRTAZAPINE – 30 MG, COMPRIMÉS
- COMPTAN – 200 MG, COMPRIMÉS
- CO NABILONE – 0,5 ET 1 MG, COMPRIMÉS
- CONCERTA – 18, 27, 36 ET 54 MG, COMPRIMÉS
- CONGEST
- CONTOUR, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE – MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- CONTOUR NEXT, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE – MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- CO OLANZAPINE – 2,5, 5, 7,5, 10 ET 15 MG, COMPRIMÉS
- CO OLANZAPINE ODT – 5, 10 ET 15 MG, COMPRIMÉS
- CO ONDANSETRON – 4 ET 8 MG, COMPRIMÉS
- CO PANTOPRAZOLE – 40 MG, COMPRIMÉS
- CO PAROXETINE – 10, 20 ET 30 MG, COMPRIMÉS
- CO PRAVASTATIN – 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- CO QUETIAPINE – 25, 100, 200 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- CO RAMIPRIL – 1,25, 2,5, 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- CO RANITIDINE – 150 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- CORDARONE
- CORGARD – 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- CO RISPERIDONE – 0,25, 0,5, 1, 2, 3 ET 4 MG, COMPRIMÉS
- CO ROPINIROLE – 0,25, 1, 2 ET 5 MG, COMPRIMÉS
- CO ROSUVASTATIN – 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- CORTATE – 1 %, CRÈME ET POMMADE
- CORTEF
- CORTENEMA
- CORTIFOAM
- CORTIMENT
- CORTISONE (ACÉTATE DE)
- CORTISPORIN, POMMADE, SOLUTION OPHTALMIQUE/OTIQUE ET SOLUTION OTIQUE
- CORTODERM – 0,1 %, POMMADE
- CORZIDE
- CO SERTRALINE – 25, 50 ET 100 MG, CAPSULES
- CO-SIMVASTATIN – 5, 10, 20, 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- COSMEGEN
- COSOPT, SOLUTION OPHTALMIQUE
- CO SOTALOL – 80 ET 160 MG, COMPRIMÉS
- COTAZYM
- COTAZYM ECS

- COTAZYM ECS 4 – CAPSULES
- COTAZYM 65B
- COTAZYM 65B – CAPSULES
- CO TELMISARTAN – 40 AND 80 MG TABLETS
- CO TELMISARTAN/HCTZ – 80/12.5 AND 80/25 MG TABLETS
- CO-TEMAZEPAM – 15 AND 30 MG CAPSULES
- CO TEMOZOLOMIDE – 20, 100, 140 AND 250 MG CAPSULES
- CO TERBINAFINE – 250 MG TABLETS
- CO TOPIRAMATE – 25, 100 AND 200 MG TABLETS
- COUMADIN – 1, 2, 2.5, 3, 4, 5 AND 10 MG TABLETS
- CO VALACYCLOVIR – 500 MG TABLETS
- CO VALSARTAN – 40, 80, 160 AND 320 MG TABLETS
- CO VENLAFAXINE XR – 37.5, 75 AND 150 MG CAPSULES
- COVERSYL – 2, 4 AND 8 MG TABLETS
- COVERSYL PLUS – 4 MG/1.25 MG TABLETS
- COVERSYL PLUS HD – 2.5 MG/8 MG TABLETS
- COZAAR – 25, 50 AND 100 MG TABLETS
- CO ZOPICLONE – 5 AND 7.5 MG TABLETS
- CREON 6 MINIMICROSPHERES CAPSULES
- CREON 10
- CREON 20 – CAPSULES
- CREON 25
- CRESTOR – 10, 20 AND 40 MG TABLETS
- CRIXIVAN – 200 AND 400 MG CAPSULES
- CTP 30 – 30 MG TABLETS
- CUPRIMINE
- CYCLEN
- CYCLOCORT CREAM, OINTMENT AND LOTION
- CYCLOGYL
- CYCLOMEN – 50, 100 AND 200 MG CAPSULES
- CYKLOKAPRON TABLETS
- CYPROTERONE (AA PHARMA) – 50 MG TABLETS
- CYSTADANE POWDER FOR ORAL SOLUTION
- CYSTISTAT LIQUID
- CYTARABINE (FLD)
- CYTOMEL – 5 MCG AND 25 MCG TABLETS
- CYTOSAR
- CYTOVENE – 250 AND 500 MG CAPSULES
- DALACIN C CAPSULES
- DALACIN C FLAVORED GRANULES
- DALACIN T TOPICAL
- DALMANE
- DANTRIUM CAPSULES
- DAPSONE – 100 MG TABLETS
- DARAPRIM
- DDAVP INJECTION
- DDAVP MELT – 60 AND 120 MCG TABLETS
- COTAZYM ECS 4 – CAPSULES
- COTAZYM 65B
- COTAZYM 65B – CAPSULES
- CO TELMISARTAN – 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- CO TELMISARTAN/HCTZ – 80/12,5 ET 80/25 MG, COMPRIMÉS
- CO-TEMAZEPAM – 15 ET 30 MG, CAPSULES
- CO TEMOZOLOMIDE – 20, 100, 140 ET 250 MG, CAPSULES
- CO TERBINAFINE – 250 MG, COMPRIMÉS
- CO TOPIRAMATE – 25, 100 ET 200 MG, COMPRIMÉS
- COUMADIN – 1, 2, 2.5, 3, 4, 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- CO VALACYCLOVIR – 500 MG, COMPRIMÉS
- CO VALSARTAN – 40, 80, 160 ET 320 MG, COMPRIMÉS
- CO VENLAFAXINE XR – 37,5, 75 ET 150 MG, CAPSULES
- COVERSYL – 2, 4 ET 8 MG, COMPRIMÉS
- COVERSYL PLUS – 4 MG/1,25 MG, COMPRIMÉS
- COVERSYL PLUS HD – 2,5 MG/8 MG, COMPRIMÉS
- COZAAR – 25, 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- CO ZOPICLONE – 5 ET 7,5 MG, COMPRIMÉS
- CRÉON 6 MINIMICROSPHÈRES, CAPSULES
- CRÉON 10
- CRÉON 20 – CAPSULES
- CRÉON 25
- CRESTOR – 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- CRIXIVAN – 200 ET 400 MG, CAPSULES
- CTP 30 – 30 MG, COMPRIMÉS
- CUPRIMINE
- CYCLEN
- CYCLOCORT, CRÈME, POMMADE ET LOTION
- CYCLOGYL
- CYCLOMEN – 50, 100 ET 200 MG, CAPSULES
- CYKLOKAPRON, COMPRIMÉS
- CYPROTERONE (AA PHARMA) – 50 MG, COMPRIMÉS
- CYSTADANE, POUDRE POUR SOLUTION ORALE
- CYSTISTAT, LIQUIDE
- CYTARABINE (FLD)
- CYTOMEL – 5 MCG ET 25 MCG, COMPRIMÉS
- CYTOSAR
- CYTOVÈNE – 250 ET 500 MG, CAPSULES
- DALACIN C, CAPSULES
- DALACIN C, GRANULES AROMATISÉS
- DALACIN T, TOPIQUE
- DALMANE
- DANTRIUM, CAPSULES
- DAPSONE – 100 MG, COMPRIMÉS
- DARAPRIM
- DDAVP, INJECTION
- DDAVP MELT – 60 ET 120 MCG, COMPRIMÉS

- DELATESTRYL
- DEMEROL TABLETS
- DEMULEN
- DEPAKENE SYRUP AND CAPSULES
- DEPEN
- DEPO-PROVERA INJECTION
- DEPO-TESTOSTERONE CYPIONATE
- DERMA-SMOOTH/FS
- DERMAZIN
- DERMOVATE CREAM, OINTMENT AND SCALP LOTION
- DERMOXYL 10%
- DERMOXYL 20%
- DESFERAL - 500 MG INJECTION
- DESFERIOXAMINE MESILATE - 500 MG/VIAL POWDER FOR INJECTION
- DESIPRAMINE (AA PHARMA) - 10, 25, 50, 75 AND 100 MG TABLETS
- DESOCORT CREAM
- DESQUAM-X 10%
- DESQUAM-X WASH 10%
- DEXAMETHASONE PHOSPHATE - 4 MG/ML INJECTION (SANDOZ)
- DEXASONE
- DEXIRON - 50 MG/ML INJECTION
- DEXTROSTIX
- DIABETA
- DIABINESE
- DIAMICRON - 80 MG TABLETS
- DIAMICRON MR - 30 AND 60 MG SUSTAINED RELEASE TABLETS
- DIASCAN STRIPS
- DIASTIX
- DICETEL - 50 MG, 100 MG TABLETS
- DICLECTIN - 10/10 MG TABLETS
- DICLOFENAC EC (SANIS) - 50 MG TABLETS
- DICLOFENAC SR (SANIS) - 75 MG TABLETS
- DIDROCAL TABLETS
- DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE - 1 MG/ML INJECTION
- DIHYDROERGOTAMINE SANDOZ
- DILANTIN TABLETS, CAPSULES AND SUSPENSION
- DILAUDID STERILE POWDER FOR INJECTION
- DILAUDID TABLETS, ORAL LIQUID, AMPULS AND SUPPOSITORIES
- DILAUDID-HP
- DILTIAZEM CD (SANIS) - 120, 180, 240 AND 300 MG CAPSULES
- DIMELOR
- DIDOQUIN
- DIOPENTOLATE
- DIOPRED - 1% OPHTHALMIC SOLUTION
- DIOPTIMYD
- DELATESTRYL
- DÉMÉROL, COMPRIMÉS
- DEMULEN
- DEPAKENE, SIROP ET CAPSULES
- DÉPEN
- DEPO-PROVERA, INJECTION
- DEPO-TESTOSTÉRONE (CYPIONATE DE)
- DERMA-SMOOTH/FS
- DERMAZIN
- DERMOVATE, CRÈME, POMMADE ET LOTION CAPILLAIRE
- DERMOXYL 10 %
- DERMOXYL 20 %
- DESFERAL - 500 MG, INJECTION
- DESFERIOXAMINE (MÉSYLATE DE) - 500 MG/AMPOULE, POUDRE INJECTABLE
- DESIPRAMINE (AA PHARMA) - 10, 25, 50, 75 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- DÉSOCORT, CRÈME
- DESQUAM-X 10 %
- DESQUAM-X LAVAGE 10 %
- DEXAMÉTHASONE (PHOSPHATE DE) - 4 MG/ML, INJECTION (SANDOZ)
- DEXASONE
- DEXIRON - 50 MG/ML, INJECTION
- DEXTROSTIX
- DIABETA
- DIABINÈSE
- DIAMICRON - 80 MG, COMPRIMÉS
- DIAMICRON MR - 30 ET 60 MG, COMPRIMÉS À LIBÉRATION PROGRESSIVE
- DIASCAN, BÂTONNETS
- DIASTIX
- DICETEL - 50 MG ET 100 MG, COMPRIMÉS
- DICLECTIN - 10/10 MG, COMPRIMÉS
- DICLOFENAC EC (SANIS) - 50 MG, COMPRIMÉS
- DICLOFENAC SR (SANIS) - 75 MG, COMPRIMÉS
- DIDROCAL, COMPRIMÉS
- DIHYDROERGOTAMINE (MÉSYLATE DE) - 1 MG/ML, INJECTION
- DIHYDROERGOTAMINE SANDOZ
- DILANTIN, COMPRIMÉS, CAPSULES ET SUSPENSION
- DILAUDID, POUDRE STÉRILE POUR INJECTIONS
- DILAUDID, COMPRIMÉS, LIQUIDE ORAL, AMPOULES ET SUPPOSITOIRES
- DILAUDID-HP
- DILTIAZEM CD (SANIS) - 120, 180, 240 ET 300 MG, CAPSULES
- DIMELOR
- DIDOQUIN
- DIOPENTOLATE
- DIOPRED - 1 %, SOLUTION OPHTHALMIQUE
- DIOPTIMYD

- DIOVAN – 40, 80 AND 160 MG TABLETS
 - DIOVAN-HCT – 80/12.5 AND 160/12.5 MG TABLETS
 - DIOVAN HCT – 160 MG/25 MG TABLETS
 - DIPENTUM TABLETS AND CAPSULES
 - DIPROGEN – 0.5/1 MG CREAM
 - DIPROLENE CREAM, OINTMENT AND LOTION
 - DIPROSALIC LOTION AND OINTMENT
 - DIPROSONE CREAM, OINTMENT AND LOTION
 - DIVALPROEX (SANIS) – 125, 250 AND 500 MG TABLETS
 - DIXARIT
 - DOM-ATENOLOL – 50 AND 100 MG TABLETS
 - DOM-BACLOFEN – 10 AND 20 MG TABLETS
 - DOM-BROMOCRIPTINE – 2.5 MG TABLETS
 - DOM-BROMOCRIPTINE – 5 MG CAPSULES
 - DOM-BUSPIRONE – 10 MG TABLETS
 - DOM-CAPTOPRIL – 12.5, 25, 50 AND 100 MG TABLETS
 - DOM-CLONAZEPAM-R – 0.5 MG TABLETS
 - DOM-CLONAZEPAM – 2 MG TABLETS
 - DOM-DESIPRAMINE – 25 AND 50 MG TABLETS

 - DOM-DICLOFENAC – 25 AND 50 MG ENTERIC COATED TABLETS
 - DOM-DICLOFENAC – 75 AND 100 MG SLOW RELEASE TABLETS
 - DOM-DOMPERIDONE – 10 MG TABLETS
 - DOM-FLUOXETINE – 10 MG CAPSULES
 - DOM-GEMFIBROZIL – 600 MG TABLETS
 - DOM-INDAPAMIDE – 1.25 AND 2.5 MG TABLETS
 - DOM-METOPROLOL-B – 50 AND 100 MG TABLETS
 - DOM-METOPROLOL-L – 50 AND 100 MG TABLETS
 - DOMPERIDONE (SANIS) – 10 MG TABLETS
 - DOMPERIDONE (SIVEM) – 10 MG TABLETS
 - DOM-PINDOLOL – 5 AND 10 MG TABLETS
 - DOM-PIROXICAM – 20 MG CAPSULES
 - DOM-PROPRANOLOL – 10 AND 40 MG TABLETS
 - DOM-SOTALOL – 160 MG TABLETS
 - DOM-TEMAZEPAM – 15 AND 30 MG CAPSULES
 - DOM-TRAZODONE – 50 AND 100 MG TABLETS

 - DOM-VALPROIC ACID – 250 MG CAPSULES
 - DOM-VALPROIC ACID E.C. – 500 MG CAPSULES
 - DOPAMET
 - DORYX
 - DOXYCIN
 - DOXYCYCLINE (SANIS) – 100 MG CAPSULES
 - DRENISON TAPE
 - DUOTRAV PQ – 0.004/0.5% OPHTHALMIC SOLUTION
 - DURABOLIN INJECTION
- DIOVAN – 40, 80 ET 160 MG, COMPRIMÉS
 - DIOVAN-HCT – 80/12,5 ET 160/12,5 MG, COMPRIMÉS
 - DIOVAN HCT – 160 MG/25 MG, COMPRIMÉS
 - DIPENTUM, COMPRIMÉS ET CAPSULES
 - DIPROGEN – 0,5/1 MG, CRÈME
 - DIPROLÈNE, CRÈME, POMMADE ET LOTION
 - DIPROSALIC, LOTION ET POMMADE
 - DIPROSONE, CRÈME, POMMADE ET LOTION
 - DIVALPROEX (SANIS) – 125, 250 ET 500 MG, COMPRIMÉS
 - DIXARIT
 - DOM-ATENOLOL – 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
 - DOM-BACLOFEN – 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
 - DOM-BROMOCRIPTINE – 2,5 MG, COMPRIMÉS
 - DOM-BROMOCRIPTINE – 5 MG, CAPSULES
 - DOM-BUSPIRONE – 10 MG, COMPRIMÉS
 - DOM-CAPTOPRIL – 12,5, 25, 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
 - DOM-CLONAZEPAM-R – 0,5 MG, COMPRIMÉS
 - DOM-CLONAZEPAM – 2 MG, COMPRIMÉS
 - DOM-DESIPRAMINE – 25 ET 50 MG, COMPRIMÉS
 - DOM-DICLOFENAC – 25 ET 50 MG, COMPRIMÉS À ENROBAGE ENTÉROSOLUBLE
 - DOM-DICLOFENAC – 75 ET 100 MG, COMPRIMÉS À LIBÉRATION PROGRESSIVE
 - DOM-DOMPERIDONE – 10 MG, COMPRIMÉS
 - DOM-FLUOXETINE – 10 MG, CAPSULES
 - DOM-GEMFIBROZIL – 600 MG, COMPRIMÉS
 - DOM-INDAPAMIDE – 1,25 ET 2,5 MG, COMPRIMÉS
 - DOM-METOPROLOL-B – 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
 - DOM-METOPROLOL-L – 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
 - DOMPERIDONE (SANIS) – 10 MG, COMPRIMÉS
 - DOMPERIDONE (SIVEM) – 10 MG, COMPRIMÉS
 - DOM-PINDOLOL – 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
 - DOM-PIROXICAM – 20 MG, CAPSULES
 - DOM-PROPRANOLOL – 10 ET 40 MG, COMPRIMÉS
 - DOM-SOTALOL – 160 MG, COMPRIMÉS
 - DOM-TEMAZEPAM – 15 ET 30 MG, CAPSULES
 - DOM-TRAZODONE – 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
 - DOM-VALPROIC ACID – 250 MG, CAPSULES
 - DOM-VALPROIC ACID E.C. – 500 MG, CAPSULES
 - DOPAMET
 - DORYX
 - DOXYCIN
 - DOXYCYCLINE (SANIS) – 100 MG, CAPSULES
 - DRENISON, RUBAN
 - DUOTRAV PQ – 0,004/0,5 %, SOLUTION OPHTHALMIQUE
 - DURABOLIN, INJECTION

- | | |
|---|---|
| - DUVOID | - DUVOID |
| - DYRENIUM | - DYRENIUM |
| - EDECRIN - 25 MG TABLETS | - EDECRIN - 25 MG, COMPRIMÉS |
| - EFFEXOR XR - 37.5, 75 AND 150 MG
EXTENDED RELEASE CAPSULES | - EFFEXOR XR - 37,5, 75 ET 150 MG, CAPSULES
À LIBÉRATION PROLONGÉE |
| - EFUDEX | - EFUDEX |
| - ELAVIL (AA PHARMA) - 10, 25, 50 AND 75 MG
TABLETS | - ELAVIL (AA PHARMA) - 10, 25, 50 ET 75 MG,
COMPRIMÉS |
| - ELMIRON CAPSULES | - ELMIRON, CAPSULES |
| - ELOCOM CREAM, OINTMENT AND LOTION | - ELOCOM, CRÈME, POMMADE ET LOTION |
| - ELTROXIN | - ELTROXIN |
| - EMCYT | - EMCYT |
| - EMO CORT 1% CREAM AND LOTION | - EMO CORT 1 %, CRÈME ET LOTION |
| - EMO CORT - 2.5% CREAM AND LOTION | - EMO CORT - 2,5 %, CRÈME ET LOTION |
| - E-MYCIN | - E-MYCIN |
| - ENALAPRIL (SANIS) - 2.5, 5, 10 AND 20 MG
TABLETS | - ENALAPRIL (SANIS) - 2,5, 5, 10 ET 20 MG,
COMPRIMÉS |
| - ENCORE BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS - TO
A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR | - ENCORE, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE
GLYCÉMIE - MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE
D'INDEMNISATION |
| - ENDANTIDINE | - ENDANTIDINE |
| - ENDOCET | - ENDOCET |
| - ENTERIC COATED ASA 650 MG (VITA HEALTH) | - ASA À ENROBAGE ENTÉROSOLUBLE, 650 MG
(VITA HEALTH) |
| - ENTERIC COATED ASA (JAMP) - 650 MG
TABLETS | - ENTERIC COATED ASA (JAMP) - 650 MG,
COMPRIMÉS |
| - ENTOCORT ENEMA | - ENTOCORT, LAVEMENT |
| - ENTROPHEN - 650 AND 975 MG | - ENTROPHEN - 650 ET 975 MG |
| - EPIFRIN | - ÉPIFRIN |
| - E-PILO | - E-PILO |
| - EPIMORPH | - ÉPIMORPH |
| - EPIPEN | - ÉPIPEN |
| - EPIPEN JR. | - ÉPIPEN JR. |
| - EPIVAL | - ÉPIVAL |
| - ERGOMAR | - ERGOMAR |
| - ERYBID | - ÉRYBID |
| - ERYC | - ERYC |
| - ERYPED | - ÉRYPED |
| - ERYTHRO BASE (AA PHARMA) - 250 MG
TABLETS | - ERYTHRO BASE (AA PHARMA) - 250 MG,
COMPRIMÉS |
| - ERYTHRO-ES (AA PHARMA) - 600 MG
TABLETS | - ERYTHRO-ES (AA PHARMA) - 600 MG,
COMPRIMÉS |
| - ERYTHROMYCIN (KENRAL) | - ÉRYTHROMYCINE (KENRAL) |
| - ERYTHRO-S (AA PHARMA) - 250 AND 500 MG
TABLETS | - ERYTHRO-S (AA PHARMA) - 250 ET 500 MG,
COMPRIMÉS |
| - ESME 21 | - ESME 21 |
| - ESME 28 | - ESME 28 |
| - ESTINYL | - ESTINYL |
| - ESTRACE - 0.5, 1 AND 2 MG TABLETS | - ESTRACE - 0,5, 1 ET 2 MG, COMPRIMÉS |
| - ESTRING | - ESTRING |
| - ETIBI | - ETIBI |
| - ETIDROCAL (SANIS) - TABLETS | - ETIDROCAL (SANIS) - COMPRIMÉS |
| - EUFLEX | - EUFLEX |
| - EUGLUCON - 5 MG TABLETS | - EUGLUCON - 5 MG, COMPRIMÉS |
| - EUMOVATE | - EUMOVATE |
| - EUTHYROX - 25, 50, 75, 88, 100, 112, 125, 137,
150, 175, 200 AND 300 MCG TABLETS | - EUTHYROX - 25, 50, 75, 88, 100, 112, 125, 137,
150, 175, 200 ET 300 MCG, COMPRIMÉS |

- EXDOL-15
- EXDOL-30
- EZ HEALTH ORACLE BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS – TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR
- FAMOTIDINE (SANIS) – 20 AND 40 MG TABLETS
- FAMVIR – 125, 250 AND 500 MG TABLETS
- FANSIDAR
- FASTTAKE BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS – TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR
- FEMARA – 2.5 MG TABLETS
- FENOFIBRATE-S (SANIS) – 100 AND 160 MG TABLETS
- FENOMAX – 160 MG CAPSULES
- FINACEA – 15% TOPICAL GEL
- FLAGYL VAGINAL INSERTS AND VAGINAL CREAM
- FLAMAZINE
- FLAREX
- FLECAINIDE (AA PHARMA) – 50 AND 100 MG TABLETS
- FLOMAX CR – 0.4 MG TABLETS
- FLONASE
- FLORINEF
- FLORONE CREAM AND OINTMENT
- FLOVENT DISKUS – 250 AND 500 MCG POWDER FOR INHALATION
- FLOVENT HFA – 50, 125 AND 250 MCG METERED DOSE INHALER
- FLUANXOL DEPOT
- FLUANXOL TABLETS
- FLUODERM – 0.025% CREAM
- FLUOROURACIL (SANDOZ)
- FLUOTIC
- FLUOXETINE (SANIS) – 10 AND 20 MG CAPSULES
- FLUOXETINE (SIVEM) – 20 AND 40 MG CAPSULES
- FLUPHENAZINE (AA PHARMA) – 1, 2 AND 5 MG TABLETS
- FML FORTE
- FML LIQUIFILM
- FML-NEO
- FORADIL – 12 MCG CAPSULES
- FORMULEX
- FORTOVASE – 200 MG – SOFT GELATIN CAPSULES
- FREESTYLE BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS – TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR
- FREESTYLE LANCETS
- FREESTYLE LITE BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS – TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR

- EXDOL-15
- EXDOL-30
- EZ HEALTH ORACLE, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE – MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- FAMOTIDINE (SANIS) – 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- FAMVIR – 125, 250 ET 500 MG, COMPRIMÉS
- FANSIDAR
- FASTTAKE, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE – MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- FEMARA – 2,5 MG, COMPRIMÉS
- FENOFIBRATE-S (SANIS) – 100 ET 160 MG, COMPRIMÉS
- FENOMAX – 160 MG, CAPSULES
- FINACEA – 15 %, GEL TOPIQUE
- FLAGYL, COMPRIMÉS VAGINAUX ET CRÈME VAGINALE
- FLAMAZINE
- FLAREX
- FLECAINIDE (AA PHARMA) – 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- FLOMAX CR – 0,4 MG, COMPRIMÉS
- FLONASE
- FLORINEF
- FLORONE, CRÈME ET POMMADE
- FLOVENT DISKUS – 250 ET 500 MCG, POUDRE POUR INHALATION
- FLOVENT HFA – 50, 125 ET 250 MCG, AÉROSOL DOSEUR
- FLUANXOL DEPOT
- FLUANXOL, COMPRIMÉS
- FLUODERM – 0,025 %, CRÈME
- FLUOROURACIL (SANDOZ)
- FLUOTIC
- FLUOXETINE (SANIS) – 10 ET 20 MG, CAPSULES
- FLUOXETINE (SIVEM) – 20 ET 40 MG, CAPSULES
- FLUPHENAZINE (AA PHARMA) – 1, 2 ET 5 MG, COMPRIMÉS
- FML FORTE
- FML LIQUIFILM
- FML-NEO
- FORADIL – 12 MCG, CAPSULES
- FORMULEX
- FORTOVASE – 200 MG – CAPSULES GÉLATINEUSES MOLLES
- FREESTYLE, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE – MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- FREESTYLE, LANCETTES
- FREESTYLE LITE, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE – MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION

- FREESTYLE PRECISION XTRA BLOOD GLUCOSE STRIPS – TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR
- FREESTYLE PRECISION XTRA BLOOD KETONE TEST STRIPS
- FREYA 21 AND 28 – 0.15/0.03 MG TABLETS
- FRISIUM
- FROBEN SR
- FS SHAMPOO – 0.01%
- FUCIDIN CREAM, OINTMENT AND INTERTULLE
- FUROSEMIDE (SANIS) – 20, 40 AND 80 MG TABLETS
- FUROSIDE
- GABAPENTIN (ACCORD) – 600 AND 800 MG TABLETS
- GABAPENTIN (SANIS) – 100, 300 AND 400 MG CAPSULES
- GABAPENTIN (SIVEM) – 100, 300 AND 400 MG CAPSULES
- GABAPENTIN (SIVEM) – 600 MG TABLETS
- GARASONE OPHTHALMIC OINTMENT AND OPHTHALMIC/OTIC SOLUTION
- GASTROZEPIN
- GD-AMLODIPINE – 5 AND 10 MG TABLETS
- GD-ATORVASTATIN – 10, 20, 40 AND 80 MG TABLETS
- GD-GABAPENTIN – 100, 300 AND 400 MG CAPSULES
- GD-GABAPENTIN – 600 MG TABLETS
- GD-LATANOPROST – 0.005% OPHTHALMIC SOLUTION
- GD-LATANOPROST/TIMOLOL – 50 MCG/5 MG/ML OPHTHALMIC SOLUTION
- GD-SERTRALINE – 25, 50 AND 100 MG CAPSULES
- GD-VENLAFAXINE XR – 37.5, 75 AND 150 MG CAPSULES
- GEMFIBROZIL (CHILCOTT) TABLETS AND CAPSULES
- GEN-BUDESONIDE AQ – 64 MCG, 100 MCG AQUEOUS NASAL SPRAY
- GEN-BUSPIRONE TABLETS
- GEN-CAPTOPRIL
- GEN-CARBAMAZEPINE CR – 200 AND 400 MG SUSTAINED RELEASE TABLETS
- GEN-CILAZAPRIL – 1, 2.5 AND 5 MG TABLETS
- GEN-CIMETIDINE – 300, 400, 600 AND 800 MG TABLETS
- GEN-CITALOPRAM – 20 AND 40 MG TABLETS
- GEN-CLINDAMYCIN – 150 AND 300 MG CAPSULES
- FREESTYLE, PRECISION XTRA, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE – MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- FREESTYLE, PRECISION XTRA, BANDELETTES RÉACTIVES AUX CÉTONES DANS LE SANG
- FREYA 21 ET 28 – 0,15/0,03 MG, COMPRIMÉS
- FRISIUM
- FROBEN SR
- SHAMPOOING FS – 0,01%
- FUCIDIN, CRÈME, POMMADE ET INTERTULLE
- FUROSEMIDE (SANIS) – 20, 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- FUROSIDE
- GABAPENTIN (ACCORD) – 600 ET 800 MG, COMPRIMÉS
- GABAPENTIN (SANIS) – 100, 300 ET 400 MG, CAPSULES
- GABAPENTIN (SIVEM) – 100, 300 ET 400 MG, CAPSULES
- GABAPENTIN (SIVEM) – 600 MG, COMPRIMÉS
- GARASONE, POMMADE OPHTALMIQUE ET SOLUTION OPHTALMIQUE ET OTIQUE
- GASTROZEPIN
- GD-AMLODIPINE – 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- GD-ATORVASTATIN – 10, 20, 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- GD-GABAPENTIN – 100, 300 ET 400 MG, CAPSULES
- GD-GABAPENTIN – 600 MG, COMPRIMÉS
- GD-LATANOPROST – 0,005 %, SOLUTION OPHTALMIQUE
- GD-LATANOPROST/TIMOLOL – 50 MCG/5 MG/ML, SOLUTION OPHTALMIQUE
- GD-SERTRALINE – 25, 50 ET 100 MG, CAPSULES
- GD-VENLAFAXINE XR – 37,5, 75 ET 150 MG, CAPSULES
- GEMFIBROZIL (CHILCOTT), COMPRIMÉS ET CAPSULES
- GEN-BUDESONIDE AQ – 64 MCG ET 100 MCG, VAPORISATEUR NASAL POUR SOLUTION AQUEUSE
- GEN-BUSPIRONE, COMPRIMÉS
- GEN-CAPTOPRIL
- GEN-CARBAMAZÉPINE CR – 200 ET 400 MG, COMPRIMÉS À LIBÉRATION PROGRESSIVE
- GEN-CILAZAPRIL – 1, 2,5 ET 5 MG, COMPRIMÉS
- GEN-CIMETIDINE – 300, 400, 600 ET 800 MG, COMPRIMÉS
- GEN-CITALOPRAM – 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- GEN-CLINDAMYCIN – 150 ET 300 MG, CAPSULES

- GEN-CLOBETASOL CREAM AND OINTMENT
- GEN-CLOBETASOL SCALP APPLICATION
- GEN-CLONAZEPAM TABLETS
- GEN-CLOZAPINE - 25, 50, 100 AND 200 MG TABLETS
- GEN-CYPROTERONE
- GENTAMICIN - 40 MG/ML INJECTION
- GENTAMICIN SULFATE TOPICAL (METAPHARMA)
- GLICLAZIDE MR (AA PHARMA) - 30 MG TABLETS
- GLICLAZIDE (SANIS) - 80 MG TABLETS
- GLUCAGON - 1 MG INJECTION, MAXIMUM ALLOWABLE KITS PER BENEFIT YEAR = 7 KITS
- GLUCOBAY - 50 AND 100 MG TABLETS
- GLUCOPHAGE
- GLYBURIDE (SANIS) - 2.5 AND 5 MG TABLETS

- GLYCON TABLETS
- GRANISETRON (AA PHARMA) - 1 MG TABLETS

- HALCION - 0.25 MG TABLETS
- HALOG CREAM
- HALOPERIDOL INJECTION (SABEX)
- HALOPERIDOL DECANOATE LONG ACTING INJECTION (SABEX, FAULDING)
- HEPALEAN
- HEPALEAN - LOK
- HEPARIN
- HEPARIN LOCK FLUSH
- HEPTOVIR - 100 MG - TABLETS
- HERPLEX D
- HEXALEAN CAPSULES
- HIVID
- HONVOL INJECTION
- H₂OXYL 10%
- H₂OXYL 20%
- HUMALOG - 100 U/ML INJECTION
- HUMALOG KWIKPEN
- HUMALOG MIX25 - 100U/ML SUSPENSION FOR INJECTION
- HUMALOG MIX25 KWIKPEN
- HUMULIN
- HUMULIN N KWIKPEN
- HYCORT
- HYDERM 1%
- HYDRALAZINE (AA PHARMA) - 10, 25 AND 50 MG TABLETS
- HYDREA
- HYDROCHLOROTHIAZIDE (SANIS) - 25 AND 50 MG TABLETS
- HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE - 100, 250, 500 AND 1000 MG/VIAL INJECTION

- GEN-CLOBETASOL, CRÈME ET POMMADE
- GEN-CLOBETASOL, APPLICATION CAPILLAIRE
- GEN-CLONAZEPAM, COMPRIMÉS
- GEN-CLOZAPINE - 25, 50, 100 ET 200 MG, COMPRIMÉS
- GEN-CYPROTERONE
- GENTAMICINE - 40 MG/ML, INJECTION
- GENTAMICINE (SULFATE DE), TOPIQUE (METAPHARMA)
- GLICLAZIDE MR (AA PHARMA) - 30 MG, COMPRIMÉS
- GLICLAZIDE (SANIS) - 80 MG, COMPRIMÉS
- GLUCAGON - 1 MG, INJECTION, MAXIMUM DE 7 TROUSSES AUTORISÉES PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- GLUCOBAY - 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- GLUCOPHAGE
- GLYBURIDE (SANIS) - 2,5 ET 5 MG, COMPRIMÉS
- GLYCON, COMPRIMÉS
- GRANISETRON (AA PHARMA) - 1 MG, COMPRIMÉS
- HALCION - 0,25 MG, COMPRIMÉS
- HALOG, CRÈME
- HALOPÉRIDOL, INJECTION (SABEX)
- HALOPÉRIDOL (DÉCANOATE D'), INJECTION À EFFET PROLONGÉ (SABEX, FAULDING)
- HÉPALÉAN
- HÉPALÉAN - LOK
- HÉPARINE
- HEPARIN LOCK FLUSH
- HEPTOVIR - 100 MG - COMPRIMÉS
- HERPLEX D
- HEXALEAN, CAPSULES
- HIVID
- HONVOL, INJECTION
- H₂OXYL 10 %
- H₂OXYL 20 %
- HUMALOG - 100 U/ML, INJECTION
- HUMALOG KWIKPEN
- HUMALOG MIX25 - 100U/ML, SUSPENSION INJECTABLE
- HUMALOG MIX25 KWIKPEN
- HUMULIN
- HUMULIN N KWIKPEN
- HYCORT
- HYDERM 1 %
- HYDRALAZINE (AA PHARMA) - 10, 25 ET 50 MG, COMPRIMÉS
- HYDRÉA
- HYDROCHLOROTHIAZIDE (SANIS) - 25 ET 50 MG, COMPRIMÉS
- HYDROCORTISONE (SUCCINATE SODIQUE D') - 100, 250, 500 ET 1 000 MG/AMPOULE,

- HYDROMORPH CONTIN – 3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24 AND 30 MG CONTROLLED RELEASE CAPSULES
- HYDROMORPHONE HYDROCHLORIDE (BOEHRINGER INGELHEIM)
- HYDROMORPHONE HCL SOLUTION FOR INJECTION (SIL)
- HYDROMORPHONE HP SOLUTION FOR INJECTION (SIL)
- HYDROVAL – 0.2% CREAM AND OINTMENT
- HYDROXYUREA (SANIS) – 500 MG TABLETS

- HYTRIN
- HYTRIN STARTER PACK

- HYZAAR – 50/12.5 AND 100/12.5 MG TABLETS

- HYZAAR DS – 100 MG/25 MG TABLETS
- IDAMYCIN
- IFEX
- IMIPRAMINE (AA PHARMA) – 10, 25 AND 50 MG TABETS
- IMMUCYST
- IMOVANE – 5 AND 7.5 MG TABLETS
- IMPRIL
- IMURAN TABLETS AND INJECTION
- INDERAL TABLETS
- INDERAL-LA CAPSULES
- INDOTEC SUPPOSITORIES
- INFLAMASE MILD
- INFUFER – 50 MG/ML INJECTION
- INFUSION SET (FOR USE WITH INSULIN PUMPS)
- INHIBACE
- INHIBACE PLUS – 5 MG/12.5 MG – TABLETS
- INSULIN POD (FOR USE WITH OMNIPOD)

- INSULIN RESERVOIR (FOR USE WITH INSULIN PUMPS)
- INSUPEN NEEDLES
- INTRON A – 3, 5, 6, 10 AND 18 MIU/ML
- INTRON A – 3 MIU/0.2 ML, 5 MIU/0.2 ML, 10 MIU/0.2 ML INJECTION FOR MULTIDOSE PENS
- INVIRASE – 200 MG CAPSULES
- INVIRASE – 500 MG TABLETS
- IODIPINE OPHTHALMIC SOLUTION
- IRBESARTAN (SANIS) – 75, 150 AND 300 MG TABLETS
- IRBESARTAN (SIVEM) – 75, 150 AND 300 MG TABLETS
- IRBESARTAN HCT (SIVEM) – 150/12.5, 300/12.5 AND 300/25 MG TABLETS
- IRBESARTAN/HCTZ (SANIS) – 150/12.5, 300/12.5 AND 300/25 MG TABLETS
- ISOPTIN TABLETS
- ISOPTIN-SR TABLETS

- HYDROMORPH CONTIN – 3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24 ET 30 MG, CAPSULES À LIBÉRATION CONTRÔLÉE
- HYDROMORPHONE (CHLORHYDRATE D') (BOEHRINGER INGELHEIM)
- HYDROMORPHONE (CHLORHYDRATE D'), SOLUTION POUR INJECTION (SIL)
- HYDROMORPHONE HP, SOLUTION POUR INJECTION (SIL)
- HYDROVAL – 0,2 %, CRÈME ET POMMADE
- HYDROXYUREA (SANIS) – 500 MG, COMPRIMÉS

- HYTRIN
- HYTRIN – ÉCHANTILLON POUR TRAITEMENT D'ESSAI

- HYZAAR – 50/12,5 ET 100/12,5 MG, COMPRIMÉS
- HYZAAR DS – 100 MG/25 MG, COMPRIMÉS
- IDAMYCIN
- IFEX
- IMIPRAMINE (AA PHARMA) – 10, 25 ET 50 MG, COMPRIMÉS
- IMMUCYST
- IMOVANE – 5 ET 7,5 MG, COMPRIMÉS
- IMPRIL
- IMURAN, COMPRIMÉS ET INJECTION
- INDÉRAL, COMPRIMÉS
- INDÉRAL-LA, CAPSULES
- INDOTEC, SUPPOSITOIRES
- INFLAMASE DOUX
- INFUFER – 50 MG/ML, INJECTION
- TROUSSE DE PERFUSION (UTILISÉE AVEC LES POMPES À INSULINE)
- INHIBACE
- INHIBACE PLUS – 5 MG/12,5 MG, COMPRIMÉS
- POMPE À INSULINE POD (UTILISÉE AVEC L'OMNIPOD)
- RÉSERVOIR D'INSULINE (UTILISÉ AVEC LES POMPES À INSULINE)
- INSUPEN, AIGUILLES
- INTRON A – 3, 5, 6, 10 ET 18 MIU/ML
- INTRON A – 3 MIU/0,2 ML, 5 MIU/0,2 ML, 10 MIU/0,2 ML, DOSES MULTIPLES DE PENS INJECTABLE
- INVIRASE – 200 MG, CAPSULES
- INVIRASE – 500 MG, COMPRIMÉS
- IODIPINE, SOLUTION OPHTALMIQUE
- IRBESARTAN (SANIS) – 75, 150 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- IRBESARTAN (SIVEM) – 75, 150 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- IRBESARTAN HCT (SIVEM) – 150/12,5, 300/12,5 ET 300/25 MG, COMPRIMÉS
- IRBESARTAN/HCTZ (SANIS) – 150/12,5, 300/12,5 ET 300/25 MG, COMPRIMÉS
- ISOPTIN, COMPRIMÉS
- ISOPTIN-SR, COMPRIMÉS

- ISOPTO ATROPINE
- ISOPTO CARBACHOL
- ISOPTO CARPINE
- ISOPTO HOMATROPINE
- ISORDIL SUBLINGUAL AND ORAL TABLETS

- ISOSORBIDE DINITRATE (AA PHARMA) - 10 AND 30 MG TABLETS
- ISOTAMINE TABLETS AND SYRUP
- ITEST TEST STRIPS - TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR

- JAMP-ALPRAZOLAM - 0.25, 0.5, 1 AND 2 MG TABLETS
- JAMP-AMLODIPINE - 5 AND 10 MG TABLETS
- JAMP-ANASTROZOLE - 1 MG TABLETS
- JAMP-ATENOLOL - 25, 50 AND 100 MG TABLETS
- JAMP-ATORVASTATIN - 10, 20, 40 AND 80 MG TABLETS
- JAMP-BICALUTAMIDE - 50 MG TABLETS
- JAMP-CANDESARTAN - 4, 8, 16 AND 32 MG TABLETS
- JAMP-CARVEDILOL - 3.125, 6.25, 12.5 AND 25 MG TABLETS
- JAMP-CITALOPRAM - 10, 20 AND 40 MG TABLETS
- JAMP-COLCHICINE - 0.6 MG TABLETS
- JAMP-DICYCLOMINE HCL - 10 AND 20 MG TABLETS
- JAMP-DOMPERIDONE - 10 MG TABLETS
- JAMP-FLUOXETINE - 10 AND 20 MG CAPSULES
- JAMP-FOSINORPIL - 10 AND 20 MG TABLETS

- JAMP-GABAPENTIN - 100, 300, 400 AND 600 MG TABLETS
- JAMP-INDAPAMIDE - 1.25 AND 2.5 MG TABLETS
- JAMP-K8 - 600 MG TABLETS
- JAMP-K20 - 1500 MG TABLETS
- JAMP-LETROZOLE - 2.5 MG TABLETS
- JAMP-LISINOPRIL - 5, 10 AND 20 MG TABLETS

- JAMP-LOSARTAN - 25, 50 AND 100 MG TABLETS
- JAMP-LOSARTAN HCTZ - 50/12.5 AND 100/25 MG TABLETS
- JAMP-METFORMIN - 500 AND 850 MG TABLETS
- JAMP-METFORMIN BLACKBERRY - 500 AND 850 MG TABLETS
- JAMP-METOPROLOL-L - 25, 50 AND 100 MG TABLETS
- JAMP-OLANZAPINE ODT - 5, 10 AND 15 MG TABLETS

- ISOPTO ATROPINE
- ISOPTO CARBACHOL
- ISOPTO CARPINE
- ISOPTO HOMATROPINE
- ISORDIL, COMPRIMÉS SUBLINGUAUX ET ORAUX

- ISOSORBIDE DINITRATE (AA PHARMA) - 10 ET 30 MG, COMPRIMÉS
- ISOTAMINE, COMPRIMÉS ET SIROP
- ITEST, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE - MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- JAMP-ALPRAZOLAM - 0,25, 0,5, 1 ET 2 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-AMLODIPINE - 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-ANASTROZOLE - 1 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-ATENOLOL - 25, 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-ATORVASTATIN - 10, 20, 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-BICALUTAMIDE - 50 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-CANDESARTAN - 4, 8, 16 ET 32 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-CARVEDILOL - 3,125, 6,25, 12,5 ET 25 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-CITALOPRAM - 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-COLCHICINE - 0,6 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-DICYCLOMINE HCL - 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-DOMPERIDONE - 10 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-FLUOXETINE - 10 ET 20 MG, CAPSULES

- JAMP-FOSINORPIL - 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-GABAPENTIN - 100, 300, 400 ET 600 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-INDAPAMIDE - 1,25 ET 2,5 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-K8 - 600 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-K20 - 1 500 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-LETROZOLE - 2,5 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-LISINOPRIL - 5, 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-LOSARTAN - 25, 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-LOSARTAN HCTZ - 50/12,5 ET 100/25 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-METFORMIN - 500 ET 850 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-METFORMIN BLACKBERRY - 500 ET 850 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-METOPROLOL-L - 25, 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-OLANZAPINE ODT - 5, 10 ET 15 MG, COMPRIMÉS

- JAMP-ONDANSETRON - 4 AND 8 MG TABLETS
- JAMP-PAROXETINE - 10, 20 AND 30 MG TABLETS
- JAMP-POTASSIUM CHLORIDE - 1500 MG TABLETS
- JAMP-PRAVASTATIN - 10, 20 AND 40 MG TABLETS
- JAMP-QUETIAPINE - 25, 100, 200 AND 300 MG TABLETS
- JAMP-QUININE - 200 AND 300 MG CAPSULES
- JAMP-RAMIPRIL - 1.25, 2.5, 5 AND 10 MG TABLETS
- JAMP-RISPERIDONE - 0.25, 0.5, 1, 2, 3 AND 4 MG TABLETS
- JAMP-ROPINIROLE - 0.25, 1, 2 AND 5 MG TABLETS
- JAMP-ROSUVASTATIN - 10, 20 AND 40 MG TABLETS
- JAMP-SERTRALINE - 25, 50 AND 100 MG TABLETS
- JAMP-SIMVASTATIN - 5, 10, 20, 40 AND 80 MG TABLETS
- JAMP-SOTALOL - 80 AND 160 MG TABLETS
- JAMP-TERBINAFINE - 250 MG TABLETS
- JAMP-ZOPICLONE - 5 AND 7.5 MG TABLETS
- KADIAN - 10, 20, 50 AND 100 MG SUSTAINED RELEASE CAPSULES
- KALETRA - 80/20 MG/ML ORAL SOLUTION
- KALETRA - 100 MG/25 MG TABLETS
- KALETRA - 200 MG/50 MG TABLETS
- KALIUM DURULES
- KAON
- KAYEXALATE
- KCL 5%
- KEFLEX TABLETS
- KENRAL VALPROIC - 500 MG ENTERIC COATED CAPSULES
- KETODIASTIX
- KETOPROFEN (AA PHARMA) - 50 MG CAPSULES
- KETOPROFEN-E (AA PHARMA) - 50 AND 100 MG TABLETS
- KETOPROFEN SR (AA PHARMA) - 200 MG TABLETS
- KETOROLAC TROMETHAMINE - 30 MG/ML INJECTION
- KETOSTIX
- KIDROLASE
- KIVEXA - 600/300 MG TABLETS
- K-LONG
- K-LOR
- K-LYTE
- K-LYTE/CL
- K-MED 900
- KONAKION
- JAMP-ONDANSETRON - 4 ET 8 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-PAROXETINE - 10, 20 ET 30 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-POTASSIUM (CHLORURE DE) - 1 500 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-PRAVASTATIN - 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-QUETIAPINE - 25, 100, 200 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-QUININE - 200 ET 300 MG, CAPSULES
- JAMP-RAMIPRIL - 1.25, 2.5, 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-RISPERIDONE - 0.25, 0.5, 1, 2, 3 ET 4 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-ROPINIROLE - 0.25, 1, 2 ET 5 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-ROSUVASTATIN - 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-SERTRALINE - 25, 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-SIMVASTATIN - 5, 10, 20, 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-SOTALOL - 80 ET 160 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-TERBINAFINE - 250 MG, COMPRIMÉS
- JAMP-ZOPICLONE - 5 ET 7,5 MG, COMPRIMÉS
- KADIAN - 10, 20, 50 ET 100 MG, CAPSULES À LIBÉRATION PROGRESSIVE
- KALETRA - 80/20 MG/ML, SOLUTION ORALE
- KALETRA - 100 MG/25 MG, COMPRIMÉS
- KALETRA - 200 MG/50 MG, COMPRIMÉS
- KALIUM DURULES
- KAON
- KAYEXALATE
- KCL 5 %
- KEFLEX, COMPRIMÉS
- KENRAL VALPROIC - 500 MG, CAPSULES À ENROBAGE ENTÉROSOLUBLE
- KETODIASTIX
- KETOPROFEN (AA PHARMA) - 50 MG, CAPSULES
- KETOPROFEN-E (AA PHARMA) - 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- KETOPROFEN SR (AA PHARMA) - 200 MG, COMPRIMÉS
- KÉTOROLAC TROMÉTHAMINE - 30 MG/ML, INJECTION
- KETOSTIX
- KIDROLASE
- KIVEXA - 600/300 MG, COMPRIMÉS
- K-LONG
- K-LOR
- K-LYTE
- K-LYTE/CL
- K-MED 900
- KONAKION

- KYTRIL – 1 MG TABLETS
- K-10 SOLUTION
- LAMICTAL – 5 MG CHEWABLE TABLETS AND 25 MG, 100 MG, 150 MG, 200 MG TABLETS
- LAMISIL TABLETS
- LAMOTRIGINE (SANIS) – 25, 100 AND 150 MG TABLETS
- LANVIS
- LASIX TABLETS AND ORAL SOLUTION
- LASIX SPECIAL TABLETS
- LECTOPAM
- LEDERLE LEUCOVORIN CALCIUM TABLETS

- LENTARON DEPOT
- LESCOL
- LESCOL XL – 80 MG EXTENDED RELEASE TABLETS
- LETROZOLE – 2.5 MG TABLETS (ACCORD, COBALT AND TEVA)
- LEUKERAN
- LEVOCARB CR (AA PHARMA) – 200/50 MG TABLETS
- LIDECOMB
- LIDEMOL
- LIDEX CREAM, GEL AND OINTMENT
- LIN'AMOX
- LIN-BUSPIRONE TABLETS
- LINESSA TABLETS
- LIN-MEGASTROL
- LINSOTALOL
- LIORESAL TABLETS
- LIORESAL INTRATHECAL INJECTION
- LIPIDIL
- LIPIDIL EZ – 48 AND 145 MG TABLETS
- LIPIDIL MICRO – 67 MG AND 200 MG CAPSULES
- LIPIDIL SUPRA – 100 AND 160 MG FILM-COATED TABLETS
- LIPITOR – 10, 20, 40 AND 80 MG TABLETS
- LISINOPRIL/HCTZ (SANIS) – 10/12.5, 20/12.5 AND 20/25 MG TABLETS
- LITHANE TABLETS AND CAPSULES
- LITHMAX SR – 300 MG TABLETS
- LIVOSTIN NASAL SPRAY TO A MAXIMUM OF 6,000 DOSES PER BENEFIT YEAR

- LOCACORTEN
- LOCACORTEN VIOFORM CREAM, OINTMENT AND EARDROPS
- LOESTRIN
- LOMINE
- LONITEN
- LOPRESOR TABLETS AND SLOW RELEASE TABLETS

- KYTRIL – 1 MG, COMPRIMÉS
- K-10, SOLUTION
- LAMICTAL – 5 MG, COMPRIMÉS MASTICABLES ET 25 MG, 100 MG, 150 MG ET 200 MG, COMPRIMÉS
- LAMISIL, COMPRIMÉS
- LAMOTRIGINE (SANIS) – 25, 100 ET 150 MG, COMPRIMÉS
- LANVIS
- LASIX, COMPRIMÉS ET SOLUTION ORALE
- LASIX SPÉCIAL, COMPRIMÉS
- LECTOPAM
- LEDERLE LEUCOVORIN CALCIUM, COMPRIMÉS
- LENTARON DEPOT
- LESCOL
- LESCOL XL – 80 MG, COMPRIMÉS À LIBÉRATION PROLONGÉE
- LETROZOLE – 2,5 MG, COMPRIMÉS (ACCORD, COBALT ET TEVA)
- LEUKERAN
- LEVOCARB CR (AA PHARMA) – 200/50 MG, COMPRIMÉS
- LIDÉCOMB
- LIDÉMOL
- LIDEX, CRÈME, GEL ET POMMADE
- LIN'AMOX
- LIN-BUSPIRONE, COMPRIMÉS
- LINESSA, COMPRIMÉS
- LIN-MEGASTROL
- LINSOTALOL
- LIORESAL, COMPRIMÉS
- LIORESAL, INJECTION INTRATHÉCALE
- LIPIDIL
- LIPIDIL EZ – 48 ET 145 MG, COMPRIMÉS
- LIPIDIL MICRO – 67 MG ET 200 MG, CAPSULES

- LIPIDIL SUPRA – 100 ET 160 MG, COMPRIMÉS ENROBÉS D'UNE PELLICULE
- LIPITOR – 10, 20, 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- LISINOPRIL/HCTZ (SANIS) – 10/12.5, 20/12.5 ET 20/25 MG, COMPRIMÉS
- LITHANE, COMPRIMÉS ET CAPSULES
- LITHMAX SR – 300 MG, COMPRIMÉS
- LIVOSTIN, VAPORISATEUR NASAL, MAXIMUM DE 6 000 DOSES PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- LOCACORTEN
- LOCACORTEN VIOFORM, CRÈME, POMMADE ET GOUTTES OTIQUES
- LOESTRIN
- LOMINE
- LONITEN
- LOPRESOR, COMPRIMÉS ET COMPRIMÉS À LIBÉRATION PROGRESSIVE

- LORAZEPAM (SANIS) – 0.5, 1 AND 2 MG TABLETS
- LOSARTAN (SANIS) – 25, 50 AND 100 MG TABLETS
- LOSARTAN (SIVEM) – 25, 50 AND 100 MG TABLETS
- LOSARTAN HCT (SIVEM) – 50/12.5, 100/12.5 AND 100/25 MG TABLETS
- LOSEC – 20 MG TABLETS AND CAPSULES
- LOTENSIN
- LOVASTATIN (SANIS) – 20 AND 40 MG TABLETS
- LOXAPAC TABLETS AND ORAL CONCENTRATE
- LOZIDE – 1.25 AND 2.5 MG TABLETS
- LUMIGAN RC – 0.01% OPHTHALMIC SOLUTION

- LUTERA 21 AND LUTERA 28 – 100 MCG/20 MCG TABLETS
- LUVOX
- LYDERM – 0.05% OINTMENT, 0.05% GEL, 0.05% CREAM
- LYSODREN
- MADECASSOL
- MANERIX
- MAR-ALLOPURINOL – 100, 200 AND 300 MG TABLETS
- MAR-AMLODIPINE – 5 AND 10 MG TABLETS
- MAR-ANASTROZOLE – 1 MG TABLETS
- MAR-ATENOLOL – 25, 50 AND 100 MG TABLETS
- MAR-CITALOPRAM – 10, 20 AND 40 MG TABLETS
- MAR-DOMERIDONE – 10 MG TABLETS
- MAR-FLUOXETINE – 10 AND 20 MG CAPSULES
- MAR-GABAPENTIN – 100, 300 AND 400 MG CAPSULES
- MARINOL – 2.5 AND 5 MG CAPSULES
- MAR-LETROZOLE – 2.5 MG TABLETS
- MAR-METFORMIN – 500 AND 850 MG TABLETS

- MAR-OLANZAPINE ODT – 5, 10 AND 15 MG TABLETS
- MAR-ONDANSETRON – 4 AND 8 MG TABLETS

- MAR-PAROXETINE – 10, 20 AND 30 MG TABLETS
- MAR-QUETIAPINE – 25, 100, 200 AND 300 MG TABLETS
- MAR-RISPERIDONE – 0.25, 0.5, 1, 2, 3 AND 4 MG TABLETS
- MAR-SERTRALINE – 25, 50 AND 100 MG TABLETS
- MAR-SIMVASTATIN – 5, 10, 20, 40 AND 80 MG TABLETS
- MARVELON
- MAR-ZOPICLONE – 5 AND 7.5 MG TABLETS

- LORAZEPAM (SANIS) – 0,5, 1 ET 2 MG, COMPRIMÉS
- LOSARTAN (SANIS) – 25, 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- LOSARTAN (SIVEM) – 25, 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- LOSARTAN HCT (SIVEM) – 50/12,5, 100/12,5 ET 100/25 MG, COMPRIMÉS
- LOSEC – 20 MG, COMPRIMÉS ET CAPSULES
- LOTENSIN
- LOVASTATIN (SANIS) – 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- LOXAPAC, COMPRIMÉS ET CONCENTRÉ ORAL
- LOZIDE – 1,25 ET 2,5 MG, COMPRIMÉS
- LUMIGAN RC – 0,01 %, SOLUTION OPHTHALMIQUE
- LUTERA 21 ET LUTERA 28 – 100 MCG/20 MCG, COMPRIMÉS
- LUVOX
- LYDERM – 0,05 %, POMMADE, 0,05 %, GEL, 0,05 %, CRÈME
- LYSODREN
- MADÉCASSOL
- MANERIX
- MAR-ALLOPURINOL – 100, 200 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- MAR-AMLODIPINE – 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- MAR-ANASTROZOLE – 1 MG, COMPRIMÉS
- MAR-ATENOLOL – 25, 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- MAR-CITALOPRAM – 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- MAR-DOMERIDONE – 10 MG, COMPRIMÉS
- MAR-FLUOXETINE – 10 ET 20 MG, CAPSULES
- MAR-GABAPENTIN – 100, 300 ET 400 MG, CAPSULES
- MARINOL – 2,5 ET 5 MG, CAPSULES
- MAR-LETROZOLE – 2,5 MG, COMPRIMÉS
- MAR-METFORMIN – 500 ET 850 MG, COMPRIMÉS
- MAR-OLANZAPINE ODT – 5, 10 ET 15 MG, COMPRIMÉS
- MAR-ONDANSETRON – 4 ET 8 MG, COMPRIMÉS
- MAR-PAROXETINE – 10, 20 ET 30 MG, COMPRIMÉS
- MAR-QUETIAPINE – 25, 100, 200 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- MAR-RISPERIDONE – 0,25, 0,5, 1, 2, 3 ET 4 MG, COMPRIMÉS
- MAR-SERTRALINE – 25, 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- MAR-SIMVASTATIN – 5, 10, 20, 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- MARVELON
- MAR-ZOPICLONE – 5 ET 7,5 MG, COMPRIMÉS

- MAVIK – 0.5, 1, 2 AND 4 MG CAPSULES
- MAXAIR METERED DOSE INHALER
- MAXERAN TABLETS
- MAXIDEX OPHTHALMIC SOLUTION AND OPHTHALMIC OINTMENT
- MAXITROL OPHTHALMIC SUSPENSION AND OPHTHALMIC OINTMENT
- MAZEPINE
- MEDISURE BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS – TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR

- MEDISURE LANCETS
- MED-LETROZOLE – 2.5 MG TABLETS
- MEDROL
- MEDROL ACNE LOTION
- MEDROL VERIDERM CREAM
- MED-ROSUVASTATIN – 10, 20 AND 40 MG TABLETS
- MEGACE OS SUSPENSION
- MEGACILLIN TABLETS AND SUSPENSION
- MEGESTROL (AA PHARMA) – 40 AND 160 MG TABLETS
- MEPERIDINE INJECTION
- MEPRON
- MESASAL
- M-ESLON
- MESTINON
- MESTINON SR
- METFORMIN (SANIS) – 500 AND 850 MG TABLETS
- METFORMIN (SIVEM) – 500 AND 850 MG TABLETS
- METHADONE POWDER IN PREPARATION OF AN ORAL SOLUTION
- METHAZOLAMIDE (AA PHARMA) – 50 MG TABLETS
- METHOPRAZINE (AA PHARMA) – 2, 5, 25 AND 50 MG TABLETS
- METHOTREXATE – 10 MG TABLETS
- METHOTREXATE – 25 MG/ML INJECTION (SANDOZ)
- METHOTREXATE INJECTION (HOSPIRA)
- METHYLDOPA (AA PHARMA) – 125, 250 AND 500 MG TABLETS
- METHYLPREDNISOLONE ACETATE – 40 MG/ML, 40 MG/ML WITH PRESERVATIVE, 80 MG/ML AND 80 MG/ML WITH PRESERVATIVE (SANDOZ)
- METOPROLOL (SANIS) – 50 AND 100 MG TABLETS
- METROCREAM CREAM
- METROGEL – 1% GEL
- METROLOTION – 0.75% TOPICAL LOTION
- METRONIDAZOLE (AA PHARMA) – 250 MG TABLETS
- MEVACOR

- MAVIK – 0,5, 1, 2 ET 4 MG, CAPSULES
- MAXAIR, AÉROSOL-DOSEUR
- MAXERAN, COMPRIMÉS
- MAXIDEX, SOLUTION OPHTALMIQUE ET POMMADE OPHTALMIQUE
- MAXITROL, SUSPENSION OPHTALMIQUE ET POMMADE OPHTALMIQUE
- MAZÉPINE
- MEDI+SURE, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE – MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- MEDISURE, LANCETTES
- MED-LETROZOLE – 2,5 MG, COMPRIMÉS
- MEDROL
- MEDROL, LOTION POUR ACNÉ
- MEDROL VERIDERM, CRÈME
- MED-ROSUVASTATIN – 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- MEGACE OS, SUSPENSION
- MEGACILLIN, COMPRIMÉS ET SUSPENSION
- MEGESTROL (AA PHARMA) – 40 ET 160 MG, COMPRIMÉS
- MÉPÉRIDINE, INJECTION
- MÉPRON
- MÉSASAL
- M-ESLON
- MESTINON
- MESTINON SR
- METFORMIN (SANIS) – 500 ET 850 MG, COMPRIMÉS
- METFORMIN (SIVEM) – 500 ET 850 MG, COMPRIMÉS
- MÉTHADONE, POUDRE POUR LA PRÉPARATION D'UNE SOLUTION ORALE
- METHAZOLAMIDE (AA PHARMA) – 50 MG, COMPRIMÉS
- METHOPRAZINE (AA PHARMA) – 2, 5, 25 ET 50 MG, COMPRIMÉS
- MÉTHOTREXATE – 10 MG, COMPRIMÉS
- METHOTREXATE – 25 MG/ML, INJECTION (SANDOZ)
- MÉTHOTREXATE, INJECTION (HOSPIRA)
- METHYLDOPA (AA PHARMA) – 125, 250 ET 500 MG, COMPRIMÉS
- METHYLPREDNISOLONE ACETATE – 40 MG/ML, 40 MG/ML AVEC AGENT DE CONSERVATION, 80 MG/ML ET 80 MG/ML AVEC AGENT DE CONSERVATION (SANDOZ)
- METOPROLOL (SANIS) – 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- METROCREAM, CRÈME
- METROGEL – 1 %, GEL
- METROLOTION – 0,75 %, LOTION TOPIQUE
- METRONIDAZOLE (AA PHARMA) – 250 MG, COMPRIMÉS
- MÉVACOR

- MEZAVANT – 1,2 G TABLET
- MICARDIS – 40 MG, 80 MG TABLETS
- MICARDIS PLUS – 80 MG/12.5 MG TABLETS
- MICRO-K EXTENCAPS
- MICRONOR
- MIDAMOR (AA PHARMA) – 5 MG TABLETS
- MIDODRINE (AA PHARMA) – 2.5 AND 5 MG TABLETS
- MIGRANAL NASAL SPRAY TO A MAXIMUM OF 312 AMPOULES PER BENEFIT YEAR
- MINESTRIN
- MINIPRESS
- MINITRAN
- MIN-OVRAL
- MINT-AMLODIPINE – 5 AND 10 MG TABLETS
- MINT-ANASTROZOLE – 1 MG TABLETS
- MINT-ATENOLOL – 25, 50 AND 100 MG TABLETS
- MINT-CITALOPRAM – 10, 20 AND 40 MG TABLETS
- MINT-CLOPIDOGREL – 75 MG TABLETS
- MINT-FLUOXETINE – 10 AND 20 MG CAPSULES
- MINT-IRBESARTAN/HCTZ – 150/12.5, 300/12.5 AND 300/25 MG TABLETS
- MINT-LOSARTAN – 25, 50 AND 100 MG TABLETS
- MINT-LOSARTAN/HCTZ – 50/12.5, 100/12.5, 100/25 MG TABLETS
- MINT-METFORMIN – 500 AND 850 MG TABLETS
- MINT-ONDANSETRON – 4 AND 8 MG TABLETS
- MINT-PRAVASTATIN – 10, 20 AND 40 MG TABLETS
- MINT-RISPERIDON – 0.25, 0.5, 1, 2, 3 AND 4 MG TABLETS
- MINT-ROSUVASTATIN – 10, 20 AND 40 MG TABLETS
- MINT-SERTRALINE – 25, 50 AND 100 MG CAPSULES
- MINT-SIMVASTATIN – 5, 10, 20, 40 AND 80 MG TABLETS
- MINT-TOPIRAMATE – 25, 100 AND 200 MG TABLETS
- MINT-ZOPICLONE – 5 AND 7.5 MG TABLETS
- MIOSTAT
- MIRENA – 52 MG INTERUTERINE IMPLANT
- MIRTAZAPINE (SANIS) – 30 MG TABLETS
- MIRVALA 21 AND MIRVALA 28 – 0.15 MG/0.03 MG TABLETS
- MISOPROSTOL (AA PHARMA) – 200 MCG TABLETS
- MIXTARD
- MEZAVANT – 1,2 G, COMPRIMÉS
- MICARDIS – 40 MG, 80 MG, COMPRIMÉS
- MICARDIS PLUS – 80 MG/12,5 MG, COMPRIMÉS
- MICRO-K, CAPSULES LONGUE ACTION
- MICRONOR
- MIDAMOR (AA PHARMA) – 5 MG, COMPRIMÉS
- MIDODRINE (AA PHARMA) – 2,5 ET 5 MG, COMPRIMÉS
- MIGRANAL, VAPORISATEUR NASAL, MAXIMUM DE 312 AMPOULES PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- MINESTRIN
- MINIPRESS
- MINITRAN
- MIN-OVRAL
- MINT-AMLODIPINE – 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- MINT-ANASTROZOLE – 1 MG, COMPRIMÉS
- MINT-ATENOLOL – 25, 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- MINT-CITALOPRAM – 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- MINT-CLOPIDOGREL – 75 MG, COMPRIMÉS
- MINT-FLUOXETINE – 10 ET 20 MG, CAPSULES
- MINT-IRBESARTAN/HCTZ – 150/12,5, 300/12,5 ET 300/25 MG, COMPRIMÉS
- MINT-LOSARTAN – 25, 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- MINT-LOSARTAN/HCTZ – 50/12,5, 100/12,5, 100/25 MG, COMPRIMÉS
- MINT-METFORMIN – 500 ET 850 MG, COMPRIMÉS
- MINT-ONDANSETRON – 4 ET 8 MG, COMPRIMÉS
- MINT-PRAVASTATIN – 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- MINT-RISPERIDON – 0,25, 0,5, 1, 2, 3 ET 4 MG, COMPRIMÉS
- MINT-ROSUVASTATIN – 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- MINT-SERTRALINE – 25, 50 ET 100 MG, CAPSULES
- MINT-SIMVASTATIN – 5, 10, 20, 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- MINT-TOPIRAMATE – 25, 100 ET 200 MG, COMPRIMÉS
- MINT-ZOPICLONE – 5 ET 7,5 MG, COMPRIMÉS
- MIOSTAT
- MIRENA – 52 MG, DISPOSITIF INTRA-UTÉRIN
- MIRTAZAPINE (SANIS) – 30 MG, COMPRIMÉS
- MIRVALA 21 ET MIRVALA 28 – 0,15 MG/0,03 MG, COMPRIMÉS
- MISOPROSTOL (AA PHARMA) – 200 MCG, COMPRIMÉS
- MIXTARD

- MOBENOL
- MOBIFLEX
- MODECATE CONCENTRATE
- MODULON TABLETS
- MOGADON
- MONITAN TABLETS
- MONOCOR – 10 MG TABLETS
- MONOJECT ULTRA BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS – TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR
- MONOPRIL
- MORPHINE HP
- MORPHINE SR (SANIS) – 15, 30 AND 60 MG TABLETS
- MORPHINE SULFATE INJECTION
- MORPHINE SULFATE TABLETS (BOEHRINGER INGELHEIM)
- M.O.S. – SR
- M.O.S – TABLETS AND SYRUP
- M.O.S. SULFATE TABLETS
- MPD LANCETS
- MS CONTIN TABLETS
- MSD ENTERIC COATED ASA 650 MG TABLETS

- MS'IR TABLETS AND SUPPOSITORIES
- MUSTARGEN
- MUTAMYCIN
- MYAMBTOL
- MYCIFRADIN TABLETS AND ORAL SOLUTION

- MYCIGUENT
- MYCOBUTIN
- MYDRAPRED
- MYDRIACYL
- MYGLUCOHEALTH BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS – TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR
- MYLAN-ACEBUTOLOL – 100, 200 AND 400 MG TABLETS
- MYLAN-ACEBUTOLOL (TYPE S) – 100, 200 AND 400 MG TABLETS
- MYLAN-ACYCLOVIR – 200, 400 AND 800 MG TABLETS
- MYLAN-ALPRAZOLAM – 0.25, 0.5, 1 AND 2 MG TABLETS
- MYLAN-AMIODARONE – 200 MG TABLETS
- MYLAN-AMLODIPINE – 5 AND 10 MG TABLETS

- MYLAN-AMOXICILLIN – 250 AND 500 MG CAPSULES
- MYLAN-ANASTROZOLE – 1 MG TABLET
- MYLAN-ATENOLOL – 25, 50 AND 100 MG TABLETS
- MYLAN-ATORVASTATIN – 10, 20, 40 AND 80 MG TABLETS
- MYLAN-AZATHIOPRINE – 50 MG TABLETS

- MOBENOL
- MOBIFLEX
- MODECATE, CONCENTRÉ
- MODULON, COMPRIMÉS
- MOGADON
- MONITAN, COMPRIMÉS
- MONOCOR – 10 MG, COMPRIMÉS
- MONOJECT ULTRA, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE – MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- MONOPRIL
- MORPHINE HP
- MORPHINE SR (SANIS) – 15, 30 ET 60 MG, COMPRIMÉS
- MORPHINE (SULFATE DE), INJECTION
- MORPHINE (SULFATE DE), COMPRIMÉS (BOEHRINGER INGELHEIM)
- M.O.S. – SR
- M.O.S., COMPRIMÉS ET SIROP
- M.O.S. (SULFATE DE), COMPRIMÉS
- MPD, LANCETTES
- MS CONTIN, COMPRIMÉS
- MSD, ASA À ENROBAGE ENTÉROSOLUBLE – 650 MG, COMPRIMÉS
- MS'IR, COMPRIMÉS ET SUPPOSITOIRES
- MUSTARGEN
- MUTAMYCIN
- MYAMBTOL
- MYCIFRADIN, COMPRIMÉS ET SOLUTION ORALE
- MYCIGUENT
- MYCOBUTIN
- MYDRAPRED
- MYDRIACYL
- MYGLUCOHEALTH, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE – MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- MYLAN-ACEBUTOLOL – 100, 200 ET 400 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-ACEBUTOLOL (TYPE S) – 100, 200 ET 400 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-ACYCLOVIR – 200, 400 ET 800 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-ALPRAZOLAM – 0.25, 0.5, 1 ET 2 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-AMIODARONE – 200 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-AMLODIPINE – 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-AMOXICILLIN – 250 ET 500 MG, CAPSULES
- MYLAN-ANASTROZOLE – 1 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-ATENOLOL – 25, 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-ATORVASTATIN – 10, 20, 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-AZATHIOPRINE – 50 MG, COMPRIMÉS

- MYLAN-BACLOFEN - 10 AND 20 MG TABLETS
- MYLAN-BACLOFEN - 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-BECLO AQ NASAL SPRAY
- MYLAN-BECLO AQ, VAPORISATEUR NASAL
- MYLAN-BICALUTAMIDE - 50 MG TABLETS
- MYLAN-BICALUTAMIDE - 50 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-BISOPROLOL - 5 AND 10 MG TABLETS
- MYLAN-BISOPROLOL - 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-BUDESONIDE AQ - 64 AND 100 MCG NASAL SPRAY
- MYLAN-BUDESONIDE AQ - 64 ET 100 MCG, VAPORISATEUR NASAL
- MYLAN-BUPROPION XL - 150 AND 300 MG TABLETS
- MYLAN-BUPROPION XL - 150 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-CANDESARTAN - 4, 8, 16 AND 32 MG TABLETS
- MYLAN-CANDESARTAN - 4, 8, 16 ET 32 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-CANDESARTAN HCTZ - 16/12.5 MG TABLETS
- MYLAN-CANDESARTAN HCTZ - 16/12,5 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-CAPTOPRIL - 12.5, 25, 50 AND 100 MG TABLETS
- MYLAN-CAPTOPRIL - 12,5, 25, 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-CARBAMAZEPINE CR - 200 AND 400 MG SUSTAINED RELEASE TABLETS
- MYLAN-CARBAMAZEPINE CR - 200 ET 400 MG, COMPRIMÉS À LIBÉRATION PROGRESSIVE
- MYLAN-CARVEDILOL - 3.125, 6.25, 12.5 AND 25 MG TABLETS
- MYLAN-CARVEDILOL - 3,125, 6,25, 12,5 ET 25 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-CILAZAPRIL - 1, 2.5 AND 5 MG TABLETS
- MYLAN-CILAZAPRIL - 1, 2,5 ET 5 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-CIMETIDINE - 300, 400, 600 AND 800 MG TABLETS
- MYLAN-CIMETIDINE - 300, 400, 600 ET 800 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-CITALOPRAM - 20 AND 40 MG TABLETS
- MYLAN-CITALOPRAM - 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-CLINDAMYCIN - 150 AND 300 MG TABLETS
- MYLAN-CLINDAMYCIN - 150 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-CLOBETASOL CREAM AND OINTMENT
- MYLAN-CLOBETASOL, CRÈME ET POMMADE
- MYLAN-CLOBETASOL SCALP APPLICATION
- MYLAN-CLOBETASOL, APPLICATION CAPILLAIRE
- MYLAN-CLONAZEPAM - 0.5 AND 2 MG TABLETS
- MYLAN-CLONAZEPAM - 0,5 ET 2 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-CLOPIDOGREL - 75 MG TABLETS
- MYLAN-CLOPIDOGREL - 75 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-DOMPERIDONE - 10 MG TABLETS
- MYLAN-DOMPERIDONE - 10 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-DOXAZOSIN - 1, 2 AND 4 MG TABLETS
- MYLAN-DOXAZOSIN - 1, 2 ET 4 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-EFAVIRENZ - 600 MG TABLETS
- MYLAN-EFAVIRENZ - 600 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-ENALAPRIL - 2.5, 5, 10 AND 20 MG TABLETS
- MYLAN-ENALAPRIL - 2,5, 5, 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-ENTACAPONE - 200 MG TABLETS
- MYLAN-ENTACAPONE - 200 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-ETI-CAL CAREPAC
- MYLAN-ETI-CAL CAREPAC
- MYLAN-FAMOTIDINE - 20 AND 40 MG TABLETS
- MYLAN-FAMOTIDINE - 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-FENOFIBRATE MICRO - 200 MG CAPSULES
- MYLAN-FENOFIBRATE MICRO - 200 MG, CAPSULES
- MYLAN-FLUOXETINE - 10 AND 20 MG CAPSULES
- MYLAN-FLUOXETINE - 10 ET 20 MG, CAPSULES
- MYLAN-FOSINOPRIL - 10 AND 20 MG TABLETS
- MYLAN-FOSINOPRIL - 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-GABAPENTIN - 100, 300 AND 400 MG CAPSULES
- MYLAN-GABAPENTIN - 100, 300 ET 400 MG, CAPSULES
- MYLAN-GABAPENTIN - 600 MG TABLETS
- MYLAN-GABAPENTIN - 600 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-GEMFIBROZIL - 300 MG CAPSULES
- MYLAN-GEMFIBROZIL - 300 MG, CAPSULES
- MYLAN-GEMFIBROZIL - 600 MG TABLETS
- MYLAN-GEMFIBROZIL - 600 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-GLICLAZIDE - 80 MG TABLETS
- MYLAN-GLICLAZIDE - 80 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-GLYBE - 2.5 AND 5 MG TABLETS
- MYLAN-GLYBE - 2,5 ET 5 MG, COMPRIMÉS

- MYLAN-HYDROXYCHLOROQUINE - 200 MG TABLETS
- MYLAN-HYDROXYUREA - 500 MG CAPSULES
- MYLAN-INDAPAMIDE - 1.25 AND 2.5 MG TABLETS
- MYLAN-IRBESARTAN - 75, 150 AND 300 MG TABLETS
- MYLAN-LAMOTRIGINE - 25 AND 150 MG TABLETS
- MYLAN-LISINOPRIL - 5, 10 AND 20 MG TABLETS
- MYLAN-LISINOPRIL HCTZ - 10 MG/12.5 MG, 20 MG/12.5 MG AND 20 MG/25 MG TABLETS
- MYLAN LOSARTAN - 25, 50 AND 100 MG TABLETS
- MYLAN-LOSARTAN HCTZ - 50/12.5, 100/12.5 AND 100/25 MG TABLETS
- MYLAN-LOVASTATIN - 20 AND 40 MG TABLETS
- MYLAN-METFORMIN - 500 AND 850 MG TABLETS
- MYLAN-METOPROLOL (TYPE L) - 25, 50 AND 100 MG TABLETS
- MYLAN-MIRTAZAPINE - 30 MG TABLETS
- MYLAN-NEVIRAPINE - 200 MG TABLETS
- MYLAN-NIFEDIPINE EXTENDED RELEASE - 30 AND 60 MG TABLETS
- MYLAN-NITRO PATCH - 0.2 MG/HR, 0.4 MG/HR, 0.6 MG/HR AND 0.8 MG/HR TRANSDERMAL PATCHES
- MYLAN-NITRO SL - 0.4 MG SPRAY
- MYLAN-OLANZAPINE - 2.5, 5, 7.5, 10 AND 15 MG TABLETS
- MYLAN-OLANZAPINE ODT - 5, 10 AND 15 MG TABLETS
- MYLAN-OMEPRAZOLE - 20 MG CAPSULES
- MYLAN-ONDANSETRON - 4 AND 8 MG TABLETS
- MYLAN-OXYBUTYNIN - 5 MG TABLETS
- MYLAN-PANTOPRAZOLE - 40 MG TABLETS
- MYLAN-PAROXETINE - 10, 20 AND 30 MG TABLETS
- MYLAN-PRAVASTATIN - 10, 20 AND 40 MG TABLETS
- MYLAN-PROPAFENONE - 150 AND 300 MG TABLETS
- MYLAN-QUETIAPINE - 25, 100, 200 AND 300 MG TABLETS
- MYLAN-RABEPRAZOLE - 10 AND 20 MG TABLETS
- MYLAN-RAMIPRIL - 1.25, 2.5, 5 AND 10 MG CAPSULES
- MYLAN-RISPERIDONE - 0.25, 0.5, 1, 2, 3 AND 4 MG TABLETS
- MYLAN-RISPERIDONE ODT - 0.5, 1, 2, 3 AND 4 MG TABLETS
- MYLAN-HYDROXYCHLOROQUINE - 200 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-HYDROXYUREA - 500 MG, CAPSULES
- MYLAN-INDAPAMIDE - 1,25 ET 2,5 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-IRBESARTAN - 75, 150 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-LAMOTRIGINE - 25 ET 150 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-LISINOPRIL - 5, 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-LISINOPRIL HCTZ - 10 MG/12,5 MG, 20 MG/12,5 MG ET 20 MG/25 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN LOSARTAN - 25, 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-LOSARTAN HCTZ - 50/12,5, 100/12,5 ET 100/25 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-LOVASTATIN - 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-METFORMIN - 500 ET 850 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-METOPROLOL (TYPE L) - 25, 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-MIRTAZAPINE - 30 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-NEVIRAPINE - 200 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-NIFEDIPINE - 30 ET 60 MG, COMPRIMÉS À LIBÉRATION PROLONGÉE
- MYLAN-NITRO PATCH - 0,2 MG/HR, 0,4 MG/HR, 0,6 MG/HR ET 0,8 MG/HR, TIMBRES TRANSDERMIQUES
- MYLAN-NITRO SL - 0,4 MG, VAPORISATEUR
- MYLAN-OLANZAPINE - 2,5, 5, 7,5, 10 ET 15 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-OLANZAPINE ODT - 5, 10 ET 15 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-OMEPRAZOLE - 20 MG, CAPSULES
- MYLAN-ONDANSETRON - 4 ET 8 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-OXYBUTYNIN - 5 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-PANTOPRAZOLE - 40 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-PAROXETINE - 10, 20 ET 30 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-PRAVASTATIN - 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-PROPAFENONE - 150 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-QUETIAPINE - 25, 100, 200 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-RABEPRAZOLE - 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-RAMIPRIL - 1,25, 2,5, 5 ET 10 MG, CAPSULES
- MYLAN-RISPERIDONE - 0,25, 0,5, 1, 2, 3 ET 4 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-RISPERIDONE ODT - 0,5, 1, 2, 3 ET 4 MG, COMPRIMÉS

- MYLAN-ROSUVASTATIN – 10, 20 AND 40 MG TABLETS
- MYLAN-SELEGILINE – 5 MG TABLETS
- MYLAN-SERTRALINE – 25, 50 AND 100 MG CAPSULES
- MYLAN-SIMVASTATIN – 5, 10, 20, 40 AND 80 MG TABLETS
- MYLAN-SOTALOL – 80 AND 160 MG TABLETS
- MYLAN-TAMOXIFEN – 10 AND 20 MG TABLETS
- MYLAN-TAMSULOSIN – 0.4 MG CAPSULES
- MYLAN-TELMISARTAN – 40 AND 80 MG TABLETS
- MYLAN-TELMISARTAN HCTZ – 80/12.5 AND 80/25 MG TABLETS
- MYLAN-TERAZOSIN – 1, 2, 5 AND 10 MG TABLETS
- MYLAN-TERBINAFINE – 250 MG TABLETS
- MYLAN-TOPIRAMATE – 25, 100 AND 200 MG TABLETS
- MYLAN-TRAZODONE – 50 AND 100 MG TABLETS
- MYLAN-VALACYCLOVIR – 500 MG TABLETS
- MYLAN-VALSARTAN – 40, 80, 160 AND 320 MG TABLETS
- MYLAN-VALSARTAN HCTZ – 80/12.5, 160/12.5, 160/25, 320/12.5, 320/25 MG TABLETS
- MYLAN-VENLAFAXINE XR – 37.5, 75 AND 150 MG EXTENDED RELEASE CAPSULES
- MYLAN-VERAPAMIL – 80 AND 120 MG TABLETS
- MYLAN-VERAPAMIL SR – 120, 180 AND 240 MG TABLETS
- MYLAN-WARFARIN – 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7.5 AND 10 MG TABLETS
- MYLAN-ZOPICLONE – 5 AND 7.5 MG TABLETS
- MYLERAN
- MYL-LETROZOLE – 2.5 MG TABLETS
- MYL-RANITIDINE – 150 AND 300 MG TABLETS
- MYOCHRYSINE – 10 MG/ML, 25 MG/ML AND 50 MG/ML INJECTION
- MYSOLINE TABLETS AND PEDIATRIC CHEWABLE TABLETS
- NADOSTINE ORAL TABLETS
- NALCROM – 100 MG CAPSULES
- NALFON TABLETS AND CAPSULES
- NAPROSYN SR
- NAPROSYN TABLETS AND SUSPENSION
- NAPROXEN – 500 MG SUPPOSITORIES
- NAPROXEN (SANIS) – 250, 375 AND 500 MG TABLETS
- NARDIL
- MYLAN-ROSUVASTATIN – 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-SELEGILINE – 5 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-SERTRALINE – 25, 50 ET 100 MG, CAPSULES
- MYLAN-SIMVASTATIN – 5, 10, 20, 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-SOTALOL – 80 ET 160 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-TAMOXIFEN – 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-TAMSULOSIN – 0,4 MG, CAPSULES
- MYLAN-TELMISARTAN – 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-TELMISARTAN HCTZ – 80/12,5 ET 80/25 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-TERAZOSIN – 1, 2, 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-TERBINAFINE – 250 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-TOPIRAMATE – 25, 100 ET 200 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-TRAZODONE – 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-VALACYCLOVIR – 500 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-VALSARTAN – 40, 80, 160 ET 320 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-VALSARTAN HCTZ – 80/12,5, 160/12,5, 160/25, 320/12,5 ET 320/25 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-VENLAFAXINE XR – 37,5, 75 ET 150 MG, CAPSULES À LIBÉRATION PROLONGÉE
- MYLAN-VERAPAMIL – 80 ET 120 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-VERAPAMIL SR – 120, 180 ET 240 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-WARFARIN – 1, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7,5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- MYLAN-ZOPICLONE – 5 ET 7,5 MG, COMPRIMÉS
- MYLERAN
- MYL-LETROZOLE – 2,5 MG, COMPRIMÉS
- MYL-RANITIDINE – 150 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- MYOCHRYSINE – 10 MG/ML, 25 MG/ML ET 50 MG/ML, INJECTION
- MYSOLINE, COMPRIMÉS ET COMPRIMÉS MASTICABLES PÉDIATRIQUES
- NADOSTINE, COMPRIMÉS ORAUX
- NALCROM – 100 MG, CAPSULES
- NALFON, COMPRIMÉS ET CAPSULES
- NAPROSYN SR
- NAPROSYN, COMPRIMÉS ET SUSPENSION
- NAPROXEN – 500 MG, SUPPOSITOIRES
- NAPROXEN (SANIS) – 250, 375 ET 500 MG, COMPRIMÉS
- NARDIL

- NASACORT AQ – NASAL SPRAY
- NASACORT NASAL INHALER
- NASONEX – 0.05% AQUEOUS NASAL SPRAY
- NATULAN
- NAVANE
- NAVELBINE
- NAXEN TABLETS
- NEEDLES AND SYRINGES WHERE SUPPORTED BY CLAIMS FOR INJECTABLES
- NEODECADRON
- NEO-MEDROL ACNE LOTION
- NEOSPORIN – OINTMENT AND IRRIGATION SOLUTION
- NERISONE CREAM, OILY CREAM AND OINTMENT-NEULEPTIL CAPSULES AND ORAL DROPS
- NEURONTIN
- NEUTREXIN
- NEXT CHOICE (COBALT) – 0.75 MG TABLETS TO A MAXIMUM OF 3 TREATMENTS (6 TABLETS) PER BENEFIT YEAR
- NIFEDIPINE (AA PHARMA) – 5 AND 10 MG CAPSULES
- NITOMAN TABLETS
- NITRO-DUR
- NITROFURANTOIN – 50 AND 100 MG TABLETS
- NITROFURANTOIN (AA PHARMA) – 50 MG TABLETS
- NITROLINGUAL SPRAY AND PUMP SPRAY
- NITROL OINTMENT
- NITROSTAT
- NOLVADEX-D
- NORITATE TOPICAL CREAM
- NORPACE
- NORVASC
- NORVENTYL CAPSULES
- NORVIR – 80 MG/ML SOLUTION
- NORVIR – 100 MG TABLETS
- NORVIR SEC – 100 MG SOFT ELASTIC CAPSULES
- NOVA MAX BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS – TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR
- NOVA MAX PLUS KETONE TEST STRIPS
- NOVAMILOR
- NOVAMOXIN CAPSULES, SUSPENSION AND CHEWABLE TABLETS
- NOVANTRONE
- NOVO-5-ASA
- NOVO-5-ASA – 400 MG TABLETS
- NASACORT AQ, VAPORISATEUR NASAL POUR SOLUTION AQUEUSE
- NASACORT, INHALATEUR NASAL
- NASONEX – 0.05 %, VAPORISATEUR NASAL POUR SOLUTION AQUEUSE
- NATULAN
- NAVANE
- NAVELBINE
- NAXEN, COMPRIMÉS
- AIGUILLES ET SERINGUES (UNE DEMANDE D'INDEMNITÉ POUR PRODUITS INJECTABLES DOIT ÊTRE PRÉSENTÉE)
- NÉODÉCADRON
- NÉO-MÉDROL, LOTION POUR ACNÉ
- NEOSPORIN – POMMADE ET SOLUTION POUR IRRIGATION
- NÉRISONE, CRÈME, CRÈME HUILEUSE ET POMMADE
- NEULEPTIL, CAPSULES ET GOUTTES ORALES
- NEURONTIN
- NEUTREXIN
- NEXT CHOICE (COBALT) – 0,75 MG, COMPRIMÉS – MAXIMUM DE 3 TRAITEMENTS (6 COMPRIMÉS) PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- NIFEDIPINE (AA PHARMA) – 5 ET 10 MG, CAPSULES
- NITOMAN, COMPRIMÉS
- NITRO-DUR
- NITROFURANTOIN – 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- NITROFURANTOIN (AA PHARMA) – 50 MG, COMPRIMÉS
- NITROLINGUAL, VAPORISATEUR ET NÉBULISEUR
- NITROL, POMMADE
- NITROSTAT
- NOLVADEX-D
- NORITATE, CRÈME TOPIQUE
- NORPACE
- NORVASC
- NORVENTYL, CAPSULES
- NORVIR – 80 MG/ML, SOLUTION
- NORVIR – 100 MG, COMPRIMÉS
- NORVIR SEC – 100 MG, CAPSULES ÉLASTIQUES MOLLES
- NOVA MAX, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE – MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- NOVA MAX PLUS (KETONE), BANDELETTES
- NOVAMILOR
- NOVAMOXIN, CAPSULES, SUSPENSION ET COMPRIMÉS MASTICABLES
- NOVANTRONE
- NOVO-5-ASA
- NOVO-5-ASA – 400 MG, COMPRIMÉS

- NOVO-ACEBUTOLOL – 100, 200 AND 400 MG TABLETS
- NOVO-ACYCLOVIR – 200, 400 AND 800 MG TABLETS
- NOVO-AMIODARONE – 200 MG – TABLETS
- NOVO-ATENOL – 25, 50 AND 100 MG TABLETS
- NOVO-ATORVASTATIN – 10, 20, 40 AND 80 MG TABLETS
- NOVO-AZATHIOPRINE – 50 MG TABLETS
- NOVO-BICALUTAMIDE – 50 MG TABLETS
- NOVO-BISOPROLOL – 5 AND 10 MG TABLETS
- NOVO-BROMAZEPAM TABLETS
- NOVO-BUPROPION SR – 150 MG TABLETS
- NOVO-BUSPIRONE
- NOVO-CAPTORIL – 6.25 MG, 12.5 MG, 25 MG, 50 MG, 100 MG – TABLETS
- NOVO-CEFADROXIL – 500 MG CAPSULES
- NOVO-CEFAZOLIN – 1 G INJECTION
- NOVO-CHLORHYDRATE
- NOVO-CHLOROQUINE
- NOVO-CILAZAPRIL – 1, 2.5 AND 5 MG TABLETS
- NOVO-CILAZAPRIL/HCTZ – 5/12.5 MG TABLETS
- NOVO-CIMETINE – 300, 400, 600 AND 800 MG TABLETS
- NOVO-CLOBAZAM – 10 MG TABLETS
- NOVO-CLOBETASOL 0.05% – CREAM AND OINTMENT
- NOVO-CLONAZEPAM – 0.5 MG AND 2 MG – TABLETS
- NOVO-CLONIDINE – 0.025, 0.1 AND 0.2 MG TABLETS
- NOVO-CLOPAMINE – 25 MG TABLETS
- NOVO-CLOXIN CAPSULES AND SOLUTION
- NOVO-DIAGNOSTIC BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS – TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR
- NOVO-DIFENAC SR
- NOVO-DIFENAC TABLETS
- NOVO-DILTAZEM
- NOVO-DILTAZEM CD – 120, 180, 240 AND 300 MG CONTROLLED DELIVERY CAPSULES
- NOVO-DILTIAZEM ER – 120, 180, 240, 300 AND 360 MG CAPSULES
- NOVO-DIVALPROEX – 125 MG, 250 MG, 500 MG – ENTERIC COATED TABLETS
- NOVO-DOXAZOSIN – 1, 2 AND 4 MG TABLETS
- NOVO-DOXEPIN
- NOVO-DOXYLIN
- NOVO-ENALAPRIL – 2.5, 5, 10 AND 20 MG TABLETS
- NOVO-ACEBUTOLOL – 100, 200 ET 400 MG, COMPRIMÉS
- NOVO-ACYCLOVIR – 200, 400 ET 800 MG, COMPRIMÉS
- NOVO-AMIODARONE – 200 MG – COMPRIMÉS
- NOVO-ATENOL – 25, 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- NOVO-ATORVASTATIN – 10, 20, 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- NOVO-AZATHIOPRINE – 50 MG, COMPRIMÉS
- NOVO-BICALUTAMIDE – 50 MG, COMPRIMÉS
- NOVO-BISOPROLOL – 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- NOVO-BROMAZEPAM, COMPRIMÉS
- NOVO-BUPROPION SR – 150 MG, COMPRIMÉS
- NOVO-BUSPIRONE
- NOVO-CAPTORIL – 6.25 MG, 12.5 MG, 25 MG, 50 MG, 100 MG – COMPRIMÉS
- NOVO-CEFADROXIL – 500 MG, CAPSULES
- NOVO-CEFAZOLIN – 1 G, INJECTION
- NOVO-CHLORHYDRATE
- NOVO-CHLOROQUINE
- NOVO-CILAZAPRIL – 1, 2,5 ET 5 MG, COMPRIMÉS
- NOVO-CILAZAPRIL/HCTZ – 5/12,5 MG, COMPRIMÉS
- NOVO-CIMETINE – 300, 400, 600 ET 800 MG, COMPRIMÉS
- NOVO-CLOBAZAM – 10 MG, COMPRIMÉS
- NOVO-CLOBETASOL 0,05 % – CRÈME ET POMMADE
- NOVO-CLONAZEPAM – 0,5 MG ET 2 MG, COMPRIMÉS
- NOVO-CLONIDINE – 0,025, 0,1 ET 0,2 MG, COMPRIMÉS
- NOVO-CLOPAMINE – 25 MG, COMPRIMÉS
- NOVO-CLOXIN, CAPSULES ET SOLUTION
- NOVO-DIAGNOSTIC, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE – MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- NOVO-DIFENAC SR
- NOVO-DIFENAC, COMPRIMÉS
- NOVO-DILTAZEM
- NOVO-DILTAZEM CD – 120, 180, 240 ET 300 MG, CAPSULES À LIBÉRATION CONTRÔLÉE
- NOVO-DILTIAZEM ER – 120, 180, 240, 300 ET 360 MG, CAPSULES
- NOVO-DIVALPROEX – 125 MG, 250 MG, 500 MG – COMPRIMÉS À ENROBAGE ENTÉROSOLUBLE
- NOVO-DOXAZOSIN – 1, 2 ET 4 MG, COMPRIMÉS
- NOVO-DOXEPIN
- NOVO-DOXYLIN
- NOVO-ENALAPRIL – 2,5, 5, 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS

- NOVO-ENALAPRIL/HCTZ - 5/12.5 AND 10/25 MG TABLETS
 - NOVO-ETIDRONATECAL - 400/500 MG TABLETS
 - NOVO-FAMOTIDINE
 - NOVO-FENOFIBRATE - 100 MG CAPSULES
 - NOVO-FENOFIBRATE MICRONIZED - 67 AND 200 MG CAPSULES
 - NOVO-FENOFIBRATE-S - 100 AND 160 MG TABLETS
 - NOVO-FLUOXETINE
 - NOVO-FLURAZINE
 - NOVO-FLURPROFEN
 - NOVO-FLUTAMIDE - 250 MG TABLETS
 - NOVO-FLUVOXAMINE - 50 MG, 100 MG - TABLETS
 - NOVO-FOSINOPRIL - 10 AND 20 MG TABLETS

 - NOVO-GABAPENTIN - 100, 300 AND 400 MG CAPSULES
 - NOVO-GABAPENTIN - 600 MG TABLETS
 - NOVO-GEMFIBROZIL - 300 MG CAPSULES
 - NOVO-GEMFIBROZIL TABLETS
 - NOVO-GLICLAZIDE - 80 MG TABLETS
 - NOVO-GLUCOSE BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS - TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR
 - NOVO-HYDROXYZIN
 - NOVO-HYLAZIN - 10 AND 50 MG TABLETS
 - NOVO-INDAPAMIDE - 2.5 MG TABLETS
 - NOVO-IPRAMIDE INHALATION SOLUTION TO A MAXIMUM OF 4,400 DOSES PER BENEFIT YEAR
 - NOVO-KETOCONAZOLE - 200 MG - TABLETS
 - NOVO-KETO SUPPOSITORIES
 - NOVO-LEVOCARBIDOPA - 10 MG/100 MG, 25 MG/100 MG AND 25 MG/250 MG TABLETS
 - NOVO-LEXIN TABLETS AND SUSPENSION
 - NOVOLIN
 - NOVO-LISINOPRIL (TYPE P) - 5, 10 AND 20 MG TABLETS
 - NOVO-LISINOPRIL (TYPE Z) - 5, 10 AND 20 MG TABLETS
 - NOVO-LISINOPRIL/HCTZ (TYPE P) - 10/12.5, 20/12.5 AND 20/25 MG TABLETS
 - NOVO-LISINOPRIL/HCTZ (TYPE Z) - 10/12.5, 20/12.5 AND 20/25 MG TABLETS
 - NOVO-LORAZEM
 - NOVO-LOVASTATIN - 20 AND 40 MG TABLETS

 - NOVO-MAPROTILINE
 - NOVO-MEDRONE - 2.5, 5 AND 10 MG TABLETS

 - NOVO-METFORMIN
 - NOVO-METHACIN - 25 AND 50 MG CAPSULES
 - NOVO-METHYLPHENIDATE ER-C - 18, 27, 36 AND 54 MG TABLETS
- NOVO-ENALAPRIL/HCTZ - 5/12,5 ET 10/25 MG, COMPRIMÉS
 - NOVO-ETIDRONATECAL - 400/500 MG, COMPRIMÉS
 - NOVO-FAMOTIDINE
 - NOVO-FENOFIBRATE - 100 MG, CAPSULES
 - NOVO-FENOFIBRATE (MICRONISÉ) - 67 ET 200 MG, CAPSULES
 - NOVO-FENOFIBRATE-S - 100 ET 160 MG, COMPRIMÉS
 - NOVO-FLUOXETINE
 - NOVO-FLURAZINE
 - NOVO-FLURPROFEN
 - NOVO-FLUTAMIDE - 250 MG, COMPRIMÉS
 - NOVO-FLUVOXAMINE - 50 MG, 100 MG - COMPRIMÉS
 - NOVO-FOSINOPRIL - 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
 - NOVO-GABAPENTIN - 100, 300 ET 400 MG, CAPSULES
 - NOVO-GABAPENTIN - 600 MG, COMPRIMÉS
 - NOVO-GEMFIBROZIL - 300 MG, CAPSULES
 - NOVO-GEMFIBROZIL, COMPRIMÉS
 - NOVO-GLICLAZIDE - 80 MG, COMPRIMÉS
 - NOVO-GLUCOSE, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE - MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
 - NOVO-HYDROXYZIN
 - NOVO-HYLAZIN - 10 ET 50 MG, COMPRIMÉS
 - NOVO-INDAPAMIDE - 2,5 MG, COMPRIMÉS
 - NOVO-IPRAMIDE, SOLUTION POUR INHALATION, MAXIMUM DE 4 400 DOSES PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
 - NOVO-KÉTOCONAZOLE, 200 MG, COMPRIMÉS
 - NOVO-KETO, SUPPOSITOIRES
 - NOVO-LEVOCARBIDOPA - 10 MG/100 MG, 25 MG/100 MG ET 25 MG/250 MG, COMPRIMÉS
 - NOVO-LEXIN, COMPRIMÉS ET SUSPENSION
 - NOVOLIN
 - NOVO-LISINOPRIL (TYPE P) - 5, 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
 - NOVO-LISINOPRIL (TYPE Z) - 5, 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
 - NOVO-LISINOPRIL/HCTZ (TYPE P) - 10/12,5, 20/12,5 ET 20/25 MG, COMPRIMÉS
 - NOVO-LISINOPRIL/HCTZ (TYPE Z) - 10/12,5, 20/12,5 ET 20/25 MG, COMPRIMÉS
 - NOVO-LORAZEM
 - NOVO-LOVASTATIN - 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
 - NOVO-MAPROTILINE
 - NOVO-MEDRONE - 2,5, 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
 - NOVO-METFORMIN
 - NOVO-METHACIN - 25 ET 50 MG, CAPSULES
 - NOVO-METHYLPHENIDATE ER-C - 18, 27, 36 ET 54 MG, COMPRIMÉS

- NOVO-MEXILETINE CAPSULES
- NOVO-MIRTAZAPINE – 30 MG TABLETS
- NOVO-MIRTAZAPINE OD – 15, 30 AND 45 MG TABLETS
- NOVO-MOCLOBEMIDE – 100 MG, 150 MG AND 300 MG – TABLETS
- NOVO-MORPHINE SR – 15, 30, 60, 100 AND 200 MG TABLETS
- NOVO-NIZATIDINE – 150 MG AND 300 MG – CAPSULES
- NOVO-NORTRIPTYLINE
- NOVO-OLANZAPINE – 2.5, 5, 7.5, 10 AND 15 MG TABLETS
- NOVO-OLANZAPINE OD – 5, 10 AND 15 MG ORALLY DISINTEGRATING TABLETS
- NOVO-OMEPRAZOLE – 20 MG TABLETS
- NOVO-ONDANSETRON – 4 AND 8 MG TABLETS

- NOVO-OXYBUTYNIN TABLETS
- NOVO-PANTOPRAZOLE – 40 MG TABLETS
- NOVO-PERIDOL – 0.5, 1, 2, 10 AND 20 MG TABLETS
- NOVO-PERIDOL TABLETS AND ORAL SOLUTION
- NOVO-PINDOL
- NOVO-PIROCAM
- NOVO-PRANOL
- NOVO-PRAVASTATIN – 10, 20 AND 40 MG TABLETS
- NOVO-PRAZIN
- NOVO-PREDNISONE
- NOVO-PROFEN – 600 MG TABLETS
- NOVO-QUETIAPINE – 25, 100, 150, 200 AND 300 MG TABLETS
- NOVO-QUININE
- NOVO-RAMIPRIL – 2.5, 5 AND 10 MG CAPSULES
- NOVO-RANIDINE – 15 MG/ML ORAL SOLUTION

- NOVO-RANIDINE – 150 AND 300 MG TABLETS

- NOVORAPID – 100 UNIT/ML 10 ML VIAL
- NOVORAPID – 100 UNIT/ML 3 ML PENFILL

- NOVORAPID FLEXTOUCH – 100 U/ML INJECTION
- NOVO-RESERPINE
- NOVO-RISPERIDONE – 0.25, 0.5, 1, 2, 3 AND 4 MG TABLETS
- NOVO-RYTHRO
- NOVO-RYTHRO ESTOLATE CAPSULES AND LIQUID
- NOVO-RYTHRO ETHYLSUCCINATE
- NOVO-RYTHRO STEARATE
- NOVO-SELEGILINE – 5 MG TABLETS

- NOVO-MEXILETINE, CAPSULES
- NOVO-MIRTAZAPINE – 30 MG, COMPRIMÉS
- NOVO-MIRTAZAPINE OD – 15, 30 ET 45 MG, COMPRIMÉS
- NOVO-MOCLOBÉMIDE – 100 MG, 150 MG ET 300 MG, COMPRIMÉS
- NOVO-MORPHINE SR – 15, 30, 60, 100 ET 200 MG, COMPRIMÉS
- NOVO-NIZATIDINE – 150 MG ET 300 MG, CAPSULES
- NOVO-NORTRIPTYLINE
- NOVO-OLANZAPINE – 2,5, 5, 7,5, 10 ET 15 MG, COMPRIMÉS
- NOVO-OLANZAPINE OD – 5, 10 ET 15 MG, COMPRIMÉS À DISSOLUTION ORALE
- NOVO-OMEPRAZOLE – 20 MG, COMPRIMÉS
- NOVO-ONDANSETRON – 4 ET 8 MG, COMPRIMÉS
- NOVO-OXYBUTYNIN, COMPRIMÉS
- NOVO-PANTOPRAZOLE – 40 MG, COMPRIMÉS
- NOVO-PERIDOL – 0,5, 1, 2, 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- NOVO-PERIDOL, COMPRIMÉS ET SOLUTION ORALE
- NOVO-PINDOL
- NOVO-PIROCAM
- NOVO-PRANOL
- NOVO-PRAVASTATIN – 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- NOVO-PRAZIN
- NOVO-PREDNISONE
- NOVO-PROFEN – 600 MG, COMPRIMÉS
- NOVO-QUETIAPINE – 25, 100, 150, 200 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- NOVO-QUININE
- NOVO-RAMIPRIL – 2,5, 5 ET 10 MG, CAPSULES

- NOVO-RANIDINE – 15 MG/ML, SOLUTION ORALE
- NOVO-RANIDINE – 150 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- NOVORAPID – 100 UNITÉS/ML, STYLO INJECTEUR, 3 ML
- NOVORAPID – 100 UNITÉS/ML, AMPOULE, 10 ML
- NOVORAPID FLEXTOUCH – 100 U/ML, INJECTION
- NOVO-RESERPINE
- NOVO-RISPERIDONE – 0,25, 0,5, 1, 2, 3 ET 4 MG, COMPRIMÉS
- NOVO-RYTHRO
- NOVO-RYTHRO ESTOLATE, CAPSULES ET LIQUIDE
- NOVO-RYTHRO ETHYLSUCCINATE
- NOVO-RYTHRO STEARATE
- NOVO-SELEGILINE – 5 MG, COMPRIMÉS

- NOVO-SEMIDE
 - NOVO-SERTRALINE - 25 MG, 50 MG AND 100 MG - CAPSULES
 - NOVO-SIMVASTATIN - 5, 10, 20, 40 AND 80 MG TABLETS
 - NOVO-SOTALOL - 80 AND 160 MG TABLETS
 - NOVO-SPIROTON
 - NOVO-SPIROZINE
 - NOVO-SUCRALATE
 - NOVO-SUNDAC
 - NOVO-TAMOXIFEN
 - NOVO-TAMSULOSIN - 0.4 MG CAPSULES
 - NOVO-TEMAZEPAM CAPSULES
 - NOVO-TERAZOSIN - 1, 2, 5 AND 10 MG TABLETS
 - NOVO-TERBINAFINE - 250 MG TABLETS
 - NOVO-TETRA - 250 MG TABLETS AND 125 MG/ML SUSPENSION
 - NOVO-THEOPHYL TABLETS
 - NOVO-TIAPROFENIC TABLETS
 - NOVO-TIMOL TABLETS
 - NOVO-TOPIRAMATE - 25, 100 AND 200 MG TABLETS
 - NOVO-TRIAMZIDE
 - NOVO-TRIMEL
 - NOVO-TRIMEL D.S.
 - NOVO-TRIPHYL - 100 AND 300 MG TABLETS
 - NOVO-TRIPRAMINE
 - NOVO-VALACYCLOVIR - 500 MG TABLETS
 - NOVO-VALPROIC
 - NOVO-VALPROIC CAPSULES
 - NOVO-VERAMIL - 240 MG SUSTAINED RELEASE TABLETS
 - NOVO-VERAMIL TABLETS
 - NOVO-WARFARIN - 1, 2, 2.5, 3, 4 AND 5 MG TABLETS
 - NOVO-ZOPICLONE - 5 AND 7.5 MG TABLETS
 - NOZINAN TABLETS, LIQUID AND ORAL DROPS

 - OCCLUCORT
 - OCTOSTIM - 1.5 MG/ML NASAL SPRAY

 - OCTREOTIDE ACETATE OMEGA - 50, 100, 200 AND 500 MCG/ML INJECTION
 - OCUFEN OPHTHALMIC SOLUTION
 - OGEN
 - OLANZAPINE (SANIS) - 2.5, 5, 7.5, 10 AND 15 MG TABLETS
 - OLANZAPINE ODT (SANIS) - 5, 10 AND 15 MG TABLETS
 - OLANZAPINE ODT (SIVEM) - 5, 10 AND 15 MG TABLETS
 - OLESTYR ORAL POWDER
 - OMEPRAZOLE (SANIS) - 20 MG CAPSULES
 - OMEPRAZOLE (SIVEM) - 20 MG CAPSULES
- NOVO-SEMIDE
 - NOVO-SERTRALINE - 25 MG, 50 MG ET 100 MG - CAPSULES
 - NOVO-SIMVASTATIN - 5, 10, 20, 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
 - NOVO-SOTALOL - 80 ET 160 MG, COMPRIMÉS
 - NOVO-SPIROTON
 - NOVO-SPIROZINE
 - NOVO-SUCRALATE
 - NOVO-SUNDAC
 - NOVO-TAMOXIFEN
 - NOVO-TAMSULOSIN - 0,4 MG, CAPSULES
 - NOVO-TEMAZEPAM, CAPSULES
 - NOVO-TERAZOSIN - 1, 2, 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
 - NOVO-TERBINAFINE - 250 MG, COMPRIMÉS
 - NOVO-TETRA - 250 MG, COMPRIMÉS ET 125 MG/ML, SUSPENSION
 - NOVO-THEOPHYL, COMPRIMÉS
 - NOVO-TIAPROFENIC, COMPRIMÉS
 - NOVO-TIMOL, COMPRIMÉS
 - NOVO-TOPIRAMATE - 25, 100 ET 200 MG, COMPRIMÉS
 - NOVO-TRIAMZIDE
 - NOVO-TRIMEL
 - NOVO-TRIMEL D.S.
 - NOVO-TRIPHYL - 100 ET 300 MG, COMPRIMÉS
 - NOVO-TRIPRAMINE
 - NOVO-VALACYCLOVIR - 500 MG, COMPRIMÉS
 - NOVO-VALPROIC
 - NOVO-VALPROIC, CAPSULES
 - NOVO-VERAMIL - 240 MG, COMPRIMÉS À LIBÉRATION PROGRESSIVE
 - NOVO-VERAMIL, COMPRIMÉS
 - NOVO-WARFARIN - 1, 2, 2.5, 3, 4 ET 5 MG, COMPRIMÉS
 - NOVO-ZOPICLONE - 5 ET 7,5 MG, COMPRIMÉS
 - NOZINAN, COMPRIMÉS, LIQUIDE ET GOUTTES ORALES

 - OCCLUCORT
 - OCTOSTIM - 1,5 MG/ML, VAPORISATEUR NASAL

 - OCTREOTIDE ACETATE OMEGA - 50, 100, 200 ET 500 MCG/ML, INJECTION
 - OCUFEN, SOLUTION OPHTALMIQUE
 - OGEN
 - OLANZAPINE (SANIS) - 2,5, 5, 7,5, 10 ET 15 MG, COMPRIMÉS
 - OLANZAPINE ODT (SANIS) - 5, 10 ET 15 MG, COMPRIMÉS
 - OLANZAPINE ODT (SIVEM) - 5, 10 ET 15 MG, COMPRIMÉS
 - OLESTYR, POUDRE ORALE
 - OMEPRAZOLE (SANIS) - 20 MG, CAPSULES
 - OMEPRAZOLE (SIVEM) - 20 MG, CAPSULES

- ONBREZ BREEZHALER – 75 MCG INHALATION CAPSULE – TO A MAXIMUM OF 1,460 DOSES PER BENEFIT YEAR
- ONCOTICE – 800 MIU – POWDER
- ONCOVIN
- ONDANSETRON (AA PHARMA) – 4 MG/5 ML ORAL SOLUTION
- ONDANSETRON-ODAN – 4 AND 8 MG TABLETS
- ONE TOUCH DELICA LANCETS
- ONE TOUCH TEST STRIPS – TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR
- ONE TOUCH ULTRA BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR
- ONE TOUCH VERIO BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS – TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR
- OPTHOCORT
- OPTICHAMBER
- OPTICHAMBER DIAMOND
- OPTIHALER
- OPTIMYXIN PLUS
- ORACORT DENTAL PASTE
- ORAP
- ORINASE
- ORTHO-CEPT
- ORTHO 0.5/35
- ORTHO 1/35
- ORTHO 7/7/7
- ORUDIS E
- OSTAC CAPSULES
- OVIMA 21 AND 28 – 0.15/0.03 MG TABLETS
- OWEN MUMFORD UNIFINE PENTIPS – 29 GAUGE, 12 MM (1/2") PEN NEEDLES
- OWEN MUMFORD UNIFINE PENTIPS – 31 GAUGE, 6 MM (1/4") AND 8 MM (5/16") PEN NEEDLES
- OXEZE TURBUHALER – 6 AND 12 MCG/ METERED DOSE
- OXSORALEN CAPSULES AND LIQUID
- OXSORALEN ULTRA
- OXYBUTIN – 5 MG TABLETS
- OXYBUTYNIN (SANIS) – 5 MG TABLETS
- OXYCODONE/ACET (SANIS) – 5/325 MG TABLETS
- OXYGEN
- PACIS – 120 MG/2 ML LIQUID
- PALUDRINE
- PANCREASE MT
- PANCREATIN
- PANTOLOC – 40 MG TABLETS
- PANTOPRAZOLE (SIVEM) – 40 MG TABLETS
- ONBREZ BREEZHALER – 75 MCG, CAPSULE POUR INHALATION, MAXIMUM DE 1 460 DOSES PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- ONCOTICE – 800 MIU, POUDRE
- ONCOVIN
- ONDANSETRON (AA PHARMA) – 4 MG/5 ML, SOLUTION ORALE
- ONDANSETRON-ODAN – 4 ET 8 MG, COMPRIMÉS
- ONE TOUCH DELICA, LANCETTES
- ONE TOUCH, BÂTONNETS D'ÉPREUVE – MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- ONE TOUCH, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE, MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- ONE TOUCH VERIO, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE – MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- OPTHOCORT
- OPTICHAMBER
- OPTICHAMBER DIAMOND
- OPTIHALER
- OPTIMYXIN PLUS
- ORACORT, PÂTE POUR USAGE DENTAIRE
- ORAP
- ORINASE
- ORTHO-CEPT
- ORTHO 0,5/35
- ORTHO 1/35
- ORTHO 7/7/7
- ORUDIS E
- OSTAC, CAPSULES
- OVIMA 21 ET 28 – 0,15/0,03 MG, COMPRIMÉS
- OWEN MUMFORD, POINTES DE STYLOS UNIFINE PENTIPS DE CALIBRE 29, 12 MM (1/2")
- OWEN MUMFORD, POINTES DE STYLOS UNIFINE PENTIPS DE CALIBRE 31, 6 MM (1/4") ET 8 MM (5/16")
- OXEZE TURBUHALER – 6 ET 12 MCG/DOSEUR
- OXSORALEN, CAPSULES ET LIQUIDE
- OXSORALEN ULTRA
- OXYBUTIN – 5 MG, COMPRIMÉS
- OXYBUTYNIN (SANIS) – 5 MG, COMPRIMÉS
- OXYCODONE/ACET (SANIS) – 5/325 MG, COMPRIMÉS
- OXYGÈNE
- PACIS – 120 MG/2 ML, LIQUIDE
- PALUDRINE
- PANCREASE MT
- PANCRÉATINE
- PANTOLOC – 40 MG, COMPRIMÉS
- PANTOPRAZOLE (SIVEM) – 40 MG, COMPRIMÉS

- PARAPLATIN
- PARAPLATIN-AQ
- PARIET – 10 AND 20 MG TABLETS
- PARNATE
- PAROXETINE (SANIS) – 10, 20 AND 30 MG TABLETS
- PARSITAN
- PAT-RABEPRAZOLE – 10 AND 20 MG TABLETS

- PAXIL
- PEDIAPRED ORAL LIQUID
- PENLET PLUS ADJUSTABLE BLOOD SAMPLER STRIPS
- PENTASA – 500 MG AND 1 G DELAYED RELEASE TABLETS
- PENTASA – 1 G/100 ML AND 4 G/100 ML ENEMA AND 1 G SUPPOSITORIES
- PENTOXIFYLLINE SR (AA PHARMA) – 400 MG TABLETS
- PEN-VEE – 350 MG/5 ML SUSPENSION
- PEPCID TABLETS
- PERCOCET
- PERCOCET-DEMI
- PERCODAN
- PERCODAN-DEMI
- PERPHENAZINE (AA PHARMA) – 2, 4, 8 AND 16 MG TABLETS
- PERSANTINE – 50, 75 AND 100 MG TABLETS
- PHARMORUBICIN RDF
- PHARMORUBICIN PFS
- PHENOBARB – 15, 30, 60 AND 100 MG TABLETS
- PHENOBARB ELIXIR
- PHENOBARBITAL TABLETS (ICN)
- PHL-AMLODIPINE – 5 AND 10 MG TABLETS
- PHOSPHATE-SANDOZ TABLETS
- PHOSPHOLINE IODIDE
- PILOPINE HS
- PIPORTIL L4
- PLAN B – 0.75 MG TABLETS TO A MAXIMUM OF 3 TREATMENTS (6 TABLETS) PER BENEFIT YEAR
- PLAQUENIL SULFATE
- PLATINOL-AQ
- PLAVIX – 75 MG TABLETS
- PLENDIL
- PMS-AMANTADINE
- PMS-AMIODARONE – 100 AND 200 MG TABLETS
- PMS-AMITRIPTYLINE – 10, 25 AND 50 MG TABLETS
- PMS-AMLODIPINE – 5 AND 10 MG TABLETS
- PMS-AMOXICILLIN – 250 AND 500 MG CAPSULES
- PMS-AMOXICILLIN – 125 MG/5 ML AND 250 MG/5 ML SUSPENSION
- PMS-ANASTROZOLE – 1 MG TABLETS

- PARAPLATIN
- PARAPLATIN-AQ
- PARIET – 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- PARNATE
- PAROXETINE (SANIS) – 10, 20 ET 30 MG, COMPRIMÉS
- PARSITAN
- PAT-RABEPRAZOLE – 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS

- PAXIL
- PEDIAPRED, LIQUIDE ORAL
- PENLET PLUS, BANDELETTES DU DISPOSITIF DE PRÉLÈVEMENTS SANGUINS RÉGLABLE
- PENTASA – 500 MG ET 1 G, COMPRIMÉS À LIBÉRATION PROGRESSIVE
- PENTASA – 1 G/100 ML ET 4 G/100 ML, LAVEMENT, ET 1 G, SUPPOSITOIRES
- PENTOXIFYLLINE SR (AA PHARMA) – 400 MG, COMPRIMÉS
- PEN-VEE – 350 MG/5 ML, SUSPENSION
- PEPCID, COMPRIMÉS
- PERCOCET
- PERCOCET-DEMI
- PERCODAN
- PERCODAN-DEMI
- PERPHENAZINE (AA PHARMA) – 2, 4, 8 ET 16 MG, COMPRIMÉS
- PERSANTINE – 50, 75 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- PHARMORUBICIN RDF
- PHARMORUBICIN PFS
- PHENOBARB – 15, 30, 60 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- PHENOBARB, ÉLIXIR
- PHÉNOBARBITAL, COMPRIMÉS (ICN)
- PHL-AMLODIPINE – 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- PHOSPHATE-SANDOZ, COMPRIMÉS
- PHOSPHOLINE (IODURE DE)
- PILOPINE HS
- PIPORTIL L4
- PLAN B – 0,75 MG, COMPRIMÉS MAXIMUM DE 3 TRAITEMENTS (6 COMPRIMÉS) PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- PLAQUENIL (SULFATE DE)
- PLATINOL-AQ
- PLAVIX – 75 MG, COMPRIMÉS
- PLENDIL
- PMS-AMANTADINE
- PMS-AMIODARONE – 100 ET 200 MG, COMPRIMÉS
- PMS-AMITRIPTYLINE – 10, 25 ET 50 MG, COMPRIMÉS
- PMS-AMLODIPINE – 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- PMS-AMOXICILLIN – 250 ET 500 MG, CAPSULES
- PMS-AMOXICILLIN – 125 MG/5 ML ET 250 MG/5 ML, SUSPENSION
- PMS-ANASTROZOLE – 1 MG, COMPRIMÉS

- PMS-ATENOLOL - 25, 50 AND 100 MG TABLETS
- PMS-ATORVASTATIN - 10, 20, 40 AND 80 MG TABLETS
- PMS-BACLOFEN
- PMS-BEZAFIBRATE - 200 MG TABLETS
- PMS-BICALUTAMIDE - 50 MG TABLETS
- PMS-BISOPROLOL - 5 AND 10 MG TABLETS
- PMS-BRIMONIDINE - 0.2% OPHTHALMIC SOLUTION
- PMS-BUSPIRONE - 5 AND 10 MG TABLETS
- PMS-CANDESARTAN - 4, 8, 16 AND 32 MG TABLETS
- PMS-CANDESARTAN-HCTZ - 16/12.5 MG TABLETS
- PMS-CARBAMAZEPINE CHEWTABS - 100 AND 200 MG CHEWABLE TABLETS
- PMS-CARBAMAZEPINE CR - 200 AND 400 MG TABLETS
- PMS-CARVEDILOL - 3.125, 6.25, 12.5 AND 25 MG TABLETS
- PMS-CHLORAL HYDRATE SYRUP AND CAPSULES
- PMS-CILAZAPRIL - 1, 2.5 AND 5 MG TABLETS
- PMS-CITALOPRAM - 10, 20 AND 40 MG TABLETS
- PMS-CLOBAZAM - 10 MG TABLETS
- PMS-CLOBETASOL - 0.05% CREAM, OINTMENT AND LOTION
- PMS-CLONAZEPAM - 0.25, 0.5, 1 AND 2 MG TABLETS
- PMS-CLONAZEPAM R - 0.5 MG TABLETS
- PMS-CLOPIDOGREL - 75 MG TABLETS
- PMS-COLCHICINE - 0.6 MG TABLETS
- PMS-DEFEROXAMINE - 500 MG/VIAL POWDER FOR INJECTION
- PMS-DESONIDE - 0.05% TOPICAL CREAM AND OINTMENT
- PMS-DEXAMETHASONE - 0.5, 0.75, 2 AND 4 MG TABLETS
- PMS-DIAZEPAM - 2, 5 AND 10 MG TABLETS
- PMS-DICLOFENAC - 25 AND 50 MG ENTERIC COATED TABLETS
- PMS-DICLOFENAC - 75 AND 100 MG SLOW RELEASE TABLETS
- PMS-DICLOFENAC - 50 MG SUPPOSITORIES
- PMS-DOMPERIDONE
- PMS-DOXAZOSIN - 1, 2 AND 4 MG TABLETS
- PMS-ENALAPRIL - 2.5, 5, 10 AND 20 MG TABLETS
- PMS-ERYTHROMYCIN - 5 MG/G OPHTHALMIC OINTMENT
- PMS-FAMCICLOVIR - 125, 250 AND 500 MG TABLETS
- PMS-FENOFIBRATE MICRO - 200 MG - CAPSULES
- PMS-ATENOLOL - 25, 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- PMS-ATORVASTATIN - 10, 20, 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- PMS-BACLOFEN
- PMS-BEZAFIBRATE - 200 MG, COMPRIMÉS
- PMS-BICALUTAMIDE - 50 MG, COMPRIMÉS
- PMS-BISOPROLOL - 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- PMS-BRIMONIDINE - 0.2 %, SOLUTION OPHTHALMIQUE
- PMS-BUSPIRONE - 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- PMS-CANDESARTAN - 4, 8, 16 ET 32 MG, COMPRIMÉS
- PMS-CANDESARTAN-HCTZ - 16/12,5 MG, COMPRIMÉS
- PMS-CARBAMAZEPINE CHEWTABS - 100 ET 200 MG, COMPRIMÉS MASTICABLES
- PMS-CARBAMAZEPINE CR - 200 ET 400 MG, COMPRIMÉS
- PMS-CARVEDILOL - 3,125, 6,25, 12,5 ET 25 MG, COMPRIMÉS
- PMS-CHLORAL HYDRATE, SIROP ET CAPSULES
- PMS-CILAZAPRIL - 1, 2,5 ET 5 MG, COMPRIMÉS
- PMS-CITALOPRAM - 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- PMS-CLOBAZAM - 10 MG, COMPRIMÉS
- PMS-CLOBETASOL - 0,05 %, CRÈME, POMMADE ET LOTION
- PMS-CLONAZEPAM - 0,25, 0,5, 1 ET 2 MG, COMPRIMÉS
- PMS-CLONAZEPAM R - 0,5 MG, COMPRIMÉS
- PMS-CLOPIDOGREL - 75 MG, COMPRIMÉS
- PMS-COLCHICINE - 0,6 MG, COMPRIMÉS
- PMS-DEFEROXAMINE - 500 MG/AMPOULE, POUDRE INJECTABLE
- PMS-DESONIDE - 0,05 %, CRÈME TOPIQUE ET POMMADE
- PMS-DEXAMETHASONE - 0,5, 0,75, 2 ET 4 MG, COMPRIMÉS
- PMS-DIAZEPAM - 2, 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- PMS-DICLOFENAC - 25 ET 50 MG, COMPRIMÉS À ENROBAGE ENTÉROSOLUBLE
- PMS-DICLOFENAC - 75 ET 100 MG, COMPRIMÉS À LIBÉRATION PROGRESSIVE
- PMS-DICLOFENAC - 50 MG, SUPPOSITOIRES
- PMS-DOMPERIDONE
- PMS-DOXAZOSIN - 1, 2 ET 4 MG, COMPRIMÉS
- PMS-ENALAPRIL - 2,5, 5, 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- PMS-ERYTHROMYCIN - 5 MG/G, POMMADE OPHTHALMIQUE
- PMS-FAMCICLOVIR - 125, 250 ET 500 MG, COMPRIMÉS
- PMS-FENOFIBRATE MICRO - 200 MG - CAPSULES

- PMS-FLUOXETINE CAPSULES AND SYRUP
- PMS-FLUROMETHOLONE – 0.1% OPHTHALMIC SUSPENSION
- PMS-FLUTAMIDE TABLETS
- PMS-FUROSEMIDE – 20 AND 40 MG TABLETS

- PMS-GABAPENTIN – 100, 300, 400 AND 600 MG CAPSULES
- PMS-GEMFIBROZIL – 300 MG CAPSULES
- PMS-GLYBURIDE – 5 MG TABLETS
- PMS-HALOPERIDOL ORAL SOLUTION
- PMS-HYDROCHLOROTHIAZIDE – 12.5, 25 AND 50 MG TABLETS
- PMS-HYDROMORPHONE – 1, 2, 4, 8 MG TABLETS AND 1 MG/ML SYRUP
- PMS-HYDROXYZINE – 10 MG/5 ML SYRUP
- PMS-IBUPROFEN – 600 MG TABLETS
- PMS-INDAPAMIDE – 1.25 AND 2.5 MG TABLETS
- PMS-IPRATROPIUM – 125 AND 250 MCG/ML POLYNEB AND 250 MCG/ML SOLUTION AND 0.03% NASAL SPRAY
- PMS-IRBESARTAN – 75, 150 AND 300 MG

- PMS-IRBESARTAN HCTZ – 150/12.5, 300/12.5 AND 300/25 MG TABLETS
- PMS-ISONIAZID TABLETS AND SYRUP
- PMS-KETOPROFEN – 50 AND 100 MG SUPPOSITORIES
- PMS-LAMOTRIGINE – 25, 100 AND 150 MG TABLETS
- PMS-LETROZOLE – 2.5 MG TABLETS
- PMS-LEVOBUNOLOL – 0.5% OPHTHALMIC SOLUTION
- PMS-LISINOPRIL – 5, 10 AND 20 MG TABLETS

- PMS-LITHIUM CARBONATE CAPSULES
- PMS-LORAZEPAM – 0.5, 1 AND 2 MG TABLETS

- PMS-LOSARTAN – 25, 50 AND 100 MG TABLETS
- PMS-LOSARTAN-HCTZ – 50/12.5 MG, 100/12.5 MG AND 100/25 MG TABLETS
- PMS-LOVASTATIN – 20 AND 40 MG TABLETS
- PMS-METFORMIN – 500 AND 850 MG TABLETS

- PMS-METOCLOPRAMIDE ORAL LIQUID
- PMS-METOCLOPRAMIDE – 5 AND 10 MG TABLETS
- PMS-METOPROLOL-B
- PMS-METOPROLOL-L – 25, 50 AND 100 MG TABLETS
- PMS-MIRTAZAPINE – 15 AND 30 MG TABLETS

- PMS-NABILONE – 0.5 AND 1 MG CAPSULES
- PMS-NAPROXEN SUPPOSITORIES
- PMS-NEVIRAPINE – 200 MG TABLETS

- PMS-FLUOXETINE, CAPSULES ET SIROP
- PMS-FLUROMETHOLONE – 0,1%, SUSPENSION OPHTALMIQUE
- PMS-FLUTAMIDE, COMPRIMÉS
- PMS-FUROSEMIDE – 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- PMS-GABAPENTIN – 100, 300, 400 ET 600 MG, CAPSULES
- PMS-GEMFIBROZIL, 300 MG, CAPSULES
- PMS-GLYBURIDE – 5 MG, COMPRIMÉS
- PMS-HALOPERIDOL, SOLUTION ORALE
- PMS-HYDROCHLOROTHIAZIDE – 12,5, 25 ET 50 MG, COMPRIMÉS
- PMS-HYDROMORPHONE – 1, 2, 4 et 8 MG, COMPRIMÉS ET 1MG/ML, SIROP
- PMS-HYDROXYZINE – 10 MG/5 ML, SIROP
- PMS-IBUPROFEN – 600 MG, COMPRIMÉS
- PMS-INDAPAMIDE – 1,25 ET 2,5 MG, COMPRIMÉS
- PMS-IPRATROPIUM – 125 ET 250 MCG/ML, POLYNEB ET 250 MCG/ML, SOLUTION ET 0,03 %, VAPORISATEUR NASAL
- PMS-IRBESARTAN – 75, 150 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- PMS-IRBESARTAN HCTZ – 150/12,5, 300/12,5 ET 300/25 MG, COMPRIMÉS
- PMS-ISONIAZID, COMPRIMÉS ET SIROP
- PMS-KETOPROFEN – 50 ET 100 MG, SUPPOSITOIRES
- PMS-LAMOTRIGINE – 25, 100 ET 150 MG, COMPRIMÉS
- PMS-LETROZOLE – 2,5 MG, COMPRIMÉS
- PMS-LEVOBUNOLOL – 0,5 %, SOLUTION OPHTALMIQUE
- PMS-LISINOPRIL – 5, 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- PMS-LITHIUM CARBONATE, CAPSULES
- PMS-LORAZEPAM – 0,5, 1 ET 2 MG, COMPRIMÉS
- PMS-LOSARTAN – 25, 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- PMS-LOSARTAN-HCTZ – 50/12,5 MG, 100/12,5 MG ET 100/25 MG, COMPRIMÉS
- PMS-LOVASTATIN – 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- PMS-METFORMIN – 500 ET 850 MG, COMPRIMÉS
- PMS-METOCLOPRAMIDE, LIQUIDE ORAL
- PMS-METOCLOPRAMIDE – 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- PMS-METOPROLOL-B
- PMS-METOPROLOL-L – 25, 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- PMS-MIRTAZAPINE – 15 ET 30 MG, COMPRIMÉS
- PMS-NABILONE – 0,5 ET 1 MG, CAPSULES
- PMS-NAPROXEN, SUPPOSITOIRES
- PMS-NEVIRAPINE – 200 MG, COMPRIMÉS

- PMS-NIZATIDINE - 150 AND 300 MG CAPSULES
- PMS-NORTRIPTYLINE - 10 AND 25 MG CAPSULES
- PMS-NYSTATIN
- PMS-OLANZAPINE - 2.5, 5, 7.5, 10 AND 15 MG TABLETS
- PMS-OLANZAPINE ODT - 5, 10 AND 15 MG TABLETS
- PMS-OMEPRAZOLE - 20 MG CAPSULES
- PMS-OMEPRAZOLE DR - 20 MG TABLETS
- PMS-ONDANSETRON - 4 AND 8 MG TABLETS

- PMS-OXYBUTYNIN CHLORIDE - 1 MG/ML SYRUP
- PMS-OXYBUTYNIN - 2.5 AND 5 MG TABLETS
- PMS-PANTOPRAZOLE - 40 MG TABLETS
- PMS-PAROXETINE - 10, 20, 30 AND 40 MG TABLETS
- PMS-PERPHENAZINE CONCENTRATE
- PMS-PINDOLOL - 5, 10 AND 15 MG TABLETS
- PMS-POLYTRIMETHOPRIM - 1 MG/10,000 U OPHTHALMIC SOLUTION
- PMS-POTASSIUM CHLORIDE - 1.33 MEQ/ML SOLUTION
- PMS-PRAVASTATIN - 10, 20 AND 40 MG TABLETS
- PMS-PREDNISOLONE - 5 MG/5 ML ORAL SOLUTION
- PMS-PROCHLORPERAZINE SUPPOSITORIES
- PMS-PROCYCLIDINE TABLETS AND ELIXIR
- PMS-PROPAFENONE - 150 AND 300 MG TABLETS
- PMS-PYRAZINAMIDE
- PMS-QUETIAPINE - 25, 100, 200 AND 300 MG TABLETS
- PMS-RABEPRAZOLE EC - 10 AND 20 MG TABLETS
- PMS-RAMIPRIL - 1.25, 2.5, 5 AND 10 MG CAPSULES
- PMS-RANITIDINE - 150 AND 300 MG TABLETS

- PMS-RISPERIDONE - 1 MG/ML ORAL SOLUTION
- PMS-RISPERIDONE - 0.25, 0.5, 1, 2, 3 AND 4 MG TABLETS
- PMS-RISPERIDONE ODT - 1, 2, 3 AND 4 MG TABLETS
- PMS-ROPINIROLE - 0.25, 1, 2 AND 5 MG TABLETS
- PMS-ROSUVASTATIN - 10, 20 AND 40 MG TABLETS
- PMS-SALBUTAMOL - 0.5, 1 AND 2 MG/ML UNIT DOSE NEBULES TO A MAXIMUM OF 1,460 UNIT DOSE NEBULES PER BENEFIT YEAR

- PMS-NIZATIDINE - 150 ET 300 MG, CAPSULES
- PMS-NORTRIPTYLINE - 10 ET 25 MG, CAPSULES
- PMS-NYSTATIN
- PMS-OLANZAPINE - 2,5, 5, 7,5, 10 ET 15 MG, COMPRIMÉS
- PMS-OLANZAPINE ODT - 5, 10 ET 15 MG, COMPRIMÉS
- PMS-OMEPRAZOLE - 20 MG, CAPSULES
- PMS-OMEPRAZOLE DR - 20 MG, COMPRIMÉS
- PMS-ONDANSETRON - 4 ET 8 MG, COMPRIMÉS

- PMS-OXYBUTYNIN (CHLORURE DE) - 1 MG/ML, SIROP
- PMS-OXYBUTYNIN - 2,5 ET 5 MG, COMPRIMÉS
- PMS-PANTOPRAZOLE - 40 MG, COMPRIMÉS
- PMS-PAROXÉTINE - 10, 20, 30 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- PMS-PERPHENAZINE, CONCENTRÉ
- PMS-PINDOLOL - 5, 10 ET 15 MG, COMPRIMÉS
- PMS-POLYTRIMÉTHOPRIME - 1 MG/10 000 U, SOLUTION OPHTALMIQUE
- PMS-POTASSIUM (CHLORURE DE) - 1,33 MEQ/ML, SOLUTION
- PMS-PRAVASTATIN - 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- PMS-PREDNISOLONE - 5 MG/5 ML, SOLUTION ORALE
- PMS-PROCHLORPERAZINE, SUPPOSITOIRES
- PMS-PROCYCLIDINE, COMPRIMÉS ET ÉLIXIR
- PMS-PROPAFENONE - 150 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- PMS-PYRAZINAMIDE
- PMS-QUETIAPINE - 25, 100, 200 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- PMS-RABEPRAZOLE EC - 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- PMS-RAMIPRIL - 1,25, 2,5, 5 ET 10 MG, CAPSULES
- PMS-RANITIDINE - 150 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- PMS-RISPERIDONE - 1 MG/ML, SOLUTION ORALE
- PMS-RISPERIDONE - 0,25, 0,5, 1, 2, 3 ET 4 MG, COMPRIMÉS
- PMS-RISPERIDONE ODT - 1, 2, 3 ET 4 MG, COMPRIMÉS
- PMS-ROPINIROLE - 0,25, 1, 2 ET 5 MG, COMPRIMÉS
- PMS-ROSUVASTATIN - 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- PMS-SALBUTAMOL - 0,5, 1 ET 2 MG/ML, SOLUTION POUR NÉBULISEUR EN DOSE UNITAIRE, MAXIMUM DE 1 460 DOSES UNITAIRES (NEBULES) PAR ANNÉE D'INDEMNISATION

- PMS-SALBUTAMOL – 5 MG/ML RESPIRATOR SOLUTION TO A MAXIMUM OF 1,460 ML PER BENEFIT YEAR
- PMS-SERTRALINE – 25, 50 AND 100 MG CAPSULES
- PMS-SIMVASTATIN – 5, 10, 20, 40 AND 80 MG TABLETS
- PMS-SODIUM CROMOGLYCATÉ NEBULIZER SOLUTION
- PMS-SODIUM POLYSTYRENE SULFONATE POWDER AND ORAL SUSPENSION
- PMS-SOTALOL – 80 AND 160 MG TABLETS
- PMS-SULFASALAZINE TABLETS AND ENTERIC COATED TABLETS
- PMS-TELMISARTAN – 40 AND 80 MG TABLETS
- PMS-TELMISARTAN HCTZ – 80/12.5 MG AND 80/25 MG TABLETS
- PMS-TERAZOSIN – 1, 2, 5 AND 10 MG TABLETS
- PMS-TERBINAFINE – 250 MG TABLETS
- PMS-TESTOSTERONE – 40 MG CAPSULES
- PMS-TETRABENAZINE – 25 MG TABLETS
- PMS-THEOPHYLLINE ELIXIR
- PMS-TIMOLOL – 0.25% AND 0.5% OPHTHALMIC SOLUTION
- PMS-TOPIRAMATE – 25, 100 AND 200 MG TABLETS
- PMS-TRAZODONE – 50, 75 AND 100 MG TABLETS
- PMS-TRIFLUOPERAZINE SYRUP
- PMS-TRIHEXYPHENIDYL ELIXIR
- PMS-URSODIOL C – 250 AND 500 MG TABLETS
- PMS-VALACYCLOVIR – 500 MG TABLETS
- PMS-VALPROIC ACID CAPSULES
- PMS-VALSARTAN – 40, 80, 160 AND 320 MG TABLETS
- PMS-VALPROIC ACID – 500 MG ENTERIC COATED CAPSULES
- PMS-VALPROIC ACID SYRUP – 250 MG/5ML
- PMS-VANCOMYCIN – 500 MG AND 1 G/VIAL INJECTION
- PMS-VENLAFAXINE XR – 37.5, 75 AND 150 MG CAPSULES
- PMS-VERAPAMIL SR – 240 MG TABLETS
- PMS-ZOPICLONE – 5 AND 7.5 MG TABLETS
- POLYTRIM
- PORTIA – 21 AND 28 DAY TABLETS
- POTASSIUM-SANDOZ
- PRANDASE – 50 AND 100 MG TABLETS
- PRAVACHOL
- PRAVASTATIN (SANIS) – 10, 20 AND 40 MG TABLETS
- PRAVASTATIN (SIVEM) – 10, 20 AND 40 MG TABLETS
- PRECI-JET
- PMS-SALBUTAMOL – 5 MG/ML, SOLUTION POUR RESPIRATEUR, MAXIMUM DE 1 460 ML PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- PMS-SERTRALINE – 25, 50 ET 100 MG, CAPSULES
- PMS-SIMVASTATIN – 5, 10, 20, 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- PMS-SODIUM CROMOGLYCATÉ, SOLUTION POUR NÉBULISEUR
- PMS-SODIUM POLYSTYRENE SULFONATE, POUDRE ET SUSPENSION ORALE
- PMS-SOTALOL – 80 ET 160 MG, COMPRIMÉS
- PMS-SULFASALAZINE, COMPRIMÉS ET COMPRIMÉS À ENROBAGE ENTÉROSOLUBLE
- PMS-TELMISARTAN – 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- PMS-TELMISARTAN HCTZ – 80/12,5 MG ET 80/25 MG, COMPRIMÉS
- PMS-TERAZOSIN – 1, 2, 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- PMS-TERBINAFINE – 250 MG, COMPRIMÉS
- PMS-TESTOSTERONE – 40 MG, CAPSULES
- PMS-TETRABENAZINE – 25 MG, COMPRIMÉS
- PMS-THEOPHYLLINE, ÉLIXIR
- PMS-TIMOLOL – 0,25 % ET 0,5 %, SOLUTION OPHTALMIQUE
- PMS-TOPIRAMATE – 25, 100 ET 200 MG, COMPRIMÉS
- PMS-TRAZODONE – 50, 75 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- PMS-TRIFLUOPERAZINE, SIROP
- PMS-TRIHEXYPHENIDYL, ÉLIXIR
- PMS-URSODIOL C – 250 ET 500 MG, COMPRIMÉS
- PMS-VALACYCLOVIR – 500 MG, COMPRIMÉS
- PMS-VALPROIC ACID, CAPSULES
- PMS-VALSARTAN – 40, 80, 160 ET 320 MG, COMPRIMÉS
- PMS-VALPROIC ACID – 500 MG, CAPSULES À ENROBAGE ENTÉROSOLUBLE
- PMS-VALPROIC ACID – 250 MG/5 ML, SIROP
- P M S - V A N C O M Y C I N – 5 0 0 M G ET 1 G/AMPOULE, INJECTION
- PMS-VENLAFAXINE XR – 37,5, 75 ET 150 MG, CAPSULES
- PMS-VERAPAMIL SR – 240 MG, COMPRIMÉS
- PMS-ZOPICLONE – 5 ET 7,5 MG, COMPRIMÉS
- POLYTRIM
- PORTIA – 21 ET 28 JOURS, COMPRIMÉS
- POTASSIUM-SANDOZ
- PRANDASE – 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- PRAVACHOL
- PRAVASTATIN (SANIS) – 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- PRAVASTATIN (SIVEM) – 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- PRECI-JET

- PRECISION EASY TEST STRIPS - TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR
- PRED FORTE
- PRED MILD
- PREDNISOLONE ACETATE OPHTHALMIC SUSPENSION (SIL)
- PREMARIN TABLETS
- PREMARIN VAGINAL CREAM
- PREPLUS - 0.625 MG/2.5 MG AND 0.625 MG/5 MG TABLETS
- PRESTIGE BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS - TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR
- PRETERAX - 2 MG/0.625 MG TABLETS
- PREVEX B
- PREVEX HC
- PREZISTA - 75, 150, 400 AND 600 MG TABLETS
- PRIMEAIRE AEROCHAMBER
- PRIMIDONE (AA PHARMA) - 125 AND 250 MG TABLETS
- PRINIVIL
- PRINZIDE
- PRO-AIR TO A MAXIMUM OF 2,200 DOSES PER BENEFIT YEAR
- PRO-BANTHINE
- PROBETA OPHTHALMIC SOLUTION
- PROCAN SR
- PROCHLORAZINE (AA PHARMA) - 5 AND 10 MG TABLETS
- PROCYCLID ELIXIR
- PROCYTOX TABLETS
- PROLOPA
- PROPAFENONE (SANIS) - 150 AND 300 MG TABLETS
- PROPYL-THYRACIL
- PROSTIGMIN TABLETS
- PROVERA - 2.5, 5 AND 10 MG TABLETS
- PROVERA PAK
- PROZAC CAPSULES
- PULMICORT - 0.125 MG/ML SUSPENSION FOR INHALATION
- PULMICORT NEBUAMP
- PULMICORT TURBUHALER
- PULMOPHYLLINE
- PURINETHOL
- PVF
- PVF K
- QUETIAPINE (ACCORD) - 25, 100, 200 AND 300 MG TABLETS
- QUETIAPINE (SANIS) - 25, 100, 200 AND 300 MG TABLETS
- QUETIAPINE (SIVEM) - 25, 100, 200 AND 300 MG TABLETS
- QUINAGLUTE DURA-TABS
- PRECISION EASY, BÂTONNETS D'ÉPREUVE - MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- PRED FORTE
- PRED DOUX
- PREDNISOLONE (ACÉTATE DE), SUSPENSION OPHTALMIQUE (SIL)
- PRÉMARINE, COMPRIMÉS
- PRÉMARINE, CRÈME VAGINALE
- PREPLUS - 0,625 MG/2,5 MG ET 0,625 MG/5MG, COMPRIMÉS
- PRESTIGE, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE - MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- PRETERAX - 2 MG/0,625 MG, COMPRIMÉS
- PREVEX B
- PREVEX HC
- PREZISTA - 75, 150, 400 ET 600 MG, COMPRIMÉS
- PRIMEAIRE, AÉROCHAMBRE
- PRIMIDONE (AA PHARMA) - 125 ET 250 MG, COMPRIMÉS
- PRINIVIL
- PRINZIDE
- PRO-AIR, MAXIMUM DE 2 200 DOSES PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- PRO-BANTHINE
- PROBETA, SOLUTION OPHTALMIQUE
- PROCAN SR
- PROCHLORAZINE (AA PHARMA) - 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- PROCYCLID, ÉLIXIR
- PROCYTOX, COMPRIMÉS
- PROLOPA
- PROPAFENONE (SANIS) - 150 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- PROPYL-THYRACIL
- PROSTIGMIN, COMPRIMÉS
- PROVERA - 2.5, 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- PROVERA PAK
- PROZAC, CAPSULES
- PULMICORT - 0,125 MG/ML, SUSPENSION POUR INHALATION
- PULMICORT NEBUAMP
- PULMICORT TURBUHALER
- PULMOPHYLLINE
- PURINETHOL
- PVF
- PVF K
- QUETIAPINE (ACCORD) - 25, 100, 200 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- QUETIAPINE (SANIS) - 25, 100, 200 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- QUETIAPINE (SIVEM) - 25, 100, 200 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- QUINAGLUTE, COMPRIMÉS LONGUE ACTION

- QUINATE
- QUINIDINE SULFATE TABLETS (BURROUGHS-WELLCOME)
- QUININE – 300 MG TABLETS
- QUININE-ODAN – 200 MG, 300 MG CAPSULES
- QUININE SULFATE (STANLEY AND PARKE-DAVIS)
- QVAR – 50 AND 100 MCG/DOSE METERED DOSE INHALER
- RABEPRAZOLE (RANBAXY) – 10 AND 20 MG TABLETS
- RABEPRAZOLE (SIVEM) – 10 AND 20 MG CAPSULES
- RAMIPRIL (RANBAXY) – 1.25, 2.5, 5 AND 10 MG CAPSULES
- RAMIPRIL (SANIS) – 2.5, 5 AND 10 MG CAPSULES
- RAMIPRIL (SIVEM) – 2.5, 5 AND 10 MG CAPSULES
- RAN-AMLODIPINE – 5 AND 10 MG TABLETS
- RAN-ANASTROZOLE – 1 MG TABLETS
- RAN-ATENOLOL – 25 MG TABLETS
- RAN-ATENOLOL – 50 AND 100 MG TABLETS
- RAN-ATORVASTATIN – 10, 20, 40 AND 80 MG TABLETS
- RAN-BICALUTAMIDE – 50 MG TABLETS
- RAN-CANDESARTAN – 4, 8, 16 AND 32 MG TABLETS
- RAN-CARVEDILOL – 3.125, 6.25, 12.5 AND 25 MG TABLETS
- RAN-CITALO – 20 AND 40 MG TABLETS
- RAN-CLOPIDOGREL – 75 MG TABLETS
- RAN-DOMPERIDONE – 10 MG TABLETS
- RAN-ENALAPRIL – 2.5, 5, 10 AND 20 MG TABLETS
- RAN-FLUOXETINE – 10 AND 20 MG CAPSULES
- RAN-FOSINOPRIL – 10 AND 20 MG TABLETS
- RAN-GABAPENTIN – 100, 300 AND 400 MG CAPSULES
- RAN-IRBESARTAN – 75, 150 AND 300 MG TABLETS
- RAN-IRBESARTAN HCTZ – 150/12.5, 300/12.5 AND 300/25 MG TABLETS
- RANITIDINE (SANIS) – 150 AND 300 MG TABLETS
- RANITIDINE (SIVEM) – 150 AND 300 MG TABLETS
- RAN-LETROZOLE – 2.5 MG TABLETS
- RAN-LISINOPRIL – 5, 10 AND 20 MG TABLETS
- RAN-LOSARTAN – 25, 50 AND 100 MG TABLETS
- RAN-LOVASTATIN – 20 AND 40 MG TABLETS
- RAN-METFORMIN – 500 AND 850 MG TABLETS
- RAN-NABILONE – 0.5 AND 1 MG CAPSULES
- QUINATE
- QUINIDINE (SULFATE DE), COMPRIMÉS (BURROUGHS-WELLCOME)
- QUININE – 300 MG, COMPRIMÉS
- QUININE-ODAN – 200 MG, 300 MG, CAPSULES
- QUININE (SULFATE DE) (STANLEY ET PARKE-DAVIS)
- QVAR – 50 ET 100 MCG/DOSE, AÉROSOL DOSEUR
- RABEPRAZOLE (RANBAXY) – 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- RABEPRAZOLE (SIVEM) – 10 ET 20 MG, CAPSULES
- RAMIPRIL (RANBAXY) – 1.25, 2.5, 5 ET 10 MG, CAPSULES
- RAMIPRIL (SANIS) – 2.5, 5 ET 10 MG, CAPSULES
- RAMIPRIL (SIVEM) – 2.5, 5 ET 10 MG, CAPSULES
- RAN-AMLODIPINE – 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- RAN-ANASTROZOLE – 1 MG, COMPRIMÉS
- RAN-ATENOLOL – 25 MG, COMPRIMÉS
- RAN-ATENOLOL – 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- RAN-ATORVASTATIN – 10, 20, 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- RAN-BICALUTAMIDE – 50 MG, COMPRIMÉS
- RAN-CANDESARTAN – 4, 8, 16 ET 32 MG, COMPRIMÉS
- RAN-CARVEDILOL – 3,125, 6,25, 12,5 ET 25 MG, COMPRIMÉS
- RAN-CITALO – 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- RAN-CLOPIDOGREL – 75 MG, COMPRIMÉS
- RAN-DOMPERIDONE – 10 MG, COMPRIMÉS
- RAN-ENALAPRIL – 2,5, 5, 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- RAN-FLUOXETINE – 10 ET 20 MG, CAPSULES
- RAN-FOSINOPRIL – 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- RAN-GABAPENTIN – 100, 300 ET 400 MG, CAPSULES
- RAN-IRBESARTAN – 75, 150 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- RAN-IRBESARTAN HCTZ – 150/12,5, 300/12,5 ET 300/25 MG, COMPRIMÉS
- RANITIDINE (SANIS) – 150 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- RANITIDINE (SIVEM) – 150 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- RAN-LETROZOLE – 2,5 MG, COMPRIMÉS
- RAN-LISINOPRIL – 5, 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- RAN-LOSARTAN – 25, 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- RAN-LOVASTATIN – 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- RAN-METFORMIN – 500 ET 850 MG, COMPRIMÉS
- RAN-NABILONE – 0,5 ET 1 MG, CAPSULES

- RAN-OLANZAPINE – 2.5, 5, 7.5, 10 AND 15 MG TABLETS
- RAN-OLANZAPINE ODT – 5, 10 AND 15 MG TABLETS
- RAN-OMEPRAZOLE – 20 MG TABLETS AND CAPSULES
- RAN-ONDANSETRON – 4 AND 8 MG TABLETS
- RAN-PANTOPRAZOLE – 40 MG TABLETS
- RAN-PRAVASTATIN – 10, 20 AND 40 MG TABLETS
- RAN-QUETIAPINE – 25, 100, 200 AND 300 MG TABLETS
- RAN-RABEPRAZOLE – 10 AND 20 MG TABLETS
- RAN-RAMIPRIL – 1.25, 2.5, 5 AND 10 MG CAPSULES
- RAN-RANITIDINE – 150 AND 300 MG TABLETS
- RAN-RISPERIDONE – 0.25, 0.5, 1, 2, 3 AND 4 MG TABLETS
- RAN-ROPINIROLE – 0.25, 1, 2 AND 5 MG TABLETS
- RAN-ROSUVASTATIN – 10, 20 AND 40 MG TABLETS
- RAN-SERTRALINE – 25, 50 AND 100 MG TABLETS
- RAN-SIMVASTATIN – 5, 10, 20, 40 AND 80 MG TABLETS
- RAN-TAMSULOSIN – 0.4 MG TABLETS
- RAN-TOPIRAMATE – 25, 100 AND 200 MG TABLETS
- RAN-VALSARTAN – 40, 80 AND 160 MG TABLETS
- RAN-VENLAFAXINE XR – 37.5, 75 AND 150 MG CAPSULES
- RAN-ZOPICLONE – 5 AND 7.5 MG TABLETS
- RAPID RESPONSE BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS – TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR
- RATIO-ACYCLOVIR – 200, 400 AND 800 MG TABLETS
- RATIO-AMCINONIDE – 0.1% TOPICAL CREAM
- RATIO-AMCINONIDE – 0.1% TOPICAL LOTION
- RATIO-AMCINONIDE – 0.1% TOPICAL OINTMENT
- RATIO-AMIODARONE – 200 MG TABLETS
- RATIO-AMLODIPINE – 5 AND 10 MG TABLETS
- RATIO-ATENOLOL – 50 AND 100 MG TABLETS
- RATIO-ATORVASTATIN – 10, 20, 40 AND 80 MG TABLETS
- RATIO-AZATHIOPRINE – 50 MG TABLETS
- RATIO-BACLOFEN – 10 AND 20 MG TABLETS
- RATIO-BICALUTAMIDE – 50 MG TABLETS
- RAN-OLANZAPINE – 2,5, 5, 7,5, 10 ET 15 MG, COMPRIMÉS
- RAN-OLANZAPINE ODT – 5, 10 ET 15 MG, COMPRIMÉS
- RAN-OMEPRAZOLE – 20 MG, COMPRIMÉS ET CAPSULES
- RAN-ONDANSETRON – 4 ET 8 MG, COMPRIMÉS
- RAN-PANTOPRAZOLE – 40 MG, COMPRIMÉS
- RAN-PRAVASTATIN – 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- RAN-QUETIAPINE – 25, 100, 200 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- RAN-RABEPRAZOLE – 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- RAN-RAMIPRIL – 1,25, 2,5, 5 ET 10 MG, CAPSULES
- RAN-RANITIDINE – 150 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- RAN-RISPERIDONE – 0,25, 0,5, 1, 2, 3 ET 4 MG, COMPRIMÉS
- RAN-ROPINIROLE – 0,25, 1, 2 ET 5 MG, COMPRIMÉS
- RAN-ROSUVASTATIN – 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- RAN-SERTRALINE – 25, 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- RAN-SIMVASTATIN – 5, 10, 20, 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- RAN-TAMSULOSIN – 0,4 MG, COMPRIMÉS
- RAN-TOPIRAMATE – 25, 100 ET 200 MG, COMPRIMÉS
- RAN-VALSARTAN – 40, 80 ET 160 MG, COMPRIMÉS
- RAN-VENLAFAXINE XR – 37,5, 75 ET 150 MG, CAPSULES
- RAN-ZOPICLONE – 5 ET 7,5 MG, COMPRIMÉS
- RAPID RESPONSE, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE – MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- RATIO-ACYCLOVIR – 200, 400 ET 800 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-AMCINONIDE – 0,1 %, CRÈME TOPIQUE
- RATIO-AMCINONIDE – 0,1 %, LOTION TOPIQUE
- RATIO-AMCINONIDE – 0,1 %, POMMADE TOPIQUE
- RATIO-AMIODARONE – 200 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-AMLODIPINE – 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-ATENOLOL – 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-ATORVASTATIN – 10, 20, 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-AZATHIOPRINE – 50 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-BACLOFEN – 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-BICALUTAMIDE – 50 MG, COMPRIMÉS

- RATIO-BRIMONIDINE - 0.2% OPHTHALMIC SOLUTION
- RATIO-BUPROPION SR - 100 AND 150 MG TABLETS
- RATIO-BUSPIRONE - 10 MG TABLETS
- RATIO-CARVEDILOL - 3.125, 6.25, 12.5 AND 25 MG TABLETS
- RATIO-CITALOPRAM - 20 AND 40 MG TABLETS
- RATIO-CLOBETASOL - 0.05% OINTMENT
- RATIO-CLOBETASOL - 0.05% SCALP LOTION
- RATIO-CLOBETASOL - 0.05% TOPICAL CREAM
- RATIO-CLONAZEPAM - 0.5 AND 2 MG TABLETS
- RATIO-CODEINE - 5 MG/ML SYRUP
- RATIO-CODEINE - 15 AND 30 MG TABLETS
- RATIO-DESIPRAMINE - 25 AND 50 MG TABLETS
- RATIO-DEXAMETHASONE - 0.5, 0.75 AND 4 MG TABLETS
- RATIO-DILTIAZEM CD - 120, 180, 240 AND 300 MG CAPSULES
- RATIO-DOMPERIDONE - 10 MG TABLETS
- RATIO-DOXYCYCLINE - 100 MG CAPSULES
- RATIO-ECTOSONE - 0.05% MILD CREAM
- RATIO-ECTOSONE - 0.05% MILD LOTION
- RATIO-ECTOSONE - 0.1% REGULAR CREAM
- RATIO-ECTOSONE - 0.1% REGULAR LOTION
- RATIO-ECTOSONE - 0.1% SCALP LOTION
- RATIO-EMTEC - 300 MG/30 MG TABLETS
- RATIO-ENALAPRIL - 2.5, 5, 10 AND 20 MG TABLETS
- RATIO-FENOFIBRATE MC - 200 MG CAPSULES
- RATIO-FLUNISOLIDE - 0.025% OPHTHALMIC SOLUTION
- RATIO-FLUOXETINE - 10 AND 20 MG CAPSULES
- RATIO-FLURBIPROFEN - 100 MG TABLETS
- RATIO-FLUTICASONE - 50 MCG NASAL SPRAY
- RATIO-FLUVOXAMINE - 50 AND 100 MG TABLETS
- RATIO-GABAPENTIN - 100, 300 AND 400 MG CAPSULES
- RATIO-GENTAMICIN - 0.1% TOPICAL OINTMENT
- RATIO-GLICLAZIDE - 80 MG TABLETS
- RATIO-GLYBURIDE - 2.5 AND 5 MG TABLETS
- RATIO-HALOPERIDOL - 1 AND 10 MG TABLETS
- RATIO-INDAPAMIDE - 1.25 AND 2.5 MG TABLETS
- RATIO-BRIMONIDINE - 0,2 %, SOLUTION OPHTHALMIQUE
- RATIO-BUPROPION SR - 100 ET 150 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-BUSPIRONE - 10 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-CARVEDILOL - 3,125, 6,25, 12,5 ET 25 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-CITALOPRAM - 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-CLOBETASOL - 0,05 %, POMMADE
- RATIO-CLOBETASOL - 0,05 %, LOTION CAPILLAIRE
- RATIO-CLOBETASOL - 0,05 %, CRÈME TOPIQUE
- RATIO-CLONAZEPAM - 0,5 ET 2 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-CODÉINE - 5 MG/ML, SIROP
- RATIO-CODÉINE - 15 ET 30 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-DESIPRAMINE - 25 ET 50 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-DEXAMETHASONE - 0,5, 0,75 ET 4 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-DILTIAZEM CD - 120, 180, 240 ET 300 MG, CAPSULES
- RATIO-DOMPERIDONE - 10 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-DOXYCYCLINE - 100 MG, CAPSULES
- RATIO-ECTOSONE - 0,05 %, CRÈME
- RATIO-ECTOSONE - 0,05 %, LOTION
- RATIO-ECTOSONE - 0,1 %, CRÈME
- RATIO-ECTOSONE - 0,1 %, LOTION
- RATIO-ECTOSONE - 0,1 %, LOTION CAPILLAIRE
- RATIO-EMTEC - 300 MG/30 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-ENALAPRIL - 2,5, 5, 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-FENOFIBRATE MC - 200 MG, CAPSULES
- RATIO-FLUNISOLIDE - 0,025 %, SOLUTION OPHTHALMIQUE
- RATIO-FLUOXETINE - 10 ET 20 MG, CAPSULES
- RATIO-FLURBIPROFEN - 100 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-FLUTICASONE - 50 MCG, VAPORISATEUR NASAL
- RATIO-FLUVOXAMINE - 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-GABAPENTIN - 100, 300 ET 400 MG, CAPSULES
- RATIO-GENTAMICINE - 0,1 %, POMMADE TOPIQUE
- RATIO-GLICLAZIDE - 80 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-GLYBURIDE - 2,5 ET 5 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-HALOPERIDOL - 1 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-INDAPAMIDE - 1,25 ET 2,5 MG, COMPRIMÉS

- RATIO-INDOMETHACIN - 25 AND 50 MG CAPSULES
- RATIO-INDOMETHACIN - 100 MG SUPPOSITORIES
- RATIO-IPRA SAL UDV - 0.2 MG/1 MG/ML UNIT DOSE VIAL
- RATIO-IPRATROPIUM - 250 MCG/ML INHALATION SOLUTION TO A MAXIMUM OF 4,400 DOSES PER BENEFIT YEAR
- RATIO-IPRATROPIUM - 125 MCG/ML AND 250 MCG/ML UNIT DOSE VIAL
- RATIO-IPRATROPIUM - 0.03% NASAL SPRAY
- RATIO-IRBESARTAN - 75, 150 AND 300 MG TABLETS
- RATIO-IRBESARTAN HCTZ - 150/12.5, 300/12.5 AND 300/25 MG TABLETS
- RATIO-LAMOTRIGINE - 25, 100 AND 150 MG TABLETS
- RATIO-LENOLTEC #2 CPD - 15 MG TABLETS
- RATIO-LENOLTEC #3 CPD - 30 MG TABLETS
- RATIO-LENOLTEC #4 - 60 MG TABLETS
- RATIO-LEVOBUNOLOL - 0.25% AND 0.5% OPHTHALMIC SOLUTION
- RATIO-LISINOPRIL P - 5, 10 AND 20 MG TABLETS
- RATIO-LISINOPRIL Z - 5, 10 AND 20 MG TABLETS
- RATIO-LOVASTATIN - 20 AND 40 MG TABLETS
- RATIO-METFORMIN - 500 AND 850 MG TABLETS
- RATIO-METHOTREXATE - 2.5 MG TABLETS
- RATIO-MIRTAZAPINE - 30 MG TABLETS
- RATIO-MOCLOBEMIDE - 150 MG TABLETS
- RATIO-MOMETASONE - 0.1% TOPICAL OINTMENT
- RATIO-MORPHINE - 1, 5, 10 AND 20 MG/ML ORAL LIQUID
- RATIO-NYSTATIN - 100,000 U/ML ORAL LIQUID
- RATIO-NYSTATIN - 500,000 U ORAL TABLETS
- RATIO-ONDANSETRON - 4 AND 8 MG TABLETS
- RATIO-ORCIPRENALINE - 2 MG/ML SYRUP
- RATIO-OXYCOCET - 5 MG/325 MG TABLETS
- RATIO-OXYCODAN - 5 MG/325 MG TABLETS
- RATIO-PANTOPRAZOLE - 40 MG TABLETS
- RATIO-PAROXETINE - 10, 20 AND 30 MG TABLETS
- RATIO-INDOMETHACIN - 25 ET 50 MG, CAPSULES
- RATIO-INDOMETHACIN - 100 MG, SUPPOSITOIRES
- RATIO-IPRA SAL UDV - 0,2 MG/1 MG/ML, AMPOULE MONODOSE
- RATIO-IPRATROPIUM - 250 MCG/ML, SOLUTION POUR INHALATION, MAXIMUM DE 4 400 DOSES PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- RATIO-IPRATROPIUM - 125 MCG/ML ET 250 MCG/ML, AMPOULE MONODOSE
- RATIO-IPRATROPIUM - 0,03 %, VAPORISATEUR NASAL
- RATIO-IRBESARTAN - 75, 150 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-IRBESARTAN HCTZ - 150/12,5, 300/12,5 AND 300/25 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-LAMOTRIGINE - 25, 100 ET 150 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-LENOLTEC N° 2 AVEC CAFÉINE - 15 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-LENOLTEC N° 3 AVEC CAFÉINE - 30 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-LENOLTEC N° 4 - 60 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-LEVOBUNOLOL - 0,25 % ET 0,5 %, SOLUTION OPHTHALMIQUE
- RATIO-LISINOPRIL P - 5, 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-LISINOPRIL Z - 5, 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-LOVASTATIN - 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-METFORMIN - 500 ET 850 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-METHOTREXATE - 2,5 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-MIRTAZAPINE - 30 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-MOCLOBÉMIDE - 150 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-MOMETASONE - 0,1 %, POMMADE TOPIQUE
- RATIO-MORPHINE - 1, 5, 10 ET 20 MG/ML, LIQUIDE ORAL
- RATIO-NYSTATIN - 100 000 U/ML, LIQUIDE ORAL
- RATIO-NYSTATIN - 500 000 U, COMPRIMÉS ORAUX
- RATIO-ONDANSETRON - 4 ET 8 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-ORCIPRÉNALINE - 2 MG/ML, SIROP
- RATIO-OXYCOCET - 5 MG/325 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-OXYCODAN - 5 MG/325 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-PANTOPRAZOLE - 40 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-PAROXETINE - 10, 20 ET 30 MG, COMPRIMÉS

- RATIO-PRAVASTATIN - 10, 20 AND 40 MG TABLETS
- RATIO-PREDNISOLONE - 1% OPHTHALMIC SOLUTION
- RATIO-QUETIAPINE - 25, 100, 200 AND 300 MG TABLETS
- RATIO-RAMIPRIL - 1.25, 2.5, 5 AND 10 MG CAPSULES
- RATIO-RANITIDINE - 150 AND 300 MG TABLETS
- RATIO-SALBUTAMOL - 5 MG/ML RESPIRATOR SOLUTION TO A MAXIMUM OF 1,460 ML PER BENEFIT YEAR
- RATIO-SALBUTAMOL - 0.5, 1 AND 2 MG/ML UNIT DOSE SOLUTION NEBULES TO A MAXIMUM OF 1,460 UNIT DOSE NEBULES PER BENEFIT YEAR
- RATIO-SALBUTAMOL HFA - 100 MCG/DOSE METERED DOSE INHALER TO A MAXIMUM OF 4,400 DOSES PER BENEFIT YEAR
- RATIO-SERTRALINE - 25, 50 AND 100 MG CAPSULES
- RATIO-SIMVASTATIN - 10, 20, 40 AND 80 MG TABLETS
- RATIO-SOTALOL - 80 AND 160 MG TABLETS
- RATIO-SULFASALAZINE - 500 MG ENTERIC COATED TABLETS
- RATIO-TAMSULOSIN - 0.4 MG CAPSULES
- RATIO-TEMAZEPAM - 15 AND 30 MG CAPSULES
- RATIO-TERAZOSIN - 1, 2, 5 AND 10 MG TABLETS
- RATIO-TIMOLOL MALEATE - 0.25% OPHTHALMIC SOLUTION
- RATIO-TOPILENE - 0.05% TOPICAL GLYCOL OINTMENT
- RATIO-TOPILENE - 0.05% TOPICAL GLYCOL LOTION
- RATIO-TOPILENE - 0.05% TOPICAL GLYCOL CREAM
- RATIO-TOPIRAMATE - 25, 100 AND 200 MG TABLETS
- RATIO-TOPISALIC - 0.05% LOTION
- RATIO-TOPISONE - 0.05% TOPICAL CREAM
- RATIO-TOPISONE - 0.05% TOPICAL LOTION
- RATIO-TOPISONE - 0.05% TOPICAL OINTMENT
- RATIO-TRIACOMB - 2.5 MG/0.25 MG/100,000 U/1 MG/G TOPICAL CREAM
- RATIO-VALPROIC - 250 AND 500 MG ENTERIC COATED CAPSULES
- RATIO-VALPROIC - 50 MG/ML SYRUP
- RATIO-VENLAFAXINE XR - 37.5, 75 AND 150 MG CAPSULES
- RATIO-PRAVASTATIN - 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-PREDNISOLONE - 1 %, SOLUTION OPHTHALMIQUE
- RATIO-QUETIAPINE - 25, 100, 200 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-RAMIPRIL - 1,25, 2,5, 5 ET 10 MG, CAPSULES
- RATIO-RANITIDINE - 150 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-SALBUTAMOL - 5 MG/ML, SOLUTION POUR RESPIRATEUR, MAXIMUM DE 1 460 ML PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- RATIO-SALBUTAMOL - 0,5 1 ET 2 MG/ML, SOLUTION POUR NÉBULISEUR EN DOSE UNITAIRE, MAXIMUM DE 1 460 DOSES UNITAIRES (NEBULES) PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- RATIO-SALBUTAMOL HFA - 100 MCG/DOSE, AÉROSOL DOSEUR, MAXIMUM DE 4 400 DOSES PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- RATIO-SERTRALINE - 25, 50 ET 100 MG, CAPSULES
- RATIO-SIMVASTATIN - 10, 20, 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-SOTALOL - 80 ET 160 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-SULFASALAZINE - 500 MG, COMPRIMÉS À ENROBAGE ENTÉROSOLUBLE
- RATIO-TAMSULOSIN - 0,4 MG, CAPSULES
- RATIO-TEMAZEPAM - 15 ET 30 MG, CAPSULES
- RATIO-TERAZOSIN - 1, 2, 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-TIMOLOL MALEATE - 0,25 %, SOLUTION OPHTHALMIQUE
- RATIO-TOPILENE - 0,05 %, POMMADE TOPIQUE À BASE DE GLYCOL
- RATIO-TOPILENE - 0,05 %, LOTION TOPIQUE À BASE DE GLYCOL
- RATIO-TOPILENE - 0,05 %, CRÈME TOPIQUE À BASE DE GLYCOL
- RATIO-TOPIRAMATE - 25, 100 ET 200 MG, COMPRIMÉS
- RATIO-TOPISALIC - 0,05 %, LOTION
- RATIO-TOPISONE - 0,05 %, CRÈME TOPIQUE
- RATIO-TOPISONE - 0,05 %, LOTION TOPIQUE
- RATIO-TOPISONE - 0,05 %, POMMADE TOPIQUE
- RATIO-TRIACOMB - 2,5 MG/0,25 MG/100 000 U/1 MG/G, CRÈME TOPIQUE
- RATIO-VALPROIC - 250 ET 500 MG, CAPSULES À ENROBAGE ENTÉROSOLUBLE
- RATIO-VALPROIC - 50 MG/ML, SIROP
- RATIO-VENLAFAXINE XR - 37,5, 75 ET 150 MG, CAPSULES

- RATIO-ZOPICLONE – 5 AND 7.5 MG TABLETS
- RECTOCORT SUPPOSITORIES AND OINTMENT
- RECTOVALONE
- REMERON – 30 MG TABLETS
- REMERON RD – 15, 30 AND 45 MG ORALLY DISINTEGRATING TABLETS
- REQUIP – 0.25, 1, 2 AND 5 MG TABLETS
- RESCRIPTOR – 100 MG TABLETS
- RESONIUM CALCIUM
- RESTORIL
- RETIN-A – 0.01, 0.025, 0.05 AND 0.1% TOPICAL CREAM
- RETIN-A – 0.01 AND 0.025% TOPICAL GEL
- RETROVIR CAPSULES, SYRUP AND INJECTION
- REYATAZ – 150, 200 AND 300 MG TABLETS
- RHINARIS-F – 0.025% NASAL MIST
- RHINOCORT AQUA
- RHINOCORT TURBUHALER
- RHODACINE CAPSULES
- RHO-DOXEPIN
- RHO-DOXYCIN
- RHO-NITRO PUMPSPRAY – 0.4 MG SUBLINGUAL SPRAY
- RHO-PIROXICAM
- RHO-PRAZOSIN
- RHOPROLENE CREAM, OINTMENT AND LOTION
- RHOPROSONE CREAM, OINTMENT AND LOTION
- RHOTRAL
- RHOVAIL CAPSULES
- RHOVANE TABLETS
- RIDAURA
- RIFADIN
- RIMSO SOLUTION
- RISPERDAL – 0.25 MG, 0.5 MG TABLETS
- RISPERDAL – 1 MG/ML ORAL SOLUTION
- RISPERDAL – 1, 2, 3 AND 4 MG TABLETS
- RISPERDAL M-TAB – 0.5, 1, 2, 3 AND 4 MG ORALLY DISINTEGRATING TABLETS
- RISPERIDONE (SANIS) – 0.25, 0.5, 1, 2, 3 AND 4 MG TABLETS
- RIVOTRIL
- R.O.-ATROPINE
- R.O.-CARPINE
- R.O.-DEXSONE
- R.O.-GENTYICIN
- R.O.-PREDPHATE FORTE
- ROFACT
- ROFERON-A
- ROPINIROLE (SANIS) – 0.25, 1, 2 AND 5 MG TABLETS
- ROSASOL – 10 MG/G TOPICAL CREAM
- ROSUVASTATIN (SANIS) – 10, 20 AND 40 MG TABLETS
- RATIO-ZOPICLONE – 5 ET 7,5 MG, COMPRIMÉS
- RECTOCORT, SUPPOSITOIRES ET POMMADE
- RECTOVALONE
- REMERON – 30 MG, COMPRIMÉS
- REMERON RD – 15, 30 ET 45 MG, COMPRIMÉS À DISSOLUTION ORALE
- REQUIP – 0,25, 1, 2 ET 5 MG, COMPRIMÉS
- RESCRIPTOR – 100 MG, COMPRIMÉS
- RESONIUM CALCIUM
- RESTORIL
- RETIN-A – 0,01, 0,025, 0,05 ET 0,1 %, CRÈME TOPIQUE
- RETIN-A – 0,01 ET 0,025 %, GEL TOPIQUE
- RÉTROVIR, CAPSULES, SIROP ET INJECTION
- REYATAZ – 150, 200 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- RHINARIS-F – 0,025 %, ATOMISEUR NASAL
- RHINOCORT AQUA
- RHINOCORT TURBUHALER
- RHODACINE, CAPSULES
- RHO-DOXEPIN
- RHO-DOXYCIN
- RHO-NITRO PUMPSPRAY – 0,4 MG, VAPORISATEUR SUBLINGUAL
- RHO-PIROXICAM
- RHO-PRAZOSIN
- RHOPROLÈNE, CRÈME, POMMADE ET LOTION
- RHOPROSONE, CRÈME, POMMADE ET LOTION
- RHOTRAL
- RHOVAIL, CAPSULES
- RHOVANE, COMPRIMÉS
- RIDAURA
- RIFADIN
- RIMSO, SOLUTION
- RISPERDAL – 0,25 MG, 0,5 MG, COMPRIMÉS
- RISPERDAL – 1 MG/ML, SOLUTION ORALE
- RISPERDAL – 1, 2, 3 ET 4 MG, COMPRIMÉS
- RISPERDAL M-TAB – 0,5, 1, 2, 3 ET 4 MG, COMPRIMÉS À DISSOLUTION ORALE
- RISPERIDONE (SANIS) – 0,25, 0,5, 1, 2, 3 ET 4 MG, COMPRIMÉS
- RIVOTRIL
- R.O.-ATROPINE
- R.O.-CARPINE
- R.O.-DEXSONE
- R.O.-GENTYICIN
- R.O.-PREDPHATE FORTE
- ROFACT
- ROFÉRON-A
- ROPINIROLE (SANIS) – 0,25, 1, 2 ET 5 MG, COMPRIMÉS
- ROSASOL – 10 MG/G, CRÈME TOPIQUE
- ROSUVASTATIN (SANIS) – 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS

- ROSUVASTATIN (SIVEM) – 10, 20 AND 40 MG TABLETS
- ROVAMYCIN – 250 AND 500 MG CAPSULES
- RYNACROM CARTRIDGES
- RYNACROM NASAL INSUFFLATOR
- RYTHMODAN CAPSULES
- RYTHMOL
- SAB-INDOMETHACIN – 50 AND 100 MG SUPPOSITORIES
- SABRIL – 500 MG TABLETS AND SACHETS
- SALAZOPYRIN TABLETS
- SALAZOPYRIN EN-TABS
- SALOFALK – ENTERIC COATED TABLETS, SUPPOSITORIES AND RECTAL SUSPENSION

- SANDOMIGRAN
- SANDOMIGRAN DS
- SANDOSTATIN
- SANDOSTATIN LAR – 10 MG, 20 MG, 30 MG – VIALS
- SANDOZ ACEBUTOLOL – 100, 200 AND 400 MG TABLETS
- SANDOZ ALFUZOSIN – 10 MG TABLETS
- SANDOZ AMIODARONE – 200 MG TABLETS
- SANDOZ AMLODIPINE – 5 AND 10 MG TABLETS
- SANDOZ ANASTROZOLE – 1 MG TABLETS
- SANDOZ ATENOLOL – 50 AND 100 MG TABLETS
- SANDOZ ATORVASTATIN – 10, 20, 40 AND 80 MG TABLETS
- SANDOZ BICALUTAMIDE – 50 MG TABLETS

- SANDOZ BISOPROLOL – 5 AND 10 MG TABLETS
- SANDOZ BRIMONIDINE – 0.2% OPHTHALMIC SOLUTION
- SANDOZ BUPROPION SR – 100 AND 150 MG TABLETS
- SANDOZ CANDESARTAN – 4, 8, 16 AND 32 MG TABLETS
- SANDOZ CANDESARTAN PLUS – 16/12.5 MG TABLETS
- SANDOZ CARBAMAZEPINE – 100 AND 200 MG CHEWABLE TABLETS
- SANDOZ CARBAMAZEPINE CR – 200 AND 400 MG TABLETS
- SANDOZ CITALOPRAM – 20 AND 40 MG TABLETS
- SANDOZ CLONAZEPAM – 0.5, 1 AND 2 MG TABLETS
- SANDOZ CLOPIDOGREL – 75 MG TABLETS
- SANDOZ CORTIMYXIN OTIC SOLUTION
- SANDOZ DEXAMETHASONE – 0.1% OPHTHALMIC/OTIC SOLUTION
- SANDOZ DICLOFENAC – 50 AND 100 MG SUPPOSITORIES

- ROSUVASTATIN (SIVEM) – 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- ROVAMYCIN – 250 ET 500 MG, CAPSULES
- RYNACROM, CARTOUCHES
- RYNACROM, INSUFFLATEUR NASAL
- RYTHMODAN, CAPSULES
- RYTHMOL
- SAB-INDOMETHACIN – 50 ET 100 MG, SUPPOSITOIRES
- SABRIL – 500 MG, COMPRIMÉS ET SACHETS
- SALAZOPYRIN, COMPRIMÉS
- SALAZOPYRIN EN-TABS
- SALOFALK – COMPRIMÉS À ENROBAGE ENTÉROSOLUBLE, SUPPOSITOIRES ET SUSPENSION
- SANDOMIGRAN
- SANDOMIGRAN DS
- SANDOSTATIN
- SANDOSTATIN LAR – 10 MG, 20 MG, 30 MG – AMPOULES
- SANDOZ ACEBUTOLOL – 100, 200 ET 400 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ ALFUZOSIN – 10 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ AMIODARONE – 200 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ AMLODIPINE – 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ ANASTROZOLE – 1 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ ATENOLOL – 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ ATORVASTATIN – 10, 20, 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ BICALUTAMIDE – 50 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ BISOPROLOL – 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ BRIMONIDINE – 0,2 %, SOLUTION OPHTALMIQUE
- SANDOZ BUPROPION SR – 100 ET 150 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ CANDESARTAN – 4, 8, 16 ET 32 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ CANDESARTAN PLUS – 16/12,5 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ CARBAMAZEPINE – 100 ET 200 MG, COMPRIMÉS MASTICABLES
- SANDOZ CARBAMAZEPINE CR – 200 ET 400 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ CITALOPRAM – 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ CLONAZEPAM – 0,5, 1 ET 2 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ CLOPIDOGREL – 75 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ CORTIMYXIN, SOLUTION OTIQUE
- SANDOZ DEXAMETHASONE – 0,1 %, SOLUTION OPHTALMIQUE ET OTIQUE
- SANDOZ DICLOFÉNAC – 50 ET 100 MG SUPPOSITOIRES

- SANDOZ DICLOFENAC - 25 AND 50 MG TABLETS
- SANDOZ DICLOFENAC SR - 75 AND 100 MG SLOW RELEASE TABLETS
- SANDOZ DILTIAZEM CD - 120, 180, 240 AND 300 MG CAPSULES
- SANDOZ DILTIAZEM T - 120, 180, 240, 300 AND 360 MG CAPSULES
- SANDOZ DORZOLAMIDE - 2% OPHTHALMIC SOLUTION
- SANDOZ DORZOLAMIDE/TIMOLOL - 2%/0.05% OPHTHALMIC SOLUTION
- SANDOZ ENALAPRIL - 2.5, 5, 10 AND 20 MG TABLETS
- SANDOZ ENTACAPONE - 200 MG TABLETS
- SANDOZ FAMCICLOVIR - 125, 250 AND 500 MG TABLETS
- SANDOZ FELODIPINE - 5 AND 10 MG TABLETS
- SANDOZ FENOFIBRATE E - 48 AND 145 MG TABLETS
- SANDOZ FENOFIBRATE S - 100 AND 160 MG TABLETS
- SANDOZ FLUOROMETHOLONE - 0.1% OPHTHALMIC SOLUTION
- SANDOZ FLUOXETINE - 10 AND 20 MG CAPSULES
- SANDOZ FLUVASTATIN - 20 AND 40 MG TABLETS
- SANDOZ FLUVOXAMINE - 50 AND 100 MG TABLETS
- SANDOZ GENTAMICIN - 5 MG/ML OTIC SOLUTIONS
- SANDOZ GENTAMICIN - 0.3% OPHTHALMIC OINTMENT
- SANDOZ GLYBURIDE - 2.5 AND 5 MG TABLETS
- SANDOZ IRBESARTAN - 75, 150 AND 300 MG TABLETS
- SANDOZ IRBESARTAN HCT - 150/12.5, 300/12.5 AND 300/25 MG TABLETS
- SANDOZ LATANOPROST - 50 MCG/ML OPHTHALMIC SOLUTION
- SANDOZ LATANOPROST/TIMOLOL - 50 MCG/5 MG/ML
- SANDOZ LETROZOLE - 2.5 MG TABLETS
- SANDOZ LEVOBUNOLOL - 0.25 AND 0.5% OPHTHALMIC SOLUTION
- SANDOZ LISINOPRIL - 5, 10 AND 20 MG TABLETS
- SANDOZ LISINOPRIL HCT - 10/12.5, 20/12.5 AND 20/25 MG TABLETS
- SANDOZ LOSARTAN - 25, 50 AND 100 MG TABLETS
- SANDOZ LOSARTAN HCT - 50/100, 100/12.5 AND 100/25 MG TABLETS
- SANDOZ DICLOFENAC - 25 ET 50 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ DICLOFENAC SR - 75 ET 100 MG, COMPRIMÉS À LIBÉRATION PROGRESSIVE
- SANDOZ DILTIAZEM CD - 120, 180, 240 ET 300 MG, CAPSULES
- SANDOZ DILTIAZEM T - 120, 180, 240, 300 ET 360 MG, CAPSULES
- SANDOZ DORZOLAMIDE - 2 %, SOLUTION OPHTALMIQUE
- SANDOZ DORZOLAMIDE/TIMOLOL - 2 %/0,05 %, SOLUTION OPHTALMIQUE
- SANDOZ ENALAPRIL - 2,5, 5, 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ ENTACAPONE - 200 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ FAMCICLOVIR - 125, 250 ET 500 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ FELODIPINE - 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ FENOFIBRATE E - 48 ET 145 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ FENOFIBRATE S - 100 ET 160 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ FLUOROMETHOLONE - 0,1 %, SOLUTION OPHTALMIQUE
- SANDOZ FLUOXETINE - 10 ET 20 MG, CAPSULES
- SANDOZ FLUVASTATIN - 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ FLUVOXAMINE - 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ GENTAMICIN - 5 MG/ML, SOLUTION OTIQUE
- SANDOZ GENTAMICIN - 0,3 %, POMMADE OPHTALMIQUE
- SANDOZ GLYBURIDE - 2,5 ET 5 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ IRBESARTAN - 75, 150 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ IRBESARTAN HCT - 150/12,5, 300/12,5 ET 300/25 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ LATANOPROST - 50 MCG/ML, SOLUTION OPHTALMIQUE
- SANDOZ LATANOPROST/TIMOLOL - 50 MCG/5 MG/ML
- SANDOZ LETROZOLE - 2,5 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ LEVOBUNOLOL - 0,25 ET 0,5 %, SOLUTION OPHTALMIQUE
- SANDOZ LISINOPRIL - 5, 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ LISINOPRIL HCT - 10/12,5, 20/12,5 ET 20/25 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ LOSARTAN - 25, 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ LOSARTAN HCT - 50/100, 100/12,5 ET 100/25 MG, COMPRIMÉS

- SANDOZ LOVASTATIN – 20 MG TABLETS
- SANDOZ METFORMIN – 500 MG TABLETS
- SANDOZ METFORMIN FC – 500 AND 850 MG TABLETS
- SANDOZ METOPROLOL SR – 100 AND 200 MG TABLETS
- SANDOZ METOPROLOL (TYPE L) – 50 AND 100 MG TABLETS
- SANDOZ MIRTAZAPINE – 15 AND 30 MG TABLETS
- SANDOZ MORPHINE SR – 15, 30 AND 60 MG

- SANDOZ NAPROXEN – 500 MG SUPPOSITORIES
- SANDOZ NITRAZEPAM – 5 AND 10 MG TABLETS
- SANDOZ OLANZAPINE – 2.5, 5, 7.5, 10 AND 15 MG TABLETS
- SANDOZ OLANZAPINE ODT – 5, 10 AND 15 MG TABLETS
- SANDOZ OMEPRAZOLE – 20 MG CAPSULES
- SANDOZ ONDANSETRON – 4 AND 8 MG TABLETS
- SANDOZ OPTICORT – 5 MG/0.05 MG/0.5 MG/ML OTIC/OPHTHALMIC SOLUTION
- SANDOZ OXYCODONE/ACETAMINOPHEN – 5 MG/325 MG TABLETS
- SANDOZ PANTOPRAZOLE – 40 MG TABLETS

- SANDOZ PAROXETINE – 10 MG TABLETS
- SANDOZ PENTASONE – 3 MG/1 MG/ML OPHTHALMIC/OTIC SOLUTION
- SANDOZ PINDOLOL – 5, 10 AND 15 MG TABLETS
- SANDOZ POLYTRIMETHOPRIM – 1 MG/1000 U OPHTHALMIC SOLUTION
- SANDOZ PRAVASTATIN – 10, 20 AND 40 MG TABLETS
- SANDOZ PREDNISOLONE – 1% OPHTHALMIC SOLUTION
- SANDOZ QUETIAPINE – 25, 100, 200 AND 300 MG TABLETS
- SANDOZ QUETIAPINE XRT – 50, 150, 200, 300 AND 400 MG TABLETS
- SANDOZ RABEPRAZOLE – 10 AND 20 MG TABLETS
- SANDOZ RAMIPRIL – 1.25, 2.5, 5 AND 10 MG TABLETS
- SANDOZ RANITIDINE – 150 AND 300 MG TABLETS
- SANDOZ RISPERIDONE – 0.5, 1, 2, 3 AND 4 MG TABLETS
- SANDOZ ROSUVASTATIN – 10, 20 AND 40 MG TABLETS

- SANDOZ LOVASTATIN – 20 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ METFORMIN – 500 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ METFORMIN FC – 500 ET 850 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ METOPROLOL SR – 100 ET 200 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ METOPROLOL (TYPE L) – 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ MIRTAZAPINE – 15 ET 30 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ MORPHINE SR – 15, 30 ET 60 MG, COMPRIMÉS À LIBÉRATION PROGRESSIVE
- SANDOZ NAPROXEN – 500 MG, SUPPOSITOIRES
- SANDOZ NITRAZEPAM – 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ OLANZAPINE – 2.5, 5, 7.5, 10 ET 15 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ OLANZAPINE ODT – 5, 10 ET 15 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ OMEPRAZOLE – 20 MG, CAPSULES
- SANDOZ ONDANSETRON – 4 ET 8 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ OPTICORT – 5 MG/0,05 MG/0,5 MG/ML, SOLUTION OPHTHALMIQUE ET OTIQUE
- SANDOZ OXYCODONE/ACETAMINOPHEN – 5 MG/325 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ PANTOPRAZOLE – 40 MG, COMPRIMÉS

- SANDOZ PAROXETINE – 10 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ PENTASONE – 3 MG/1 MG/ML, SOLUTION OPHTHALMIQUE ET OTIQUE
- SANDOZ PINDOLOL – 5, 10 ET 15 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ POLYTRIMETHOPRIM – 1 MG/1000 U, SOLUTION OPHTHALMIQUE
- SANDOZ PRAVASTATIN – 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ PREDNISOLONE – 1 %, SOLUTION OPHTHALMIQUE
- SANDOZ QUETIAPINE – 25, 100, 200 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ QUETIAPINE XRT – 50, 150, 200, 300 ET 400 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ RABEPRAZOLE – 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ RAMIPRIL – 1,25, 2,5, 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ RANITIDINE – 150 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ RISPERIDONE – 0,5, 1, 2, 3 ET 4 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ ROSUVASTATIN – 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS

- SANDOZ SALBUTAMOL - 5 MG/ML INHALATION SOLUTION TO A MAXIMUM OF 1,460 PER BENEFIT YEAR
- SANDOZ SERTRALINE - 25, 50 AND 100 MG CAPSULES
- SANDOZ SIMVASTATIN - 10, 20, 40 AND 80 MG TABLETS
- SANDOZ SOTALOL - 80 AND 160 MG TABLETS
- SANDOZ TAMSULOSIN - 0.4 MG CAPSULES
- SANDOZ TAMSULOSIN CR - 0.4 MG TABLETS
- SANDOZ TELMISARTAN - 40 AND 80 MG TABLETS
- SANDOZ TELMISARTAN HCT - 80/12.5 AND 80/25 MG TABLETS
- SANDOZ TERBINAFFINE - 250 MG TABLETS
- SANDOZ TIMOLOL - 0.25 AND 0.5% OPHTHALMIC SOLUTION
- SANDOZ TOPIRAMATE - 25, 100 AND 200 MG TABLETS
- SANDOZ TRIFLURIDINE - 1% OPHTHALMIC SOLUTION
- SANDOZ VALPROIC - 250 MG CAPSULES
- SANDOZ VALSARTAN - 40, 80, 160 AND 320 MG TABLETS
- SANDOZ VALSARTAN HCT - 80/12.5, 160/12.5, 160/25, 320/12.5 AND 320/25 MG TABLETS
- SANDOZ VENLAFAXINE XR - 37.5, 75 AND 150 MG CAPSULES
- SANDOZ ZOPICLONE - 5 AND 7.5 MG TABLETS
- SANS-ACNE
- SANSERT
- SARNA HC
- S.A.S.
- SCHEIN PILOCARPINE OPHTHALMIC SOLUTION
- SCOPOLAMINE HBR INJECTION
- SECTRAL
- SELECT 1/35 TABLETS
- SELEXID
- SEMILENTE INSULIN
- SEPTA-AMLODIPINE - 5 AND 10 MG TABLETS
- SEPTA-ATENOLOL - 50 AND 100 MG TABLETS
- SEPTA-CITALOPRAM - 20 AND 40 MG TABLETS
- SEPTA-METFORMIN - 500 AND 850 MG TABLETS
- SEREVENT - 25 AND 50 MCG, ALL DOSAGE FORMS
- SEROQUEL - 25, 100, 200 AND 300 MG TABLETS
- SANDOZ SALBUTAMOL - 5 MG/ML, SOLUTION POUR INHALATION, MAXIMUM DE 1 460 DOSES PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- SANDOZ SERTRALINE - 25, 50 ET 100 MG, CAPSULES
- SANDOZ SIMVASTATIN - 10, 20, 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ SOTALOL - 80 ET 160 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ TAMSULOSIN - 0,4 MG, CAPSULES
- SANDOZ TAMSULOSIN CR - 0,4 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ TELMISARTAN - 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ TELMISARTAN HCT - 80/12,5 ET 80/25 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ TERBINAFFINE - 250 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ TIMOLOL - 0,25 ET 0,5 %, SOLUTION OPHTHALMIQUE
- SANDOZ TOPIRAMATE - 25, 100 ET 200 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ TRIFLURIDINE - 1 %, SOLUTION OPHTHALMIQUE
- SANDOZ VALPROIC - 250 MG, CAPSULES
- SANDOZ VALSARTAN - 40, 80, 160 ET 320 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ VALSARTAN HCT - 80/12,5, 160/12,5, 160/25, 320/12,5 ET 320/25 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ VENLAFAXINE XR - 37,5, 75 ET 150 MG, COMPRIMÉS
- SANDOZ ZOPICLONE - 5 ET 7,5 MG, COMPRIMÉS
- SANS-ACNÉ
- SANSERT
- SARNA HC
- S.A.S.
- SCHEIN PILOCARPINE, SOLUTION OPHTHALMIQUE
- SCOPOLAMINE HBR, INJECTION
- SECTRAL
- SELECT 1/35, COMPRIMÉS
- SÉLEXID
- INSULINE SEMILENTE
- SEPTA-AMLODIPINE - 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- SEPTA-ATENOLOL - 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- SEPTA-CITALOPRAM - 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- SEPTA-METFORMIN - 500 ET 850 MG, COMPRIMÉS
- SEREVENT - 25 ET 50 MCG, TOUTES FORMES POSOLOGIQUES
- SEROQUEL - 25, 100, 200 ET 300 MG, COMPRIMÉS

- SEROQUEL XR - 50, 150, 200, 300 AND 400 MG TABLETS
- SERTRALINE (SANIS) - 25, 50 AND 100 MG CAPSULES
- SERTRALINE (SIVEM) - 25, 50 AND 100 MG CAPSULES
- SIMVASTATIN-ODAN - 5, 10, 20, 40 AND 80 MG TABLETS
- SIMVASTATIN (RANBAXY) - 5, 10, 20, 40 AND 80 MG TABLETS
- SIMVASTATIN (SANIS) - 5, 10, 20, 40 AND 80 MG TABLETS
- SIMVASTATIN (SIVEM) - 5, 10, 20, 40 AND 80 MG TABLETS
- SINEMET
- SINEMET CR
- SINEQUAN
- SINTROM
- SLO-BID
- SLOW-K
- SLOW-TRASICOR
- SODIUM AUROTHIOMALATE - 10, 25 AND 50 MG/ML INJECTION
- SODIUM SULAMYD - 10% OPHTHALMIC SOLUTION
- SOFRACORT
- SOFRAMYCIN OINTMENT, OPHTHALMIC OINTMENT AND OPHTHALMIC DROPS
- SOFRA-TULLE
- SOF-TACT STRIPS
- SOLGANAL
- SOLU-CORTEF - 100, 250, 500 AND 1000 MG/VIAL INJECTION
- SOLYSTAT - 250MG/ML SUSPENSION
- SOMATULINE AUTOGEL - 60 MG/0.3 ML, 90 MG/0.3 ML AND 120 MG/0.5 ML INJECTION
- SORIATANE
- SOTACOR
- SPACE CHAMBER
- SPACE CHAMBER AND MASK
- SPERSACARPINE
- SPERSADEX
- SSD
- STANLEY BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS - TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR
- STATEX TABLETS, SYRUP, SUPPOSITORIES, DROPS AND POWDER
- STIEVA-A - 0.01, 0.05 AND 0.025% CREAM
- STIEVA-A FORTE
- STIEVA-A GEL
- STIEVAMYCIN
- STIEVAMYCIN FORTE
- STILBOESTROL - 0.1 MG, 1 MG TABLETS
- SULCRATE TABLETS AND SUSPENSION
- SEROQUEL XR - 50, 150, 200, 300 ET 400 MG, COMPRIMÉS
- SERTRALINE (SANIS) - 25, 50 ET 100 MG, CAPSULES
- SERTRALINE (SIVEM) - 25, 50 ET 100 MG, CAPSULES
- SIMVASTATIN-ODAN - 5, 10, 20, 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- SIMVASTATIN (RANBAXY) - 5, 10, 20, 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- SIMVASTATIN (SANIS) - 5, 10, 20, 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- SIMVASTATIN (SIVEM) - 5, 10, 20, 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- SINEMET
- SINEMET CR
- SINEQUAN
- SINTROM
- SLO-BID
- SLOW-K
- SLOW-TRASICOR
- AUROTHIOMALATE DE SODIUM - 10, 25 ET 50 MG/ML, INJECTION
- SULAMYD SODIQUE - 10 %, SOLUTION OPHTALMIQUE
- SOFRACORT
- SOFRAMYCINE, POMMADE, POMMADE OPHTALMIQUE ET GOUTTES OPHTALMIQUES
- SOFRA-TULLE
- SOF-TACT, BANDELETTES
- SOLGANAL
- SOLU-CORTEF - 100, 250, 500 ET 1 000 MG/AMPOULE, INJECTION
- SOLYSTAT - 250 MG/ML, SUSPENSION
- SOMATULINE AUTOGEL - 60 MG/0,3 ML, 90 MG/0,3 ML ET 120 MG/0,5 ML, INJECTION
- SORIATANE
- SOTACOR
- CHAMBRE DE RETENUE D'AÉROSOL
- CHAMBRE DE RETENUE D'AÉROSOL ET MASQUE
- SPERSACARPINE
- SPERSADEX
- SSD
- STANLEY, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE - MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- STATEX, COMPRIMÉS, SIROP, SUPPOSITOIRES, GOUTTES ET POWDRE
- STIEVA-A - 0,01, 0,05 ET 0,025 %, CRÈME
- STIEVA-A FORTE
- STIEVA-A, GEL
- STIÉVAMYCINE
- STIÉVAMYCINE FORTE
- STILBOESTROL - 0.1 MG, 1 MG, COMPRIMÉS
- SULCRATE, COMPRIMÉS ET SUSPENSION

- SULCRATE PLUS
- SULFINPYRAZONE (AA PHARMA) – 200 MG TABLETS
- SULTRIN
- SUPEUDOL – 10 AND 20 MG SUPPOSITORY
- SURESTEP BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS – TO A MAXIMUM OF 4,000 PER BENEFIT YEAR
- SUSTIVA – 50, 100, 200 MG CAPSULES AND 600 MG TABLETS
- SYMBICORT 100 – 100 MCG/6 MCG TURBUHALER
- SYMBICORT 200 – 200 MCG/6 MCG TURBUHALER
- SYNALAR CREAM, OINTMENT AND SOLUTION
- SYNALAR BI-OTIC
- SYN-BROMOCRIPTINE
- SYN-CHOLESTYRAMINE LIGHT
- SYNPHASIC
- SYN-PINDOLOL
- SYNTHROID – 25, 50, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150, 175, 200 AND 300 MCG TABLETS
- SYRINGES AND NEEDLES – WHERE SUPPORTED BY CLAIMS FOR INJECTABLES
- TAGAMET TABLETS
- TAMOFEN
- TAMONE
- TAPAZOLE
- TARO-ANASTROZOLE – 1 MG TABLETS
- TARO-CARBAMAZEPINE – 100 AND 200 MG CHEWABLE TABLETS
- TARO-CARBAMAZEPINE – 100 MG/5 ML SUSPENSION
- TARO-CLINDAMYCIN – 1% TOPICAL SOLUTION
- TARO-ENALAPRIL – 2.5, 5, 10 AND 20 MG TABLETS
- TARO-MOMETASONE – 0.1% CREAM
- TARO-MOMETASONE – 0.1% LOTION
- TARO-MOMETASONE – 0.1% OINTMENT
- TARO-PHENYTOIN – 25 MG/ML SUSPENSION
- TARO-SONE – 0.1% TOPICAL CREAM
- TARO-WARFARIN – 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7.5 AND 10 MG TABLETS
- TEBRAZID
- TEGRETOL CR
- TEGRETOL SUSPENSION
- TEGRETOL TABLETS AND CHEWTABS
- TELMISARTAN (SANIS) – 40 AND 80 MG TABLETS
- TELMISARTAN (SIVEM) – 40 AND 80 MG TABLETS
- TELMISARTAN/HCTZ (SANIS) – 80/12.5 MG AND 80/25 MG TABLETS
- SULCRATE PLUS
- SULFINPYRAZONE (AA PHARMA) – 200 MG, COMPRIMÉS
- SULTRIN
- SUPEUDOL – 10 ET 20 MG, SUPPOSITOIRES
- SURESTEP, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE – MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- SUSTIVA – 50, 100, 200 MG, CAPSULES ET 600 MG, COMPRIMÉS
- SYMBICORT 100 – 100 MCG/6 MCG, TURBUHALER
- SYMBICORT 200 – 200 MCG/6 MCG, TURBUHALER
- SYNALAR, CRÈME, POMMADE ET SOLUTION
- SYNALAR BI-OTIQUE
- SYN-BROMOCRIPTINE
- SYN-CHOLESTYRAMINE LÉGER
- SYNPHASIC
- SYN-PINDOLOL
- SYNTHROID – 25, 50, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150, 175, 200 ET 300 MCG, COMPRIMÉS
- SERINGUES ET AIGUILLES (UNE DEMANDE D'INDEMNITÉ POUR PRODUITS INJECTABLES DOIT ÊTRE PRÉSENTÉE)
- TAGAMET, COMPRIMÉS
- TAMOFEN
- TAMONE
- TAPAZOLE
- TARO-ANASTROZOLE – 1 MG, COMPRIMÉS
- TARO-CARBAMAZÉPINE – 100 ET 200 MG, COMPRIMÉS MASTICABLES
- TARO-CARBAMAZEPINE – 100 MG/5 ML, SUSPENSION ORALE
- TARO-CLINDAMYCIN – 1 % SOLUTION TOPIQUE
- TARO-ENALAPRIL – 2.5, 5, 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- TARO-MOMETASONE – 0,1 %, CRÈME
- TARO-MOMETASONE – 0,1 %, LOTION
- TARO-MOMETASONE – 0,1 %, POMMADE
- TARO-PHENYTOIN – 25 MG/ML, SUSPENSION
- TARO-SONE – 0,1 %, CRÈME TOPIQUE
- TARO-WARFARINE – 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7.5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- TEBRAZID
- TÉGRÉTOL CR
- TEGRETOL, SUSPENSION
- TÉGRÉTOL, COMPRIMÉS ET COMPRIMÉS MASTICABLES
- TELMISARTAN (SANIS) – 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- TELMISARTAN (SIVEM) – 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- TELMISARTAN/HCTZ (SANIS) – 80/12,5 MG ET 80/25 MG, COMPRIMÉS

- TELMISARTAN/HCTZ (SIVEM) - 80/12.5 AND 80/25 MG TABLETS
- TELZIR - 700 MG TABLETS
- TEMODAL - 5, 20, 100, 140, 180 AND 250 MG CAPSULES
- TENORETIC
- TENORMIN
- TENOXICAM (AA PHARMA) - 20 MG TABLETS

- TERAZOSIN (SANIS) - 1, 2, 5 AND 10 MG TABLETS
- TERBINAFINE (SANIS) - 250 MG TABLETS
- TERBINAFINE (SIVEM) - 250 MG TABLETS
- TERFLUZINE
- TESTOSTERONE CYPIONATE - 100 MG/ML INJECTION
- TETRABENAZINE (STERIMAX) - 25 MG TABLETS
- TETRACYCLINE (AA PHARMA) - 250 MG CAPSULES
- TETRACYN
- TEVA-ALFUZOSIN PR - 10 MG TABLETS
- TEVA-ALPRAZOLAM - 0.25 AND 0.5 MG TABLETS
- TEVA-AMIODARONE - 200 MG TABLETS
- TEVA-AMLODIPINE - 5 AND 10 MG TABLETS
- TEVA-ATENOLOL - 25, 50 AND 100 MG TABLETS
- TEVA-ATENOLOL/CHLOROTHILADONE - 50/25 AND 100/25 MG TABLETS
- TEVA-AZATHIOPRINE - 50 MG TABLETS
- TEVA-CANDESARTAN - 8, 16 AND 32 MG TABLETS
- TEVA-CANDESARTAN/HCTZ - 16/12.5 MG TABLETS
- TEVA-CAPECITABINE - 150 AND 500 MG TABLETS
- TEVA-CARBAMAZEPINE - 200 MG TABLETS

- TEVA-CHLORPROMAZINE - 25 MG TABLETS

- TEVA-CHLORPROMAZINE - 25, 50 AND 100 MG TABLETS
- TEVA-CITALOPRAM - 10, 20 AND 40 MG TABLETS
- TEVA-CLINDAMYCIN - 150 AND 300 MG CAPSULES
- TEVA-COMBO STERINEBS - 0.2/1 MG/ML
- TEVA-CLOPIDOGREL - 75 MG TABLETS
- TEVA-DOMPERIDONE - 10 MG TABLETS
- TEVA-DORZOTIMOL - 2%/0.05% OPHTHALMIC SOLUTION
- TEVA-EFAVINREZ - 600 MG TABLETS
- TEVA-ENTACAPONE - 200 MG TABLETS
- TEVA-FLUOXETINE - 10 AND 20 MG TABLETS

- TELMISARTAN/HCTZ (SIVEM) - 80/12,5 ET 80/25 MG, COMPRIMÉS
- TELZIR - 700 MG, COMPRIMÉS
- TEMODAL - 5, 20, 100, 140, 180 ET 250 MG, CAPSULES
- TENORETIC
- TENORMIN
- TENOXICAM (AA PHARMA) - 20 MG, COMPRIMÉS
- TERAZOSIN (SANIS) - 1, 2, 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- TERBINAFINE (SANIS) - 250 MG, COMPRIMÉS
- TERBINAFINE (SIVEM) - 250 MG, COMPRIMÉS
- TERFLUZINE
- TESTOSTÉRONE (CYPIONATE DE) - 100 MG/ML, INJECTION
- TETRABENAZINE (STERIMAX) - 25 MG, COMPRIMÉS
- TETRACYCLINE (AA PHARMA) - 250 MG, CAPSULES
- TÉTRACYNE
- TEVA-ALFUZOSIN PR - 10 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-ALPRAZOLAM - 0.25 AND 0.5 MG TABLETS
- TEVA-AMIODARONE - 200 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-AMLODIPINE - 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-ATENOLOL - 25, 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-ATENOLOL/CHLOROTHILADONE - 50/25 ET 100/25 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-AZATHIOPRINE - 50 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-CANDESARTAN - 8, 16 ET 32 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-CANDESARTAN/HCTZ - 16/12,5 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-CAPECITABINE - 150 ET 500 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-CARBAMAZEPINE - 200 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-CHLORPROMAZINE - 25 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-CHLORPROMAZINE - 25, 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-CITALOPRAM - 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-CLINDAMYCIN - 150 ET 300 MG, CAPSULES
- TEVA-COMBO STERINEBS - 0.2/1 MG/ML
- TEVA-CLOPIDOGREL - 75 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-DOMPERIDONE - 10 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-DORZOTIMOL - 2 %/0,05 %, SOLUTION OPHTHALMIQUE
- TEVA-EFAVINREZ - 600 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-ENTACAPONE - 200 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-FLUOXETINE - 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS

- TEVA-FLUVASTATIN – 20 AND 40 MG TABLETS
- TEVA-FOSINOPRIL – 10 AND 20 MG TABLETS
- TEVA-GABAPENTIN – 100, 200, 300, 400 AND 600 MG CAPSULES
- TEVA-GABAPENTIN – 100, 300, 400, 600 AND 850 MG TABLETS
- TEVA-GLYBURIDE – 2.5 AND 5 MG TABLETS
- TEVA-HYDROCHLOROTHIAZIDE – 25 AND 50 MG TABLETS
- TEVA-HYDROMORPHONE – 1, 2, 4 AND 8 MG TABLETS
- TEVA-IPRATROPIUM STERINEBS – 0.25 MG/ML
- TEVA-IRBESARTAN – 75, 150 AND 300 MG TABLETS
- TEVA-IRBESARTAN HCTZ – 150/12.5, 300/12.5 AND 300/25 MG TABLETS
- TEVA-LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE – 150/300 MG TABLETS
- TEVA-LAMOTRIGINE – 25, 100 AND 150 MG TABLETS
- TEVA-LETROZOLE – 2.5 MG TABLETS
- TEVA-LISINOPRIL (TYPE P) – 5, 10 AND 20 MG TABLETS
- TEVA-LISINOPRIL/HCTZ (TYPE P) – 10/12.5, 20/12.5 AND 20/25 MG TABLETS
- TEVA-LOSARTAN – 25, 50 AND 100 MG TABLETS
- TEVA-LOSARTAN HCTZ – 50/12.5, 100/12.5 AND 100/25 MG TABLETS
- TEVA-METOPROLOL – 50 AND 100 MG FILM COATED TABLETS
- TEVA-METOPROLOL – 25, 50 AND 100 MG UNCOATED TABLETS
- TEVA-NABILONE – 0.5 AND 1 MG CAPSULES
- TEVA-NAPROXEN – 250, 375 AND 500 MG TABLETS
- TEVA-NEVIRAPINE – 200 MG TABLETS
- TEVA-OLANZAPINE – 2.5, 5, 7.5, 10 AND 15 MG TABLETS
- TEVA-OMEPRAZOLE – 20 MG TABLETS
- TEVA-PANTOPRAZOLE – 40 MG TABLETS
- TEVA-PAROXETINE – 10, 20 AND 30 MG TABLETS
- TEVA-QUETIAPINE XR – 50, 150, 200, 300 AND 400 MG TABLETS
- TEVA-RABEPRAZOLE EC – 10 AND 20 MG TABLETS
- TEVA-RAMIPRIL – 2.5, 5 AND 10 MG CAPSULES
- TEVA-RAMIPRIL – 2.5, 5 AND 10 MG TABLETS
- TEVA-ROSUVASTATIN – 10, 20 AND 40 MG TABLETS
- TEVA-SALBUTAMOL HFA – 100 MCG INHALER
- TEVA-FLUVASTATIN – 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-FOSINOPRIL – 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-GABAPENTIN – 100, 200, 300, 400 ET 600 MG, CAPSULES
- TEVA-GABAPENTIN – 100, 300, 400, 600 ET 850 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-GLYBURIDE – 2,5 ET 5 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-HYDROCHLOROTHIAZIDE – 25 ET 50 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-HYDROMORPHONE – 1, 2, 4 ET 8 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-IPRATROPIUM STERINEBS – 0,25 MG/ML
- TEVA-IRBESARTAN – 75, 150 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-IRBESARTAN HCTZ – 150/12,5, 300/12,5 ET 300/25 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE – 150/300 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-LAMOTRIGINE – 25, 100 ET 150 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-LETROZOLE – 2,5 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-LISINOPRIL (TYPE P) – 5, 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-LISINOPRIL/HCTZ (TYPE P) – 10/12,5, 20/12,5 ET 20/25 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-LOSARTAN – 25, 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-LOSARTAN HCTZ – 50/12,5, 100/12,5 ET 100/25 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-METOPROLOL – 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS ENROBÉS D'UNE PELLICULE
- TEVA-METOPROLOL – 25, 50 ET 100 MG, COMPRIMÉS NON ENROBÉS
- TEVA-NABILONE – 0,5 ET 1 MG, CAPSULES
- TEVA-NAPROXEN – 250, 375 ET 500 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-NEVIRAPINE – 200 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-OLANZAPINE – 2,5, 5, 7,5, 10 ET 15 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-OMEPRAZOLE – 20 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-PANTOPRAZOLE – 40 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-PAROXETINE – 10, 20 ET 30 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-QUETIAPINE XR – 50, 150, 200, 300 ET 400 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-RABEPRAZOLE EC – 2,5, 5 ET 10 MG, CAPSULES
- TEVA-RABEPRAZOLE EC – 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-RAMIPRIL – 2,5, 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-ROSUVASTATIN – 10, 20 ET 40 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-SALBUTAMOL HFA – 100 MCG, AÉROSOL INHALATEUR

- TEVA-SALBUTAMOL STERINEBS – 1 MG/ML AND 2 MG/ML – TO A MAXIMUM OF 1,460 UNIT DOSE STERINEBS PER BENEFIT YEAR
- TEVA-SERTRALINE – 100 MG CAPULES
- TEVA-SIMVASTATIN – 5, 10, 20, 40 AND 80 MG TABLETS
- TEVA-TAMSULOSIN CR – 0.4 MG TABLETS
- TEVA-TELMISARTAN – 40 AND 80 MG TABLETS
- TEVA-TELMISARTAN HCTZ – 80/12.5 AND 80/25 MG TABLETS
- TEVA-TERAZOSIN – 1, 2, 5 AND 10 MG TABLETS
- TEVA-TRAZODONE – 50, 100 AND 150 MG TABLETS
- TEVA-VALSARTAN – 40, 80, 160 AND 320 MG TABLETS
- TEVA-VALSARTAN HCTZ – 80/12.5, 160/12.5, 160/25, 320/12.5 AND 320/25 MG TABLETS
- TEVA-VENLAFAXINE XR – 37.5, 75 AND 150 MG CAPSULES
- TEVETEN – 400 AND 600 MG TABLETS
- TEVETEN PLUS – 600 MG/12.5 MG TABLETS
- TEXACORT
- THEOCHRON
- THEO-DUR
- THEO ER – 400 AND 600 MG TABLETS
- THEOLAIR TABLETS AND LIQUID
- THEOLAIR-SR
- THEOPHYLLINE ELIXIR
- THEO-SR
- 3TC – 150 AND 300 MG TABLETS
- TIAMOL
- TIAZAC EXTENDED RELEASE CAPSULES
- TIAZAC XC – 120, 180, 240, 300 AND 360 MG EXTENDED RELEASE TABLETS
- TIMOLIDE
- TIMOLOL MALEATE GEL FORMING SOLUTION – 0.25 AND 0.5% GEL FORMING SOLUTION
- TIMOLOL MALEATE OPHTHALMIC SOLUTION (SABEX)
- TIMOPTIC
- TIMOPTIC XE
- TIMPILO
- TOBRAMYCIN (SANDOZ) – 40 MG/ML INJECTION
- TOBRAMYCIN (JAMP) – 40 MG/ML INJECTION
- TOLBUTAMIDE (AA PHARMA) – 500 MG TABLETS
- TOLOXIN – 0.05 MG/ML ORAL ELIXER
- TOLOXIN – 0.0625, 0.125 AND 0.25 MG TABLETS
- TONOCARD
- TEVA-SALBUTAMOL STERINEBS – 1 MG/ML ET 2 MG/ML, MAXIMUM DE 1 460 DOSES UNITAIRES (STERULES) PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- TEVA-SERTRALINE – 100 MG, CAPSULES
- TEVA-SIMVASTATIN – 5, 10, 20, 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-TAMSULOSIN CR – 0,4 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-TELMISARTAN – 40 ET 80 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-TELMISARTAN HCTZ – 80/12,5 ET 80/25 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-TERAZOSIN – 1, 2, 5 ET 10 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-TRAZODONE – 50, 100 ET 150 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-VALSARTAN – 40, 80, 160 ET 320 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-VALSARTAN HCTZ – 80/12,5, 160/12,5, 160/25, 320/12,5 ET 320/25 MG, COMPRIMÉS
- TEVA-VENLAFAXINE XR – 37,5, 75 ET 150 MG, CAPSULES
- TEVETEN – 400 ET 600 MG, COMPRIMÉS
- TEVETEN PLUS – 600/12,5 MG, COMPRIMÉS
- TEXACORT
- THÉOCHRON
- THÉO-DUR
- THEO ER – 400 ET 600 MG, COMPRIMÉS
- THÉOLAIR, COMPRIMÉS ET LIQUIDE
- THÉOLAIR-SR
- THÉOPHYLLINE, ÉLIXIR
- THÉO-SR
- 3TC – 150 et 300 MG, COMPRIMÉS
- TIAMOL
- TIAZAC, CAPSULES À LIBÉRATION PROLONGÉE
- TIAZAC XC – 120, 180, 240, 300 ET 360 MG, COMPRIMÉS À LIBÉRATION PROLONGÉE
- TIMOLIDE
- MALÉATE DE TIMOLOL – 0,25 % ET 0,5 %, SOLUTION OPHTALMIQUE GEL
- TIMOLOL (MALÉATE DE), SOLUTION OPHTALMIQUE (SABEX)
- TIMOPTIC
- TIMOPTIC XE
- TIMPILO
- TOBRAMYCINE (SANDOS) – 40 MG/ML, INJECTION
- TOBRAMYCINE (JAMP) – 40 MG/ML, INJECTION
- TOLBUTAMIDE (AA PHARMA) – 500 MG, COMPRIMÉS
- TOLOXIN – 0,05 MG/ML, ÉLIXIR
- TOLOXIN – 0,0625, 0,125 ET 0,25 MG, COMPRIMÉS
- TONOCARD

- TOPAMAX – 15 MG AND 25 MG – SPRINKLE CAPSULES
 - TOPAMAX – 25, 100 AND 200 MG TABLETS
 - TOPICORT
 - TOPICORT MILD
 - TOPIRAMATE (SANIS) – 25, 100 AND 200 MG TABLETS
 - TORADOL PARENTERAL
 - TRANDATE TABLETS
 - TRANSDERM-NITRO
 - TRANSEXAMIC ACID (STERIMAX) – 500 MG TABLETS
 - TRASICOR
 - TRAVATAN Z – 0.004% OPHTHALMIC SOLUTION
 - TRAZODONE (SANIS) – 50, 100 AND 150 MG TABLETS
 - TRAZOREL TABLETS
 - TRENTAL
 - TRIADERM – 0.1% TOPICAL CREAM
 - TRIAZOLAM (AA PHARMA) – 0.125 AND 0.25 MG TABLETS
 - TRI-CYCLEN
 - TRI-CYCLEN LO – 21 AND 28 DAY TABLETS

 - TRIDESILON CREAM
 - TRIFLUOPERAZINE (AA PHARMA) – 2, 5, 10 AND 20 MG TABLETS
 - TRILAFON – 5 MG/ML INJECTION
 - TRIMEBUTINE (AA PHARMA) – 100 AND 200 MG TABLETS
 - TRIMETHOPRIM (AA PHARMA) – 100 AND 200 MG TABLETS
 - TRIMIPRAMINE (AA PHARMA) – 12.5, 25, 50 AND 75 MG TABLETS
 - TRINIPATCH – 0.2, 0.4 AND 0.6 MG PATCHES
 - TRIQUILAR
 - TRISYN
 - TRIZIVIR – 300 MG/150 MG/300 MG TABLETS

 - TRUETEST BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS – TO A MAXIMUM OF 4,000 STRIPS PER BENEFIT YEAR
 - TRUSOPT
 - T-STAT PREMOISTENED PADS
 - TWINJECT – 0.3 AND 0.15 MG INJECTION
 - 282
 - TYLENOL WITH CODEINE NO. 2, NO. 3, NO. 4
 - ULTICARE 32G (4 MM) PEN NEEDLE

 - ULTICARE SYRINGES
 - ULTRA-FINE NANO – 32G NEEDLE
 - ULTRALENTE INSULIN
 - ULTRAMOP CAPSULES AND LOTION
 - ULTRASE
 - ULTRASE MT 12 AND MT 20
- TOPAMAX – 15 MG ET 25 MG, CAPSULES À SAUPOUDRER
 - TOPAMAX – 25, 100 ET 200 MG, COMPRIMÉS
 - TOPICORT
 - TOPICORT DOUX
 - TOPIRAMATE (SANIS) – 25, 100 ET 200 MG, COMPRIMÉS
 - TORADOL, PARENTÉRAL
 - TRANDATE, COMPRIMÉS
 - TRANSDERM-NITRO
 - TRANSEXAMIC ACID (STERIMAX) – 500 MG, COMPRIMÉS
 - TRASICOR
 - TRAVATAN Z – 0,004 %, SOLUTION OPHTHALMIQUE
 - TRAZODONE (SANIS) – 50, 100 ET 150 MG, COMPRIMÉS
 - TRAZOREL, COMPRIMÉS
 - TRENTAL
 - TRIADERM – 0,1 %, CRÈME TOPIQUE
 - TRIAZOLAM (AA PHARMA) – 0,125 ET 0,25 MG, COMPRIMÉS
 - TRI-CYCLEN
 - TRI-CYCLEN LO – 21 ET 28 JOURS, COMPRIMÉS QUOTIDIENS
 - TRIDÉSILON, CRÈME
 - TRIFLUOPERAZINE (AA PHARMA) – 2, 5, 10 ET 20 MG, COMPRIMÉS
 - TRILAFON – 5 MG/ML, INJECTION
 - TRIMEBUTINE (AA PHARMA) – 100 ET 200 MG, COMPRIMÉS
 - TRIMETHOPRIM (AA PHARMA) – 100 ET 200 MG, COMPRIMÉS
 - TRIMIPRAMINE (AA PHARMA) – 12,5, 25, 50 ET 75 MG, COMPRIMÉS
 - TRINIPATCH – TIMBRES DE 0,2, 0,4 ET 0,6 MG
 - TRIQUILAR
 - TRISYN
 - TRIZIVIR – 300 MG/150 MG/300 MG, COMPRIMÉS

 - TRUETEST, BÂTONNETS POUR ÉPREUVE DE GLYCÉMIE – MAXIMUM DE 4 000 PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
 - TRUSOPT
 - T-STAT, COMPRESSES HUMIDES
 - TWINJECT – 0,3 ET 0,15 MG, INJECTION
 - 282
 - TYLÉNOL AVEC CODÉINE N° 2, N° 3, N° 4
 - ULTICARE – 32G (4 MM), AIGUILLES POUR STYLO INJECTEUR
 - ULTICARE, SERINGUES
 - AIGUILLE ULTRA-FINE NANO – CALIBRE 32
 - INSULINE ULTRALENTE
 - ULTRAMOP, CAPSULES ET LOTION
 - ULTRASE
 - ULTRASE MT 12 ET MT 20

- ULTRA SOFT LANCET
- ULTRAVATE – 0.05% CREAM
- ULTRAVATE OINTMENT
- UNIPHYL
- URISPAS
- URISTIX
- URITOL
- UROMITEXAN
- URSO – 250 MG TABLETS
- URSO DS – 500 MG TABLETS
- URSOFALK
- VAGIFEM – 10 MCG VAGINAL TABLETS
- VALCYTE – 450 MG TABLETS
- VALISONE-G CREAM AND OINTMENT
- VALISONE SCALP LOTION
- VALIUM TABLETS
- VALSARTAN – 40, 80, 160 AND 320 MG TABLETS
- VALSARTAN HCT (SANIS) – 80/12.5, 160/12.5, 160/25, 320/12.5 AND 320/25 MG TABLETS
- VALTAXIN – 40 MG/ML INJECTION
- VALTREX – 500 MG CAPLETS
- VANCOCIN – 500 MG INJECTION
- VAPONEFRIN NEBULIZER
- VASERETIC
- VASERETIC – 5 MG/12.5 MG TABLETS
- VASOCIDIN
- VASOTEC TABLETS
- V-CILLIN K SOLUTION
- VELBE
- VELOSULIN
- VELOSULIN HUMAN
- VENLAFAXINE XR (SANIS) – 37.5, 75 AND 150 MG CAPSULES
- VENLAFAXINE XR (SIVEM) – 37.5, 75 AND 150 MG CAPSULES
- VENTHALER
- VENTA – 170 – SPACER
- VENTODISK DISKHALER
- VENTOLIN – 5 MG/ML RESPIRATOR SOLUTION TO A MAXIMUM OF 1,460 ML PER BENEFIT YEAR
- VENTOLIN HFA – 100 MCG METERED DOSE INHALER
- VENTOLIN INJECTION
- VENTOLIN NEBULES P.F. – 0.5, 1 AND 2 MG/ML UNIT DOSE NEBULES TO A MAXIMUM OF 1,460 UNIT DOSE NEBULES PER BENEFIT YEAR
- VENTOLIN ORAL LIQUID
- VENTOLIN ROTACAPS
- VENTOLIN ROTAHALER
- VENTOLIN TABLETS
- VEPESID CAPSULES AND INJECTION
- VIADERM-K.C. CREAM
- VIDEX EC – 125, 200, 250 AND 400 MG CAPSULES
- ULTRA SOFT, LANCETTE
- ULTRAVATE – 0,05 %, CRÈME
- ULTRAVATE, POMMADE
- UNIPHYL
- URISPAS
- URISTIX
- URITOL
- UROMITEXAN
- URSO – 250 MG, COMPRIMÉS
- URSO DS – 500 MG, COMPRIMÉS
- URSOFALK
- VAGIFEM – 10 MCG, COMPRIMÉS VAGINAUX
- VALCYTE – 450 MG, COMPRIMÉS
- VALISONE-G, CRÈME ET POMMADE
- VALISONE, LOTION CAPILLAIRE
- VALIUM, COMPRIMÉS
- VALSARTAN – 40, 80, 160 ET 320 MG, COMPRIMÉS
- VALSARTAN HCT (SANIS) – 80/12,5, 160/12,5, 160/25, 320/12,5 ET 320/25 MG, COMPRIMÉS
- VALTAXIN – 40 MG/ML, INJECTION
- VALTREX – 500 MG, COMPRIMÉS ENROBÉS
- VANCOCIN – 500 MG, INJECTION
- VAPONÉFRINE, NÉBULISEUR
- VASERETIC
- VASERETIC – 5 MG/12,5 MG, COMPRIMÉS
- VASOCIDIN
- VASOTEC, COMPRIMÉS
- V-CILLIN K, SOLUTION
- VELBE
- VELOSULINE
- VELOSULINE HUMAINE
- VENLAFAXINE XR (SANIS) – 37,5, 75 ET 150 MG, CAPSULES
- VENLAFAXINE XR (SIVEM) – 37,5, 75 ET 150 MG, CAPSULES
- VENTHALER
- VENTA – 170 – SPACER
- VENTODISK DISKHALER
- VENTOLIN – 5 MG/ML, SOLUTION POUR RESPIRATEUR, MAXIMUM DE 1 460 ML PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- VENTOLIN HFA – 100 MCG, AÉROSOL DOSEUR
- VENTOLIN, INJECTION
- VENTOLIN NEBULES P.F. – 0,5, 1 ET 2 MG/ML, NÉBULISEUR PAR DOSE UNITAIRE, MAXIMUM DE 1 460 DOSES UNITAIRES (NEBULES) PAR ANNÉE D'INDEMNISATION
- VENTOLIN, LIQUIDE ORAL
- VENTOLIN ROTACAPS
- VENTOLIN ROTAHALER
- VENTOLIN, COMPRIMÉS
- VÉPÉSIDE, CAPSULES ET INJECTION
- VIADERM-K.C., CRÈME
- VIDEX EC – 125, 200, 250 ET 400 MG, CAPSULES

- VINBLASTINE SULFATE
- VINCRISTINE SULFATE
- VIOKASE-8 TABLETS
- VIOKASE-16 TABLETS
- VIOKASE POWDER
- VIRA-A OPHTHALMIC OINTMENT
- VIRACEPT – 250 AND 625 MG TABLETS AND 50 MG/G ORAL POWDER
- VIRAMUNE – 200 MG TABLETS
- VIROPTIC
- VISKEN
- VITAMIN B₁₂ INJECTION
- VITAMIN K₁ INJECTION
- VITINOIN CREAM AND GEL
- VIVOL
- VOLTAREN TABLETS AND SUPPOSITORIES
- VOLTAREN OPHTHA
- VOLTAREN SR
- VUMON
- VYVANSE – 20, 30, 40, 50, 60 MG CAPSULES

- WARFILONE
- WELLBUTRIN SR – 150 MG TABLETS
- WELLBUTRIN XL – 150 AND 300 MG TABLETS

- WINPRED
- XALACOM – 50 MCG/ML – 5 MG/ML OPHTHALMIC SOLUTION
- XALATAN
- XANAX
- XATRAL – 10 MG TABLETS
- XELODA – 150 AND 500 MG TABLETS
- XYLAC – 25 MG/ML ORAL SOLUTION
- XYLAC – 2.5, 5, 10, 25 AND 50 MG TABLETS
- YASMIN 21 YASMIN 28 – 3 MG/30 MCG TABLETS
- YAZ – 3 MG/0.02 MG TABLETS
- YUTOPAR
- YUTOPAR-SR
- ZAMINE 21 AND ZAMINE 28 – 3 MG/0.03 MG TABLETS
- ZANOSAR
- ZANTAC INJECTION – 50 MG/2 ML
- ZANTAC TABLETS
- ZARAH 21 AND ZARAH 28 – 3 MG/0.03 MG TABLETS
- ZARONTIN CAPSULES AND SYRUP
- ZAROXOLYN
- ZELDOX – 20, 40, 60 AND 80 MG CAPSULES
- ZENHALE – 5/50 MCG, 5/100 MCG AND 5/200 MCG METERED DOSE INHALER
- ZERIT – 5, 15, 20, 30 AND 40 MG CAPSULES
- ZESTORETIC
- ZESTRIL
- ZIAGEN – 300 MG TABLETS AND 20 MG/ML ORAL SOLUTION

- VINBLASTINE (SULFATE DE)
- VINCRISTINE (SULFATE DE)
- VIOKASE-8, COMPRIMÉS
- VIOKASE-16, COMPRIMÉS
- VIOKASE, POUDRE
- VIRA-A, POMMADE OPHTALMIQUE
- VIRACEPT – 250 ET 625 MG, COMPRIMÉS ET 50 MG/G, POUDRE ORALE
- VIRAMUNE – 200 MG, COMPRIMÉS
- VIROPTIC
- VISKEN
- VITAMIN B₁₂, INJECTION
- VITAMIN K₁, INJECTION
- VITINOIN, CRÈME ET GEL
- VIVOL
- VOLTAREN, COMPRIMÉS ET SUPPOSITOIRES
- VOLTAREN OPHTA
- VOLTAREN SR
- VUMON
- VYVANSE – 20, 30, 40, 50 ET 60 MG, CAPSULES
- WARFILONE
- WELLBUTRIN SR – 150 MG, COMPRIMÉS
- WELLBUTRIN XL – 150 ET 300 MG, COMPRIMÉS
- WINPRED
- XALACOM – 50 MCG/ML – 5 MG/ML, SOLUTION OPHTALMIQUE
- XALATAN
- XANAX
- XATRAL – 10 MG, COMPRIMÉS
- XELODA – 150 ET 500 MG, COMPRIMÉS
- XYLAC – 25 MG/ML, SOLUTION ORALE
- XYLAC – 2,5, 5, 10, 25 ET 50 MG, COMPRIMÉS
- YASMIN 21 YASMIN 28 – 3 MG/30 MCG, COMPRIMÉS
- YAZ – 3 MG/0,02 MG, COMPRIMÉS
- YUTOPAR
- YUTOPAR-SR
- ZAMINE 21 ET ZAMINE 28 – 3 MG/0,03 MG, COMPRIMÉS
- ZANOSAR
- ZANTAC – 50 MG/2 ML, INJECTION
- ZANTAC, COMPRIMÉS
- ZARAH 21 ET ZARAH 28 – 3 MG/0,03 MG, COMPRIMÉS
- ZARONTIN, CAPSULES ET SIROP
- ZAROXOLYN
- ZELDOX – 20, 40, 60 ET 80 MG, CAPSULES
- ZENHALE – 5/50 MCG, 5/100 MCG ET 5/200 MCG, AÉROSOL DOSEUR
- ZERIT – 5, 15, 20, 30 ET 40 MG, CAPSULES
- ZESTORETIC
- ZESTRIL
- ZIAGEN – 300 MG, COMPRIMÉS ET 20 MG/ML, SOLUTION ORALE

- ZINDA-ANASTROZOLE – 1 MG TABLETS
 - ZINDA-LETROZOLE – 2.5 MG TABLETS
 - ZOCOR – 5 MG, 10 MG, 20 MG, 40 MG, 80 MG TABLETS
 - ZOFRAN ODT – 4 MG, 8 MG TABLETS
 - ZOFRAN ORAL SOLUTION
 - ZOFRAN TABLETS
 - ZOLOFT
 - ZOPICLONE (SANIS) – 5 AND 7.5 MG TABLETS

 - ZOPICLONE (SIVEM) – 5 AND 7.5 MG TABLETS

 - ZOVIRAX TABLETS, CREAM, OINTMENT, SUSPENSION AND INJECTION
 - ZYLOPRIM (AA PHARMA) – 100, 200 AND 300 MG TABLETS
 - ZYM-METFORMIN – 500 MG TABLETS
 - ZYPREXA – 2.5, 5, 7.5, 10 AND 15 MG TABLETS

 - ZYPREXA ZYDIS – 5, 10 AND 15 MG ORALLY DISINTEGRATING TABLETS

 - EXTEMPORANEOUS COMPOUNDED PRESCRIPTIONS WHEN THEY CONTAIN ONE OR MORE SPECIFIED DRUGS LISTED IN THIS SECTION AND ARE NOT THE SAME AS OR SIMILAR TO THE FORMULATION OF A MANUFACTURED DRUG PRODUCT.
- ZINDA-ANASTROZOLE – 1 MG, COMPRIMÉS
 - ZINDA-LETROZOLE – 2,5 MG, COMPRIMÉS
 - ZOCOR – 5 MG, 10 MG, 20 MG, 40 MG ET 80 MG, COMPRIMÉS
 - ZOFRAN ODT – 4 MG, 8 MG, COMPRIMÉS
 - ZOFRAN, SOLUTION ORALE
 - ZOFRAN, COMPRIMÉS
 - ZOLOFT
 - ZOPICLONE (SANIS) – 5 ET 7,5 MG, COMPRIMÉS
 - ZOPICLONE (SIVEM) – 5 ET 7,5 MG, COMPRIMÉS
 - ZOVIRAX, COMPRIMÉS, CRÈME, POMMADE, SUSPENSION ET INJECTION
 - ZYLOPRIM (AA PHARMA) – 100, 200 ET 300 MG, COMPRIMÉS
 - ZYM-METFORMIN – 500 MG, COMPRIMÉS
 - ZYPREXA – 2,5, 5, 7,5, 10 et 15 MG, COMPRIMÉS
 - ZYPREXA ZYDIS – 5, 10 ET 15 MG, COMPRIMÉS À DISSOLUTION ORALE

 - LES ORDONNANCES COMPOSÉES SUR PLACE LORSQU'ELLES CONTIENNENT UN OU PLUSIEURS DES MÉDICAMENTS COUVERTS ÉNUMÉRÉS DANS LA PRÉSENTE SECTION ET QUI NE SONT PAS IDENTIQUES OU SEMBLABLES À UN PRODUIT PHARMACEUTIQUE FABRIQUÉ SELON UNE FORMULE ÉTABLIE.

PART 2

PARTIE 2

Any one of the following for the length of time and conditions specified:

- ACCEL-CLARITHROMYCIN – 125 mg/5 mL and 250 mg/5 mL Powder for suspension – For the treatment of patients:

(a) not responding to or intolerant of alternative antibiotics (eg. Amoxicillin and erythromycin);

(b) with mycobacterial infections due to mycobacterium avium and mycobacterium intracellulare;

(c) in combination therapy in the treatment of H. Pylori;

(d) with pneumonia; or

(e) with infections requiring a macrolide (including CAP in patients 65 and older) with documented intolerance to erythromycin.

- ACCOLATE – 20 mg Tablets – Indicated as adjunctive therapy for asthma in cases where:

(a) maximum doses of inhaled corticosteroids have not effectively controlled symptoms, or

(b) evidence of serious adverse effects associated with corticosteroids exists, eg. adrenal suppression, increased lung infections.

- AMERGE – 1 mg and 2.5 mg Tablets – For the treatment of ACUTE migraine attacks in patients where standard therapy has failed – to a maximum of 144 tablets per benefit year.

- APO-AMOXI CLAV – 250 mg/125 mg, 500 mg/125 mg and 875 mg/125 mg Tablets and 25/6.25 mg/mL, 50/12.5 mg/mL and 400/57 mg/5 mL Suspension –

(a) for the treatment of patients not responding to alternative antibiotics (eg. amoxicillin);

Les médicaments énumérés ci-après, pour la période et selon les modalités énoncées :

- ACCEL-CLARITHROMYCIN – poudre pour suspension, 125 et 250 mg/5 ml – pour le traitement :

a) des malades qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais ou qui ne les tolèrent pas (p. ex. amoxicilline et érythromycine);

b) des malades ayant des mycobactérioses provoquées par le mycobacterium avium et le mycobacterium intracellulare;

c) des ulcères causés par l'hélicobacter pylori chez les malades qui subissent une pharmacothérapie mixte;

d) des pneumonies;

e) des infections exigeant des macrolides (y compris les pneumonies d'origine communautaire contractées par des personnes d'au moins 65 ans) chez les patients qui ne tolèrent pas l'érythromycine.

- ACCOLATE – comprimés, 20 mg – traitement d'appoint pour l'asthme dans les cas suivants :

a) les doses maximales de corticostéroïdes administrées par inhalation n'ont pas contrôlé les symptômes de façon efficace;

b) des réactions indésirables à l'utilisation de corticostéroïdes sont à craindre, p. ex. suppression surrénale, infection aggravée des poumons.

- AMERGE – comprimés, 1 mg et 2,5 mg – pour le traitement des migraines AIGUËS lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas. Maximum de 144 comprimés par année d'indemnisation.

- APO-AMOXI CLAV – suspension, 250 mg/125 mg, 500 mg/125 mg et 875 mg/125 mg, comprimés et 25/6,25 mg/ml, 50/12,5 mg/ml et 400/57 mg/5 ml –

a) pour le traitement des malades qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais (p. ex. amoxicilline);

- (b) for the treatment of patients with infections caused by organisms known to be resistant to alternative antibiotics (eg. amoxicillin).
- APO-AZITHROMYCIN – 250 mg Tablets – For the treatment of patients:
- (a) not responding to or intolerant of alternative antibiotics (eg. amoxicillin and erythromycin);
- (b) with mycobacterial infections due to mycobacterium avium and mycobacterium intracellulare;
- (c) with sexually transmitted disease due to Chlamydia.
- APO-AZITHROMYCIN Z – 250 mg Tablets – For the treatment of patients:
- (a) not responding to or intolerant of alternative antibiotics (eg. amoxicillin and erythromycin);
- (b) with mycobacterial infections due to mycobacterium avium and mycobacterium intracellulare;
- (c) with sexually transmitted disease due to Chlamydia.
- APO-CEFACLOR – 125, 250 and 375 mg/5 mL Suspension –
- (a) Step-down care following hospital separation in patients treated with intravenous cephalosporins;
- (b) Treatment of patients with infections not responding to alternative antibiotics (eg. amoxicillin);
- (c) Treatment of infections caused by organisms known to be resistant to alternative antibiotics (eg. amoxicillin);
- (d) Treatment of patients known to be allergic or unresponsive to alternative antibiotics (eg. penicillin or sulfonamides).
- b) pour le traitement des malades ayant des infections causées par des germes résistants aux antibiotiques de relais (p. ex. amoxicilline).
- APO-AZITHROMYCINE – comprimés, 250 mg – pour le traitement :
- a) des malades qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais ou qui ne les tolèrent pas (p. ex. amoxicilline et érythromycine);
- b) des malades ayant des mycobactérioses provoquées par le mycobacterium avium et le mycobacterium intracellulare;
- c) des maladies transmises sexuellement causées par la chlamydia.
- APO-AZITHROMYCIN Z – comprimés, 250 mg – pour le traitement :
- a) des malades qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais ou qui ne les tolèrent pas (p. ex. amoxicilline et érythromycine);
- b) des malades ayant des mycobactérioses provoquées par le mycobacterium avium et le mycobacterium intracellulare;
- c) des maladies transmises sexuellement causées par la chlamydia.
- APO-CEFACLOR – suspension, 125, 250 et 375 mg/5 ml –
- a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital chez les malades auxquels de la céphalosporine a été administrée par voie intraveineuse;
- b) traitement des malades ayant des infections sur lesquelles les antibiotiques de relais n'agissent pas (p. ex. amoxicilline);
- c) traitement des infections causées par des germes résistants aux antibiotiques de relais (p. ex. amoxicilline);
- d) traitement des malades qui ne réagissent pas ou qui sont allergiques aux antibiotiques de relais (p. ex. pénicillines et sulfonamides).

- APO-CEFPROZIL – 125 and 250 mg/5 mL Powder for Suspension and 250 and 500 mg Tablets –
 - (a) Step-down care following hospital separation in patients treated with intravenous cephalosporins;
 - (b) Treatment of patients with infections not responding to alternative antibiotics (eg. amoxicillin);
 - (c) Treatment of infections caused by organisms known to be resistant to alternative antibiotics (eg. amoxicillin);
 - (d) Treatment of patients known to be allergic or unresponsive to alternative antibiotics (eg. penicillin or sulfonamides).

- APO-CEFUROXIME – 250 and 500 mg Tablets –
 - (a) Step-down care following hospital separation in patients treated with intravenous cephalosporins;
 - (b) Treatment of patients with infections not responding to alternative antibiotics (eg. amoxicillin);
 - (c) Treatment of infections caused by organisms known to be resistant to alternative antibiotics (eg. amoxicillin);
 - (d) Treatment of patients known to be allergic or unresponsive to alternative antibiotics (eg. penicillin or sulfonamides).

- APO-CIPROFLOX – 0.3% Ophthalmic Solution – For the treatment of ophthalmic infections caused by gram-negative organisms or those not responding to alternative agents.

- APO-CIPROFLOX – 250, 500 and 750 mg Tablets
 - (a) Step-down care following hospital separation in patients treated with parenteral antibiotics;
 - (b) Treatment of Pseudomonal infections or resistant gram-negative infections;
 - (c) Treatment of resistant Gonococcal infections;

- APO-CEFPROZIL – poudre pour suspension, 125 et 250 mg/5 ml et comprimés, 250 et 500 mg –
 - a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital chez les malades auxquels de la céphalosporine a été administrée par voie intraveineuse;
 - b) traitement des malades ayant des infections sur lesquelles les antibiotiques de relais n'agissent pas (p. ex. amoxicilline);
 - c) traitement des infections causées par des germes résistants aux antibiotiques de relais (p. ex. amoxicilline);
 - d) traitement des malades qui ne réagissent pas ou qui sont allergiques aux antibiotiques de relais (p. ex. pénicillines et sulfonamides).

- APO-CEFUROXIME – comprimés, 250 et 500 mg –
 - a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital chez les malades auxquels de la céphalosporine a été administrée par voie intraveineuse;
 - b) traitement des malades ayant des infections sur lesquelles les antibiotiques de relais n'agissent pas (p. ex. amoxicilline);
 - c) traitement des infections causées par des germes résistants aux antibiotiques de relais (p. ex. amoxicilline);
 - d) traitement des malades qui ne réagissent pas ou qui sont allergiques aux antibiotiques de relais (p. ex. pénicillines et sulfonamides).

- APO-CIPROFLOX – solution ophtalmique, 0,3 % – pour le traitement des infections ophtalmiques causées par des germes Gram négatif ou des organismes sur lesquels les agents de relais n'agissent pas.

- APO-CIPROFLOX – comprimés, 250, 500 et 750 mg –
 - a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital pour les malades auxquels des antibiotiques ont été administrés par voie parentérale;
 - b) traitement des infections pseudomonales ou des infections Gram négatif résistantes;
 - c) traitement des gonococcies résistantes;

- (d) Treatment of infections in persons allergic to alternative agents (eg. penicillins, cephalosporins and sulfonamides);
- (e) Treatment of infections in immunocompromised patients;
- (f) Treatment of diabetic foot infections and complications of orthopedic surgery;
- (g) Treatment of chronic bacterial prostatitis.
- APO-CLARITHROMYCIN – 250 and 500 mg Tablets – For treatment of patients:
- (a) not responding to or intolerant of alternative antibiotics (eg. amoxicillin and erythromycin);
- (b) with mycobacterial infections due to mycobacterium avium and mycobacterium intracellulare;
- (c) in combination therapy in the treatment of H. pylori;
- (d) Pneumonia;
- (e) Infections requiring a macrolide (including CAP in patients 65 and older) with documented intolerance to erythromycin.
- APO-CYCLOBENZAPRINE – 10 mg Tablets – As an adjunct to rest and physical therapy for relief of muscle spasm associated with acute, painful musculoskeletal conditions not responding to alternative therapy. Coverage will be provided for up to 126 tablets per benefit year.
- APO-DESMOPRESSIN – 0.1 and 0.2 mg Tablets – For the treatment of
- (a) diabetes insipidus;
- (b) enuresis in children refractory to alternative agents.
- d) traitement des infections chez les personnes allergiques aux agents de relais (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides);
- e) traitement des infections chez les malades immunodéprimés;
- f) traitement des infections de pied diabétique et des complications résultant d'une chirurgie orthopédique;
- g) traitement d'une prostatite bactérienne chronique.
- APO-CLARITHROMYCIN – comprimés, 250 et 500 mg – pour le traitement :
- a) des malades qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais ou qui ne les tolèrent pas (p. ex. amoxicilline et érythromycine);
- b) des malades ayant des mycobactérioses provoquées par le mycobacterium avium et le mycobacterium intracellulare;
- c) des ulcères causés par l'hélicobacter pylori chez les malades qui subissent une pharmacothérapie mixte;
- d) des pneumonies;
- e) des infections exigeant des macrolides (y compris les pneumonies d'origine communautaire contractées par des personnes d'au moins 65 ans) chez les patients qui ne tolèrent pas l'érythromycine.
- APO-CYCLOBENZAPRINE – comprimés, 10 mg – médicament d'appoint au repos et à la physiothérapie visant à soulager les spasmes musculaires associés à des troubles musculo-squelettiques aigus et douloureux que les autres formes de thérapie ne peuvent soulager. Un maximum de 126 comprimés sont pris en charge par année d'indemnisation.
- APO-DESMOPRESSIN – comprimés, 0,1 et 0,2 mg – pour le traitement :
- a) du diabète insipide;
- b) de l'énurésie chez les enfants qui sont réfractaires aux autres agents de traitement.

- APO-FENTANYL MATRIX – 25, 50, 75 and 100 mcg Patches – For the treatment of pain in patients unable to tolerate oral analgesics or when there is failure to adequately control pain with oral analgesics or in patients in whom oral analgesics are deemed inappropriate.
- APO-FENTANYL MATRIX – timbres, 25, 50, 75 et 100 mcg – pour le traitement de la douleur chez les malades qui ne peuvent supporter les analgésiques administrés par voie orale ou pour lesquels ils ne sont pas recommandés ou lorsque ces derniers ne peuvent réduire suffisamment la douleur.
- APO-FINASTERIDE – 5 mg Tablets – For the treatment of symptomatic benign prostatic hyperplasia.
- APO-FINASTERIDE – comprimés, 5 mg – pour le traitement de l'hyperplasie bénigne symptomatique.
- APO-FLUCONAZOLE – 150 mg Capsules – For single dose treatment of vaginal candidiasis in patients who fail or are intolerant to topical antifungal therapy.
- APO-FLUCONAZOLE – capsules, 150 mg – pour le traitement par dose unique, de candidoses vaginales chez les malades qui ne réagissent pas au traitement antifongique topique ou qui ne le tolèrent pas.
- APO-FLUCONAZOLE – 50 and 100 mg Tablets – For the prophylaxis and treatment of
 - (a) oropharyngeal and esophageal candidiasis in immunocompromised patients; and
 - (b) systemic fungal infections other than oropharyngeal candidiasis.
- APO-FLUCONAZOLE – comprimés, 50 et 100 mg – en guise de traitement prophylactique et pour le traitement :
 - a) des candidoses oropharyngées et oesophagiennes chez les malades immunodéprimés;
 - b) des infections fongiques systémiques autres que la candidose oropharyngée.
- APO-LEVOFLOXACIN – 250 and 500 mg Tablets –
 - (a) Step-down care following hospital separation in patients treated with parenteral antibiotics;
 - (b) Treatment of gram-negative infections resistant to standard therapy;
 - (c) Treatment of infections in persons allergic to alternative agents (eg. penicillins, cephalosporins and sulfonamides);
 - (d) Treatment of bacterial prostatitis;
 - (e) Treatment of respiratory infections in patients failing or likely to fail or intolerant of penicillins, cephalosporins and/or macrolides;
 - (f) Treatment of diabetic foot infections;
- APO-LEVOFLOXACIN – comprimés, 250 et 500 mg –
 - a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital pour les malades auxquels des antibiotiques ont été administrés par voie parentérale;
 - b) traitement des infections Gram négatif résistantes aux médicaments ordinaires;
 - c) traitement des infections chez les personnes allergiques aux agents de relais (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides);
 - d) traitement d'une prostatite bactérienne;
 - e) traitement des infections respiratoires chez les malades qui ne réagissent pas, sont susceptibles de ne pas réagir ou sont intolérants aux pénicillines, aux céphalosporines ou aux macrolides;
 - f) traitement des infections de pied diabétique;

- | | |
|--|--|
| <p>(g) Community acquired pneumonia with co-morbid illness or failure of first-line therapy;</p> <p>(h) Pneumonia in long-term care patients.</p> | <p>g) traitement des pneumonies d'origine communautaire chez les patients ayant une maladie concomitante ou qui ne réagissent pas au traitement de première ligne;</p> <p>h) traitement des pneumonies chez les patients qui reçoivent des soins de longue durée.</p> |
| <p>– APO-METHYLPHENIDATE – 5, 10 and 20 mg Tablets and 20 mg Sustained Release Tablets – For the treatment of attention deficit disorder and narcolepsy.</p> | <p>– APO-METHYLPHENIDATE – comprimés, 5, 10 et 20 mg et comprimés à libération progressive, 20 mg – pour le traitement de la narcolepsie et des déficits de la capacité d'attention.</p> |
| <p>– APO-MINOCYCLINE – 50 and 100 mg Capsules –</p> <p>(a) For treatment of acne unresponsive to tetracycline or erythromycin;</p> <p>(b) For rheumatoid arthritis patients who have failed two other second line agents.</p> | <p>– APO-MINOCYCLINE – capsules, 50 et 100 mg – pour le traitement :</p> <p>a) de l'acné sur laquelle la tétracycline et l'érythromycine n'agissent pas;</p> <p>b) des malades atteints d'arthrite rhumatoïdale qui ont déjà essayé sans succès deux autres médicaments de deuxième intention.</p> |
| <p>– APO-MONTELUKAST – 4, 5 and 10 mg Tablets –</p> <p>(a) Indicated as adjunctive therapy for asthma in cases where:</p> <p>(i) maximum doses of inhaled corticosteroids have not effectively controlled symptoms, or</p> <p>(ii) evidence of serious adverse effects associated with corticosteroids exists, eg. adrenal suppression, increased lung infections;</p> <p>(b) Indicated as first line therapy for exercise induced asthma.</p> | <p>– APO-MONTELUKAST – comprimés, 4, 5 et 10 mg –</p> <p>a) traitement d'appoint pour l'asthme dans les cas suivants :</p> <p>(i) les doses maximales de corticostéroïdes administrées par inhalation n'ont pas contrôlé les symptômes de façon efficace,</p> <p>(ii) des réactions indésirables à l'utilisation de corticostéroïdes sont à craindre, p. ex. suppression surrénale, infection aggravée des poumons;</p> <p>b) thérapie du premier degré pour l'asthme induit par l'exercice.</p> |
| <p>– APO-NARATRIPTAN – 1 and 2.5 mg Tablets – For the treatment of ACUTE migraine attacks in patients where standard therapy has failed – to a maximum of 144 tablets per benefit year.</p> | <p>– APO-NARATRIPTAN – comprimés, 1 et 2,5 mg – pour le traitement des migraines AIGÜES lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas. Maximum de 144 comprimés par année d'indemnisation.</p> |
| <p>– APO-NORFLOX – 400 mg Tablets –</p> <p>(a) For treatment of urinary tract infections caused by Pseudomonas aeruginosa;</p> | <p>– APO-NORFLOX – comprimés, 400 mg –</p> <p>a) pour le traitement des infections des voies urinaires causées par le pseudomonas aeruginosa;</p> |

- (b) For treatment of urinary tract infections not responding to alternative therapy (eg. penicillins, cephalosporins and sulfonamides);
- (c) For treatment of urinary tract infections in persons allergic to alternative agents (eg. penicillins, cephalosporins and sulfonamides);
- (d) For treatment of chronic bacterial prostatitis.
- APO-OFLOXACIN – 0.3% Ophthalmic Solution – For the treatment of ophthalmic infections caused by gram-negative organisms or those not responding to alternative agents.
- APO-PRAMIPEXOLE – 0.25, 0.5, 1 and 1.5 mg Tablets – For the treatment of idiopathic Parkinson's Disease.
- APO-RIZATRIPTAN – 5 and 10 mg Tablets – For the treatment of ACUTE migraine attacks in patients where standard therapy has failed – to a maximum of 144 tablets per benefit year.
- APO-RIZATRIPTAN RPD – 5 AND 10 MG TABLETS – For the treatment of ACUTE migraine attacks in patients where standard therapy has failed – to a maximum of 144 tablets per benefit year.
- APO-SUMATRIPTAN – 50 and 100 mg Tablets – For the treatment of ACUTE migraine attacks in patients where standard therapy has failed – to a maximum of 144 tablets per benefit year.
- APO-TICLOPIDINE – 250 mg Tablets – Apo-Ticlopidine will be re-imbursed for patients:
- (a) For the secondary prevention of vascular ischemic events ie. myocardial infarction, or stroke
- (i) who are known to be or become intolerant to ASA, or
- (ii) who continue to have TIA or stroke symptoms or myocardial infarction while being treated with ASA or clopidogrel.
- b) pour le traitement des infections des voies urinaires sur lesquelles les autres méthodes de thérapie n'agissent pas (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides);
- c) pour le traitement des infections des voies urinaires chez les personnes allergiques aux agents de relais (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides);
- d) pour le traitement d'une prostatite bactérienne chronique.
- APO-OFLOXACIN – solution ophtalmique, 0,3 % – pour le traitement des infections ophtalmiques causées par des germes Gram négatif ou des organismes sur lesquels les agents de relais n'agissent pas.
- APO-PRAMIPEXOLE – comprimés, 0,25, 0,5, 1 et 1,5 mg, – pour le traitement de la maladie de Parkinson idiopathique.
- APO-RIZATRIPTAN – comprimés, 5 et 10 mg – pour le traitement des migraines AIGUËS lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas. Maximum de 144 comprimés par année d'indemnisation.
- APO-RIZATRIPTAN RPD – comprimés, 5 et 10 mg – pour le traitement des migraines AIGUËS lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas. Maximum de 144 comprimés par année d'indemnisation.
- APO-SUMATRIPTAN – comprimés, 50 et 100 mg – pour le traitement des migraines AIGUËS lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas. Maximum de 144 comprimés par année d'indemnisation.
- APO-TICLOPIDINE – comprimés, 250 mg – un remboursement est accordé au malade :
- a) pour la prévention secondaire de pénombres ischémiques vasculaires, c.-à-d., infarctus du myocarde ou accident cérébrovasculaire :
- (i) chez les malades qui sont ou deviennent intolérants à l'AAS,
- (ii) chez les malades qui continuent à avoir des accident ischémique transitoires ou des infarctus du myocarde pendant qu'ils suivent un traitement à l'AAS ou au clopidogrel;

NOTE: ASA should be first line for the secondary prevention of vascular ischemic events such as myocardial infarction or stroke. Before abandoning ASA, efforts should be made to improve tolerability of ASA by reducing the dose, taking it with food and using enteric coated ASA.

(b) Post coronary stent implantation x 28 days in combination with ASA.

- APO-ZOLMITRIPTAN – 2.5 mg Tablets – For the treatment of ACUTE migraine attacks in patients where standard therapy has failed – to a maximum of 144 tablets per benefit year.

- ARTHROTEC – 50 mg/200 mcg and 75 mg/200 mcg Tablets – For patients receiving long-term diclofenac sodium enteric coated tablets who require the addition of misoprostol.

- AURO-CEFPROZIL – 250 and 500 mg Tablets, and 125 mg/5 mL and 250 mg/5 mL Oral Suspension –

(a) Step-down care following hospital separation in patients treated with intravenous cephalosporins;

(b) Treatment of patients with infections not responding to alternative antibiotics (eg. amoxicillin);

(c) Treatment of infections caused by organisms known to be resistant to alternative antibiotics (eg. amoxicillin);

(d) Treatment of patients known to be allergic or unresponsive to alternative antibiotics (eg. penicillin or sulfonamides).

- AURO-CEFUROXIME – 250 and 500 mg Tablets –

(a) Step-down care following hospital separation in patients treated with intravenous cephalosporins;

(b) Treatment of patients with infections not responding to alternative antibiotics (eg. amoxicillin);

NOTA : L'AAS est le médicament du premier degré à administrer pour la prévention secondaire de pénombres ischémiques vasculaires tels qu'un infarctus du myocarde ou un accident cérébrovasculaire. Avant d'abandonner le traitement à l'AAS, il faut s'efforcer d'améliorer la tolérance du malade à l'AAS en réduisant la dose, en le faisant prendre avec de la nourriture et en l'administrant sous forme de comprimé à enrobage entérosoluble.

b) après l'implantation d'un stent coronarien, pendant 28 jours avec de l'AAS.

- APO-ZOLMITRIPTAN – comprimés, 2,5 mg – pour le traitement des migraines AIGUËS lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas. Maximum de 144 comprimés par année d'indemnisation.

- ARTHROTEC – comprimés, 50 mg/200 mcg et 75 mg/200 mcg – pour les malades qui doivent prendre à long terme des comprimés de diclofénac sodique à enrobage entérosoluble et qui ont également besoin de misoprostol.

- AURO-CEFPROZIL – comprimés, 250 et 500 mg et 125 mg/5 ml et 250 mg/5 ml, suspension orale –

a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital chez les malades auxquels de la céphalosporine a été administrée par voie intraveineuse;

b) traitement des malades ayant des infections sur lesquelles les antibiotiques de relais n'agissent pas (p. ex. amoxicilline);

c) traitement des infections causées par des germes résistants aux antibiotiques de relais (p. ex. amoxicilline);

d) traitement des malades qui ne réagissent pas ou qui sont allergiques aux antibiotiques de relais (p. ex. pénicillines et sulfonamides).

- AURO-CEFUROXIME – comprimés, 250 et 500 mg –

a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital chez les malades auxquels de la céphalosporine a été administrée par voie intraveineuse;

b) traitement des malades ayant des infections sur lesquelles les antibiotiques de relais n'agissent pas (p. ex. amoxicilline);

- | | |
|---|--|
| <p>(c) Treatment of infections caused by organisms known to be resistant to alternative antibiotics (eg. amoxicillin);</p> <p>(d) Treatment of patients known to be allergic or unresponsive to alternative antibiotics (eg. penicillin or sulfonamides).</p> <p>– AURO-CIPROFLOXACIN – 250, 500 and 750 mg Tablets –</p> <p>(a) Step-down care following hospital separation in patients treated with parenteral antibiotics;</p> <p>(b) Treatment of pseudomonal infections or resistant gram-negative infections;</p> <p>(c) Treatment of resistant gonococcal infections;</p> <p>(d) Treatment of infections in persons allergic alternative agents (eg. penicillins, cephalosporins and sulfonamides).</p> <p>– AURO-CYCLOBENZAPRINE – 10 mg Tablets – As an adjunct to rest and physical therapy for relief of muscle spasm associated with acute, painful musculoskeletal conditions not responding to alternative therapy. Coverage will be provided for up to 126 tablets per benefit year.</p> <p>– AURO-FINASTERIDE – 5 mg Tablets – For the treatment of symptomatic benign prostatic hyperplasia.</p> <p>– AURO-MONTELUKAST – 10 mg Tablets –</p> <p>(a) Indicated as adjunctive therapy for asthma in cases where:</p> <p style="padding-left: 20px;">(i) maximum doses of inhaled corticosteroids have not effectively controlled symptoms, or</p> <p style="padding-left: 20px;">(ii) evidence of serious adverse effects associated with corticosteroids exists. eg. Adrenal suppression, increased lung infections;</p> <p>(b) Indicated as first line therapy for exercise induced asthma.</p> | <p>c) traitement des infections causées par des germes résistants aux antibiotiques de relais (p. ex. amoxicilline);</p> <p>d) traitement des malades qui ne réagissent pas ou qui sont allergiques aux antibiotiques de relais (p. ex. pénicillines et sulfonamides).</p> <p>– AURO-CIPROFLOXACIN – comprimés, 250, 500 et 750 mg –</p> <p>a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital pour les malades auxquels des antibiotiques ont été administrés par voie parentérale;</p> <p>b) traitement des infections pseudomonales ou des infections Gram négatif résistantes;</p> <p>c) traitement des gonococcies résistantes;</p> <p>d) traitement des infections chez les personnes allergiques aux agents de relais (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides).</p> <p>– AURO-CYCLOBENZAPRINE – comprimés, 10 mg – médicament d'appoint au repos et à la physiothérapie visant à soulager les spasmes musculaires associés à des troubles musculo-squelettiques aigus et douloureux que les autres formes de thérapie ne peuvent soulager. Un maximum de 126 comprimés sont pris en charge par année d'indemnisation.</p> <p>– AURO-FINASTERIDE – comprimés, 5 mg – pour le traitement de l'hyperplasie bénigne symptomatique.</p> <p>– AURO-MONTELUKAST – comprimés, 10 mg –</p> <p>a) traitement d'appoint pour l'asthme dans les cas suivants :</p> <p style="padding-left: 20px;">(i) les doses maximales de corticostéroïdes administrées par inhalation n'ont pas contrôlé les symptômes de façon efficace,</p> <p style="padding-left: 20px;">(ii) des réactions indésirables à l'utilisation de corticostéroïdes sont à craindre, p. ex. suppression surrénale, infection aggravée des poumons;</p> <p>b) thérapie du premier degré pour l'asthme induit par l'exercice.</p> |
|---|--|

- AVELOX – 400 mg Tablets –
 - (a) Step-down care following hospital separation in patients treated with parenteral antibiotics;
 - (b) Treatment of resistant gram-positive or gram-negative infections;
 - (c) Treatment of infections in persons allergic to alternative agents (eg. penicillins, cephalosporins and sulfonamides);
 - (d) Treatment of infections in patients failing or likely to fail or intolerant of penicillins, cephalosporins and/or macrolides.

- AVODART – 0.5 mg capsules – For the treatment of symptomatic benign prostatic hyperplasia.

- AZITHROMYCIN (SANIS) – 250 and 600 mg Tablets – For the treatment of patients:
 - (a) not responding to or intolerant of alternative antibiotics (eg. amoxicillin and erythromycin);
 - (b) with mycobacterial infections due to mycobacterium avium and mycobacterium intracellulare;
 - (c) with sexually transmitted disease due to Chlamydia

- BIAXIN – 125 and 250 mg/5 mL Powder for Suspension and 250 and 500 mg Tablets – For treatment of patients:
 - (a) Not responding to or intolerant of alternative antibiotics (eg. amoxicillin and erythromycin);
 - (b) With mycobacterial infections due to mycobacterium avium and mycobacterium intracellulare;
 - (c) In combination therapy in the treatment of H. pylori;
 - (d) Pneumonia;

- AVELOX – comprimés, 400 mg –
 - a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital pour les malades auxquels des antibiotiques ont été administrés par voie parentérale;
 - b) traitement des infections Gram positif résistantes ou Gram négatif résistantes;
 - c) traitement des infections chez les personnes allergiques aux agents de relais (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides);
 - d) traitement des infections chez les malades qui ne réagissent pas, sont susceptibles de ne pas réagir ou sont intolérants aux pénicillines, aux céphalosporines ou aux macrolides.

- AVODART – capsules, 0,5 mg – pour le traitement de l'hyperplasie bénigne symptomatique.

- AZITHROMYCIN (SANIS) – comprimés, 250 et 600 mg – pour le traitement :
 - a) des malades qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais ou qui ne les tolèrent pas (p. ex. amoxicilline et érythromycine);
 - b) des malades ayant des mycobactérioses provoquées par le mycobacterium avium et le mycobacterium intracellulare;
 - c) des maladies transmises sexuellement causées par la chlamydia.

- BIAXIN – poudre pour suspension, 125 et 250 mg/5 ml et comprimés, 250 et 500 mg –
 - a) traitement des malades qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais (p. ex. amoxicilline et érythromycine);
 - b) traitement des malades ayant des mycobactérioses provoquées par le mycobacterium avium et le mycobacterium intracellulare;
 - c) traitement des ulcères causés par l'hélicobacter pylori chez les malades qui subissent une pharmacothérapie mixte;
 - d) traitement des pneumonies;

- (e) Infections requiring a macrolide (including CAP in patients 65 and older) with documented intolerance to erythromycin.
- BIAXIN XL – 500 mg Sustained Release Tablets – For treatment of patients:
- (a) Not responding to or intolerant of alternative antibiotics (eg. amoxicillin and erythromycin);
- (b) With mycobacterial infections due to mycobacterium avium and mycobacterium intracellular; and
- (c) In combination therapy in the treatment of H. pylori;
- (d) Pneumonia;
- (e) Infections requiring a macrolide (including CAP in patients 65 and older) with documented intolerance to erythromycin.
- CECLOR – 25, 50 and 75 mg/mL Suspension –
- (a) Step-down care following hospital separation in patients treated with intravenous cephalosporins;
- (b) Treatment of patients with infections not responding to alternative antibiotics (eg. amoxicillin);
- (c) Treatment of infections caused by organisms known to be resistant to alternative antibiotics (eg. amoxicillin);
- (d) Treatment of patients known to be allergic or unresponsive to alternative antibiotics (eg. penicillin or sulfonamides).
- CEFTIN – 125 mg/5 ml and 250 mg/5 ml Suspension and 125, 250 and 500 mg Tablets –
- (a) Step-down care following hospital separation in patients treated with intravenous cephalosporins;
- (b) Treatment of patients with infections not responding to alternative antibiotics (eg. amoxicillin);
- e) traitement des infections exigeant des macrolides (y compris les pneumonies d'origine communautaire contractées par des personnes d'au moins 65 ans) chez les patients qui ne tolèrent pas l'érythromycine.
- BIAXIN XL – comprimés à libération progressive, 500 mg – pour le traitement :
- a) des malades qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais ou qui ne les tolèrent pas (p. ex. amoxicilline et érythromycine);
- b) des malades ayant des mycobactérioses provoquées par le mycobacterium avium et le mycobacterium intracellulaire;
- c) des ulcères causés par l'hélicobacter pylori chez les malades qui subissent une pharmacothérapie mixte;
- d) des pneumonies;
- e) des infections exigeant des macrolides (y compris les pneumonies d'origine communautaire contractées par des personnes d'au moins 65 ans) chez les patients qui ne tolèrent pas l'érythromycine.
- CECLOR – suspension, 25, 50 et 75 mg/ml –
- a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital chez les malades auxquels de la céphalosporine a été administrée par voie intraveineuse;
- b) traitement des malades ayant des infections sur lesquelles les antibiotiques de relais n'agissent pas (p. ex. amoxicilline);
- c) traitement des infections causées par des germes résistants aux antibiotiques de relais (p. ex. amoxicilline);
- d) traitement des malades qui ne réagissent pas ou qui sont allergiques aux antibiotiques de relais (p. ex. pénicillines et sulfonamides).
- CEFTIN – suspension, 125/5 ml et 250 mg/5 ml, et comprimés, 125, 250 et 500 mg –
- a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital chez les malades auxquels de la céphalosporine a été administrée par voie intraveineuse;
- b) traitement des malades ayant des infections sur lesquelles les antibiotiques de relais n'agissent pas (p. ex. amoxicilline);

- | | |
|---|---|
| <p>(c) Treatment of infections caused by organisms known to be resistant to alternative antibiotics (eg. amoxicillin);</p> <p>(d) Treatment of patients known to be allergic or unresponsive to alternative antibiotics (eg. penicillin or sulfonamides).</p> <p>– CEFZIL – 250 mg and 500 mg Tablets and 125 mg and 250 mg Suspension –</p> <p>(a) Step-down care following hospital separation in patients treated with intravenous cephalosporins;</p> <p>(b) Treatment of patients with infections not responding to alternative antibiotics (eg. amoxicillin);</p> <p>(c) Treatment of infections caused by organisms known to be resistant to alternative antibiotics (eg. amoxicillin);</p> <p>(d) Treatment of patients known to be allergic or unresponsive to alternative antibiotics (eg. penicillin or sulfonamides).</p> <p>– CILOXAN – 0.3% Ophthalmic Solution and 0.3% Ophthalmic Ointment – For treatment of ophthalmic infections caused by gram-negative organisms or those not responding to alternative agents.</p> <p>– CIPRO – 250, 500 and 750 mg Tablets, and 10 g/100 mL Oral Suspension –</p> <p>(a) Step-down care following hospital separation in patients treated with parenteral antibiotics;</p> <p>(b) Treatment of Pseudomonal infections or resistant gram-negative infections;</p> <p>(c) Treatment of resistant Gonococcal infections;</p> <p>(d) Treatment of infections in persons allergic to alternative agents (eg. penicillins, cephalosporins and sulfonamides);</p> <p>(e) Treatment of infections in immunocompromised patients;</p> <p>(f) Treatment of diabetic foot infections and complications of orthopedic surgery;</p> | <p>c) traitement des infections causées par des germes résistants aux antibiotiques de relais (p. ex. amoxicilline);</p> <p>d) traitement des malades qui ne réagissent pas ou qui sont allergiques aux antibiotiques de relais (p. ex. pénicillines et sulfonamides).</p> <p>– CEFZIL – comprimés, 250 mg et 500 mg, et suspension, 125 mg et 250 mg –</p> <p>a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital chez les malades auxquels de la céphalosporine a été administrée par voie intraveineuse;</p> <p>b) traitement des malades ayant des infections sur lesquelles les antibiotiques de relais n'agissent pas (p. ex. amoxicilline);</p> <p>c) traitement des infections causées par des germes résistants aux antibiotiques de relais (p. ex. amoxicilline);</p> <p>d) traitement des malades qui ne réagissent pas ou qui sont allergiques aux antibiotiques de relais (p. ex. pénicillines et sulfonamides).</p> <p>– CILOXAN – solution ophtalmique, 0,3 % et pommade ophtalmique, 0,3 % – pour le traitement des infections ophtalmiques causées par des germes Gram négatif ou des organismes sur lesquels les agents de relais n'agissent pas.</p> <p>– CIPRO – comprimés, 250, 500 et 750 mg et suspension orale, 10 g/100 ml –</p> <p>a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital pour les malades auxquels des antibiotiques ont été administrés par voie parentérale;</p> <p>b) traitement des infections pseudomonales ou des infections Gram négatif résistantes;</p> <p>c) traitement des gonococcies résistantes;</p> <p>d) traitement des infections chez les personnes allergiques aux agents de relais (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides);</p> <p>e) traitement des infections chez les malades immunodéprimés;</p> <p>f) traitement des infections de pied diabétique et des complications résultant d'une chirurgie orthopédique;</p> |
|---|---|

- | | |
|---|---|
| <p>(g) Treatment of chronic bacterial prostatitis.</p> <p>– CIPROFLOXACIN (SANIS) – 250, 500 and 750 mg Tablets</p> <p>(a) Step-down care following hospital separation in patients treated with parenteral antibiotics;</p> <p>(b) Treatment of pseudomonal infections or resistant gram-negative infections;</p> <p>(c) Treatment of resistant gonococcal infections;</p> <p>(d) Treatment of infections in persons allergic alternative agents (eg. penicillins, cephalosporins and sulfonamides).</p> <p>– CIPROFLOXACIN (SIVEM) – 250 and 500 mg Tablets –</p> <p>(a) Step-down care following hospital separation in patients treated with parenteral antibiotics;</p> <p>(b) Treatment of pseudomonal infections or resistant gram-negative infections;</p> <p>(c) Treatment of resistant gonococcal infections;</p> <p>(d) Treatment of infections in persons allergic alternative agents (eg. penicillins, cephalosporins and sulfonamides).</p> <p>– CIPRO XL – 1000 mg Extended Release Tablets – For treatment of</p> <p>(a) acute uncomplicated pyelonephritis (AUP); and</p> <p>(b) complicated urinary tract infection (UTI).</p> <p>– CLARITHROMYCIN (SANIS) – 125 mg/5 mL and 250 mg/5 mL Oral Suspension – For treatment of patients:</p> <p>(a) not responding to or intolerant of alternative antibiotics (eg. amoxicillin and erythromycin);</p> <p>(b) with mycobacterial infections due to mycobacterium avium and mycobacterium intracellulare;</p> | <p>g) traitement d'une prostatite bactérienne chronique.</p> <p>– C I P R O F L O X A C I N (S A N I S) – comprimés, 250, 500 et 750 mg –</p> <p>a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital pour les malades auxquels des antibiotiques ont été administrés par voie parentérale;</p> <p>b) traitement des infections pseudomonales ou des infections Gram négatif résistantes;</p> <p>c) traitement des gonococcies résistantes;</p> <p>d) traitement des infections chez les personnes allergiques aux agents de relais (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides).</p> <p>– CIPROFLOXACIN (SIVEM) – comprimés, 250 et 500 mg –</p> <p>a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital pour les malades auxquels des antibiotiques ont été administrés par voie parentérale;</p> <p>b) traitement des infections pseudomonales ou des infections Gram négatif résistantes;</p> <p>c) traitement des gonococcies résistantes;</p> <p>d) traitement des infections chez les personnes allergiques aux agents de relais (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides).</p> <p>– CIPRO XL – comprimés à libération prolongée, 1000 mg – pour le traitement</p> <p>a) des pyélonéphrites aiguës non compliquées (PANC);</p> <p>b) des infections des voies urinaires (IVU) compliquées.</p> <p>– CLARITHROMYCIN (SANIS) – 125 mg/5 ml et 250 mg/5 ml, suspension orale – pour le traitement :</p> <p>a) des malades qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais ou qui ne les tolèrent pas (p. ex. amoxicilline et érythromycine);</p> <p>b) des malades ayant des mycobactérioses provoquées par le mycobacterium avium et le mycobacterium intracellulare;</p> |
|---|---|

- (c) in combination therapy in the treatment of *H. pylori*;
- (d) pneumonia;
- (e) infections requiring a macrolide (including CAP in patients 65 and older) with documented intolerance to erythromycin.
- CLAVULIN – 500 mg/125 mg and 875 mg/125 mg Tablets, and 25 and 50 mg/mL, 200 mg/5 mL, 400 mg/5 mL Suspensions –
- (a) For treatment of patients not responding to alternative antibiotics (eg. amoxicillin);
- (b) For treatment of patients with infections caused by organisms known to be resistant to alternative antibiotics (eg. amoxicillin).
- CLIMARA – 3.9 and 7.8 mg/patch – Transdermal System – For patients
- (a) who are smokers (current);
- (b) with increased triglycerides;
- (c) with a history of cholelithiasis; or
- (d) who cannot tolerate oral estrogens due to intolerable side effects (eg. GI upset, irregular bleeding, etc) or who cannot take any medications by mouth. Patients should have tried at least two different oral estrogen products (eg. Premarin, Estrace, Ogen).
- CO AZITHROMYCIN – 250 mg Tablets – For the treatment of patients:
- (a) not responding to or intolerant of alternative antibiotics (eg. amoxicillin and erythromycin);
- (b) with mycobacterial infections due to *Mycobacterium avium* and *Mycobacterium intracellulare*;
- (c) with sexually transmitted disease due to Chlamydia;
- c) des ulcères causés par l'hélicobacter pylori chez les malades qui subissent une pharmacothérapie mixte;
- d) des pneumonies;
- e) des infections exigeant des macrolides (y compris les pneumonies d'origine communautaire contractées par des personnes d'au moins 65 ans) s'ils ne tolèrent pas l'érythromycine.
- CLAVULIN – comprimés, 500 mg/125 mg et 875 mg/125 mg, suspensions, et 25 et 50 mg/ml, 200 mg/5 ml, 400 mg/5 ml –
- a) pour le traitement des malades qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais (p. ex. amoxicilline);
- b) pour le traitement des malades ayant des infections causées par des germes résistants aux antibiotiques de relais (p. ex. amoxicilline).
- CLIMARA – 3,9 et 7,8 mg/patch – timbre transdermique – pour les malades :
- a) qui sont fumeuses;
- b) ayant une augmentation du nombre de triglycérides;
- c) ayant des antécédents de lithiase biliaire;
- d) qui ne peuvent prendre d'œstrogènes administrés oralement en raison d'effets secondaires intolérables (p. ex. : troubles gastro-intestinaux, saignements irréguliers, etc.) ou qui ne peuvent prendre de médicaments par voie orale; les malades devraient avoir essayé de prendre par voie orale au moins deux médicaments œstrogènes différents (p. ex. : Premarin, Estrace ou Ogen).
- CO AZITHROMYCINE – comprimés, 250 mg – pour le traitement :
- a) des malades qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais ou qui ne les tolèrent pas (p. ex. amoxicilline et érythromycine);
- b) des malades ayant des mycobactérioses provoquées par le *Mycobacterium avium* et le *Mycobacterium intracellulare*;
- c) des maladies transmises sexuellement causées par la chlamydia;

- | | |
|--|--|
| <p>(d) Pneumonia;</p> <p>(e) Infections requiring a macrolide (including CAP in patients 65 and older) with documented intolerance to erythromycin.</p> <p>– CO AZITHROMYCIN – 600 mg Tablets – For the treatment of patients with mycobacterial infections due to mycobacterium avium and mycobacterium intracellulare.</p> <p>– CO CIPROFLOXACIN – 250, 500 and 750 mg Tablets</p> <p>(a) Step-down care following hospital separation in patients treated with parenteral antibiotics;</p> <p>(b) Treatment of Pseudomonal infections or resistant gram-negative infections;</p> <p>(c) Treatment of resistant Gonococcal infections;</p> <p>(d) Treatment of infections in persons allergic to alternative agents (eg. penicillins, cephalosporins and sulfonamides);</p> <p>(e) Treatment of infections in immunocompromised patients;</p> <p>(f) Treatment of diabetic foot infections and complications of orthopedic surgery;</p> <p>(g) Treatment of chronic bacterial prostatitis.</p> <p>– CO DICLO-MISO – 50 mg/200 mcg and 75 mg/200 mcg Tablets – For patients receiving long-term diclofenac sodium enteric coated tablets who require the addition of misoprostol.</p> <p>– CO FENTANYL – 12, 25, 50, 75 and 100 mcg Patches – for the treatment of pain in patients unable to tolerate analgesics or when there is failure to adequately control pain with oral analgesics, or in patients for whom oral analgesics are deemed inappropriate.</p> | <p>d) des pneumonies;</p> <p>e) des infections exigeant des macrolides (y compris les pneumonies d'origine communautaire contractées par des personnes d'au moins 65 ans) chez les patients qui ne tolèrent pas l'érythromycine.</p> <p>– CO AZITHROMYCINE – comprimés, 600 mg – pour le traitement des malades ayant des mycobactérioses provoquées par le mycobacterium avium et le mycobacterium intracellulare.</p> <p>– CO CIPROFLOXACIN – comprimés, 250, 500 et 750 mg –</p> <p>a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital pour les malades auxquels des antibiotiques ont été administrés par voie parentérale;</p> <p>b) traitement des infections pseudomonales ou des infections Gram négatif résistantes;</p> <p>c) traitement des gonococcies résistantes;</p> <p>d) traitement des infections chez les personnes allergiques aux agents de relais (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides);</p> <p>e) traitement des infections chez les malades immunodéprimés;</p> <p>f) traitement des infections de pied diabétique et des complications résultant d'une chirurgie orthopédique;</p> <p>g) traitement d'une prostatite bactérienne chronique.</p> <p>– CO DICLO-MISO – comprimés, 50 mg/200 mcg et 75 mg/200 mcg – pour les malades qui doivent prendre à long terme des comprimés de diclofénac sodique à enrobage entérosoluble et qui ont également besoin de misoprostol.</p> <p>– CO FENTANYL – timbres, 12, 25, 50, 75 et 100 mcg – pour le traitement de la douleur chez les malades qui ne peuvent supporter les analgésiques administrés par voie orale ou pour lesquels ils ne sont pas recommandés ou lorsque ces derniers ne peuvent réduire suffisamment la douleur.</p> |
|--|--|

- CO FINASTERIDE – 5 mg Tablets – For the treatment of symptomatic benign prostatic hyperplasia.
- CO FLUCONAZOLE – 50 and 100 mg Tablets – For the prophylaxis and treatment of:
 - (a) oropharyngeal and esophageal candidiasis in immunocompromised patients; and
 - (b) systemic fungal infections other than oropharyngeal candidiasis.
- CO LEVOFLOXACIN – 250 and 500 mg Tablets –
 - (a) Step-down care following hospital separation in patients treated with parenteral antibiotics;
 - (b) Treatment of gram-negative infections resistant to standard therapy;
 - (c) Treatment of infections in persons allergic to alternative agents (eg. penicillins, cephalosporins and sulfonamides);
 - (d) Treatment of bacterial prostatitis;
 - (e) Treatment of respiratory infections in patients failing or likely to fail or intolerant of penicillins, cephalosporins and/or macrolides;
 - (f) Treatment of diabetic foot infections;
 - (g) Community acquired pneumonia with co-morbid illness or failure of first-line therapy;
 - (h) Pneumonia in long-term care patients.
- CO NORFLOXACIN – 400 mg Tablets – For the treatment of:
 - (a) urinary tract infections caused by *Pseudomonas aeruginosa*;
- CO FINASTERIDE – comprimés, 5 mg – pour le traitement de l'hyperplasie bénigne symptomatique.
- CO FLUCONAZOLE – comprimés, 50 et 100 mg – en guise de traitement prophylactique et pour le traitement :
 - a) des candidoses oropharyngées et oesophagiennes chez les malades immunodéprimés;
 - b) des infections fongiques systémiques autres que la candidose oropharyngée.
- CO LEVOFLOXACIN – comprimés, 250 et 500 mg –
 - a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital pour les malades auxquels des antibiotiques ont été administrés par voie parentérale;
 - b) traitement des infections Gram négatif résistantes aux médicaments ordinaires;
 - c) traitement des infections chez les personnes allergiques aux agents de relais (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides);
 - d) traitement d'une prostatite bactérienne;
 - e) traitement des infections respiratoires chez les malades qui ne réagissent pas, sont susceptibles de ne pas réagir ou sont intolérants aux pénicillines, aux céphalosporines ou aux macrolides;
 - f) traitement des infections de pied diabétique;
 - g) traitement des pneumonies d'origine communautaire chez les patients ayant une maladie concomitante ou qui ne réagissent pas au traitement de première ligne;
 - h) traitement des pneumonies chez les patients qui reçoivent des soins de longue durée.
- CO NORFLOXACIN – comprimés, 400 mg – pour le traitement :
 - a) des infections des voies urinaires causées par le *pseudomonas aeruginosa*;

- | | |
|--|--|
| <p>(b) urinary tract infections not responding to alternative therapy (eg. penicillins, cephalosporins and sulfonamides);</p> <p>(c) urinary tract infections in persons allergic to alternative agents (eg. penicillins, cephalosporins and sulfonamides);</p> <p>(d) chronic bacterial prostatitis.</p> | <p>b) des infections des voies urinaires sur lesquelles les autres méthodes de thérapie n'agissent pas (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides);</p> <p>c) des infections des voies urinaires chez les personnes allergiques aux agents de relais (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides);</p> <p>d) d'une prostatite bactérienne chronique.</p> |
| <p>- CO PRAMIPEXOLE – 0.25, 0.5, 1 and 1.5 mg Tablets – For the treatment of idiopathic Parkinson's Disease.</p> <p>- CO RIZATRIPTAN – 10 mg Tablets – for the treatment of ACUTE migraine attacks in patients where standard therapy has failed – to a maximum of 144 tablets per benefit year.</p> <p>- CO RIZATRIPTAN ODT – 5 and 10 mg Tablets – For the treatment of ACUTE migraine attacks in patients where standard therapy has failed.</p> <p>- CO SUMATRIPTAN – 50 and 100 mg Tablets – For the treatment of ACUTE migraine attacks in patients where standard therapy has failed – to a maximum of 144 tablets per benefit year.</p> <p>- CYCLOBENZAPRINE (SANIS) – 10 mg Tablets – As an adjunct to rest and physical therapy for relief of muscle spasm associated with acute, painful musculoskeletal conditions not responding to alternative therapy. Coverage will be provided for up to 126 tablets per benefit year.</p> <p>- DALACIN – 2% Vaginal Cream – For treatment of bacterial vaginosis for patients who fail oral metronidazole or are intolerant to oral metronidazole or are pregnant.</p> <p>- DDAVP – 0.1 and 0.2 mg Tablets, 10 mcg/Spray Nasal Solution and 100 mcg/mL Nasal Solution with Rhinyle tube – For treatment of</p> | <p>- CO PRAMIPEXOLE – comprimés, 0,25, 0,5, 1 et 1,5 mg – pour le traitement de la maladie de Parkinson idiopathique.</p> <p>- CO RIZATRIPTAN – comprimés, 10 mg – pour le traitement des migraines AIGÜES lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas. Maximum de 144 comprimés par année d'indemnisation.</p> <p>- CO-RIZATRIPTAN ODT – comprimés, 5 et 10 mg – pour le traitement des migraines AIGÜES lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas.</p> <p>- CO SUMATRIPTAN – comprimés, 50 et 100 mg – pour le traitement des migraines AIGÜES lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas. Maximum de 144 comprimés par année d'indemnisation.</p> <p>- CYCLOBENZAPRINE (SANIS) – comprimés, 10 mg – médicament d'appoint au repos et à la physiothérapie visant à soulager les spasmes musculaires associés à des troubles musculo-squelettiques aigus et douloureux que les autres formes de thérapie ne peuvent soulager. Un maximum de 126 comprimés sont pris en charge par année d'indemnisation.</p> <p>- DALACIN – crème vaginale, 2 % – pour le traitement de vaginoses bactériennes chez les malades qui ne réagissent pas au métronidazole oral ou qui ne tolèrent pas le métronidazole oral ou qui sont enceintes.</p> <p>- DDAVP – comprimés, 0,1 et 0,2 mg, solution pour vaporisateur nasal, 10 mcg, et solution nasale avec tube rhinyle, 100 mcg/ml – pour le traitement :</p> |
| <p>(a) diabetes insipidus; and</p> <p>(b) enuresis in children refractory to alternative agents.</p> | <p>a) du diabète insipide;</p> <p>b) de l'énurésie chez les enfants qui sont réfractaires aux autres agents de traitement.</p> |

- DESMOPRESSIN (AA PHARMA) – 10 mcg Spray – For the treatment of
 - (a) diabetes insipidus; and
 - (b) enuresis in children refractory to alternate agents.
- DEXEDRINE – 5 mg, 10 mg and 15 mg Tablets and Spansules – For treatment of attention deficit disorder and narcolepsy.
- DIFLUCAN – 250 ml P.O.S. – For the prophylaxis and treatment of
 - (a) oropharyngeal and esophageal candidiasis in immunocompromised patients; and
 - (b) systemic fungal infections other than oropharyngeal candidiasis.
- DOM-CYCLOBENZAPRINE – 10 mg Tablets – As an adjunct to rest and physical therapy for relief of muscle spasm associated with acute, painful musculoskeletal conditions not responding to alternative therapy. Coverage will be provided for up to 126 tablets per benefit year.
- DOVONEX – 50 mcg/g Ointment and Cream and 50 mcg/mL Scalp Solution – When prescribed where standard therapy has failed.
- DURAGESIC MAT – 25, 50, 75 and 100 mcg Patches – For the treatment of pain in patients unable to tolerate analgesics or when there is failure to adequately control pain with oral analgesics or in patients for whom oral analgesics are deemed inappropriate.
- ESTALIS – 140/50 and 250/50 mcg Transdermal Patch – For patients
 - (a) who are smokers (current);
 - (b) with increased triglycerides;
 - (c) with a history of cholelithiasis; or
- DESMOPRESSIN (AA PHARMA) – vaporisateur, 10 mcg – pour le traitement :
 - a) du diabète insipide;
 - b) de l'énurésie chez les enfants qui sont réfractaires aux autres agents de traitement.
- DEXEDRINE – comprimés et spansules, 5 mg, 10 mg et 15 mg – pour le traitement de la narcolepsie et des déficits de la capacité d'attention.
- DIFLUCAN – 250 ml P.O.S. – en guise de traitement prophylactique et pour le traitement
 - a) des candidoses oropharyngées et oesophagiennes chez les malades immunodéprimés;
 - b) des infections fongiques systémiques autres que la candidose oropharyngée.
- DOM-CYCLOBENZAPRINE – comprimés, 10 mg – médicament d'appoint au repos et à la physiothérapie visant à soulager les spasmes musculaires associés à des troubles musculo-squelettiques aigus et douloureux que les autres formes de thérapie ne peuvent soulager. Un maximum de 126 comprimés sont pris en charge par année d'indemnisation.
- DOVONEX – pommade et crème, 50 mcg/g, et solution capillaire, 50 mcg/ml – s'il est prescrit lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas.
- DURAGESIC MAT – timbres, 25, 50, 75 et 100 mcg – pour le traitement de la douleur chez les malades qui ne peuvent supporter les analgésiques ou pour lesquels les analgésiques par voie orale ne sont pas recommandés ou lorsque ces derniers ne peuvent réduire suffisamment la douleur.
- ESTALIS – 140/50 et 250/50 mcg, timbre transdermique – pour les malades :
 - a) qui sont fumeuses;
 - b) ayant une augmentation du nombre de triglycérides;
 - c) ayant des antécédents de lithiase biliaire;

- (d) who cannot tolerate oral estrogens due to intolerable side effects (eg. GI upset, irregular bleeding, etc) or who cannot take any medications by mouth. Patients should have tried at least two different oral estrogen products (eg. Premarin, Estrace, Ogen).
- ESTRACOMB – Topical Patch – For patients
- (a) who are smokers (current);
- (b) with increased triglycerides;
- (c) with a history of cholelithiasis; or
- (d) who cannot tolerate oral estrogens due to intolerable side effects (eg. GI upset, irregular bleeding, etc) or who cannot take any medications by mouth. Patients should have tried at least two different oral estrogen products (eg. Premarin, Estrace, Ogen).
- ESTRADERM – 50 and 100 mcg Topical Patch – For patients
- (a) who are smokers (current);
- (b) with increased triglycerides;
- (c) with a history of cholelithiasis; or
- (d) who cannot tolerate oral estrogens due to intolerable side effects (eg. GI upset, irregular bleeding, etc) or who cannot take any medications by mouth. Patients should have tried at least two different oral estrogen products (eg. Premarin, Estrace, Ogen).
- ESTRADOT – 25, 37.5, 50, 75, 100 mcg Transdermal Patch – For patients:
- (a) who are smokers (current);
- (b) with increased triglycerides; and
- d) qui ne peuvent prendre d'œstrogènes administrés oralement en raison d'effets secondaires intolérables (p. ex. : troubles gastro-intestinaux, saignements irréguliers, etc.) ou qui ne peuvent prendre de médicaments par voie orale; les malades devraient avoir essayé de prendre par voie orale au moins deux médicaments œstrogènes différents (p. ex. : Premarin, Estrace ou Ogen).
- ESTRACOMB – patch – pour les malades :
- a) qui sont fumeuses;
- b) ayant une augmentation du nombre de triglycérides;
- c) ayant des antécédents de lithiase biliaire;
- d) qui ne peuvent prendre d'œstrogènes administrés oralement en raison d'effets secondaires intolérables (p. ex. : troubles gastro-intestinaux, saignements irréguliers, etc.) ou qui ne peuvent prendre de médicaments par voie orale; les malades devraient avoir essayé de prendre par voie orale au moins deux médicaments œstrogènes différents (p. ex. : Premarin, Estrace ou Ogen).
- ESTRADERM – patch, 50 et 100 mcg – pour les malades :
- a) qui sont fumeuses;
- b) ayant une augmentation du nombre de triglycérides;
- c) ayant des antécédents de lithiase biliaire;
- d) qui ne peuvent prendre d'œstrogènes administrés oralement en raison d'effets secondaires intolérables (p. ex. : troubles gastro-intestinaux, saignements irréguliers, etc.) ou qui ne peuvent prendre de médicaments par voie orale; les malades devraient avoir essayé de prendre par voie orale au moins deux médicaments œstrogènes différents (p. ex. : Premarin, Estrace ou Ogen).
- ESTRADOT – timbre transdermique, 25, 37,5, 50, 75 et 100 mcg – pour les malades :
- a) qui sont fumeuses;
- b) ayant une augmentation du nombre de triglycérides;

- (c) with a history of cholelithiasis; or who cannot tolerate oral estrogens due to intolerable side effects (eg. GI upset, irregular bleeding, etc.) or who cannot take any medications by mouth. Patients should have tried at least two different oral estrogen products (eg. Premarin, Estrace, Ogen).
- ESTROGEL – 0.06% Transdermal Gel – For patients
- (a) who are smokers (current);
- (b) with increased triglycerides;
- (c) with a history of cholelithiasis; or
- (d) who cannot tolerate oral estrogens due to intolerable side effects (eg. GI upset, irregular bleeding, etc) or who cannot take any medications by mouth. Patients should have tried at least two different oral estrogen products (eg. Premarin, Estrace, Ogen).
- FINASTERIDE (ACCORD) – 5 mg Tablets – For the treatment of symptomatic benign prostatic hyperplasia.
- FLUNARIZINE (AA PHARMA) – 5 mg Capsules – For prophylaxis of migraines in cases where alternative prophylactic agents have not been effective.
- GD-AZITHROMYCIN – 100 mg/5 mL and 200 mg/5 mL Oral Suspension – For treatment of patients:
- (a) not responding to or intolerant of alternative antibiotics (eg. amoxicillin and erythromycin);
- (b) with mycobacterial infections due to mycobacterium avium and mycobacterium intracellulare;
- (c) in combination therapy in the treatment of H. pylori;
- (d) pneumonia;
- c) ayant des antécédents de lithiase biliaire ou qui ne peuvent prendre d'œstrogènes administrés oralement en raison d'effets secondaires intolérables (p. ex. : troubles gastro-intestinaux, saignements irréguliers, etc.) ou qui ne peuvent prendre de médicaments par voie orale; les malades devraient avoir essayé de prendre par voie orale au moins deux médicaments œstrogènes différents (p. ex. : Premarin, Estrace ou Ogen).
- ESTROGEL – gel transdermique, 0.06 % – pour les malades :
- a) qui sont fumeuses;
- b) ayant une augmentation du nombre de triglycérides;
- c) ayant des antécédents de lithiase biliaire;
- d) qui ne peuvent prendre d'œstrogènes administrés oralement en raison d'effets secondaires intolérables (p. ex. : troubles gastro-intestinaux, saignements irréguliers, etc.) ou qui ne peuvent prendre de médicaments par voie orale; les malades devraient avoir essayé de prendre par voie orale au moins deux médicaments œstrogènes différents (p. ex. : Premarin, Estrace ou Ogen).
- FINASTERIDE (ACCORD) – comprimés, 5 mg – pour le traitement de l'hyperplasie bénigne symptomatique.
- FLUNARIZINE (AA PHARMA) – capsules, 5 mg – pour la prophylaxie des migraines lorsque les agents prophylactiques de relais n'ont pas été efficaces.
- GD-AZITHROMYCIN – 100 mg/5 ml et 200 mg/5 ml, suspension orale – pour le traitement :
- a) des malades qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais ou qui ne les tolèrent pas (p. ex. amoxicilline et érythromycine);
- b) des malades ayant des mycobactérioses provoquées par le mycobacterium avium et le mycobacterium intracellulare;
- c) des ulcères causés par l'hélicobacter pylori chez les malades qui subissent une pharmacothérapie mixte;
- d) des pneumonies;

- | | |
|---|--|
| <p>(e) infections requiring a macrolide (including CAP in patients 65 and older) with documented intolerance to erythromycin.</p> | <p>e) des infections exigeant des macrolides (y compris les pneumonies d'origine communautaire contractées par des personnes d'au moins 65 ans) chez les patients qui ne tolèrent pas l'érythromycine.</p> |
| <p>– GD-AZITHROMYCIN – 250 mg Tablets – For the treatment of patients:</p> | <p>– GD-AZITHROMYCIN – comprimés, 250 mg – pour le traitement :</p> |
| <p>(a) not responding to or intolerant of alternative antibiotics (eg. amoxicillin and erythromycin);</p> | <p>a) des malades qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais ou qui ne les tolèrent pas (p. ex. amoxicilline et érythromycine);</p> |
| <p>(b) with mycobacterial infections due to mycobacterium avium and mycobacterium intracellulare;</p> | <p>b) des malades ayant des mycobactérioses provoquées par le mycobacterium avium et le mycobacterium intracellulare;</p> |
| <p>(c) with sexually transmitted disease due to Chlamydia.</p> | <p>c) des maladies transmises sexuellement causées par la chlamydia.</p> |
| <p>– HUMATROPE – 5 mg/vial Injection, 6.0, 12.0 and 24 mg/cartridge Injection –</p> | <p>– HUMATROPE – fiole de préparation injectable, 5 mg, et cartouche de préparation injectable, 6,0, 12,0 et 24 mg –</p> |
| <p>(a) For the long term management of children who have growth failure due to an inadequate secretion of normal endogenous growth hormone;</p> | <p>a) pour le traitement à long terme des enfants ayant des troubles de croissance causés par une sécrétion insuffisante de l'hormone de croissance endogène normale;</p> |
| <p>(b) For treatment of children who have growth failure associated with chronic renal failure insufficiency up to the time of renal transplant;</p> | <p>b) pour le traitement des enfants ayant des troubles de croissance liés à une insuffisance rénale chronique jusqu'au moment de la transplantation rénale;</p> |
| <p>(c) For treatment of short stature associated with Turner Syndrome in patients whose epiphyses are not closed.</p> | <p>c) pour le traitement d'une insuffisance staturale liée au syndrome de Turner chez les malades dont les épiphyses ne sont pas fermées.</p> |
| <p>– IMITREX – 5 mg, 10 mg and 20 mg Nasal Spray – For treatment of ACUTE migraine attacks in patients where standard therapy has failed – to a maximum of 144 sprays per benefit year.</p> | <p>– IMITREX – vaporisateur nasal, 5 mg, 10 mg et 20 mg – pour le traitement des migraines AIGUËS lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas. Maximum de 144 vaporisateurs par année d'indemnisation.</p> |
| <p>– IMITREX DF – 50 and 100 mg Tablets – For treatment of ACUTE migraine attacks in patients where standard therapy has failed – to a maximum of 144 tablets per benefit year.</p> | <p>– IMITREX DF – comprimés, 50 et 100 mg – pour le traitement des migraines AIGUËS lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas. Maximum de 144 comprimés par année d'indemnisation.</p> |
| <p>– JAMP-CIPROFLOXACIN – 250, 500 and 750 mg Tablets –</p> | <p>– JAMP-CIPROFLOXACIN – comprimés, 250, 500 et 750 mg –</p> |
| <p>(a) Step-down care following hospital separation in patients treated with parenteral antibiotics;</p> | <p>a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital pour les malades auxquels des antibiotiques ont été administrés par voie parentérale;</p> |

- | | |
|--|---|
| <p>(b) Treatment of Pseudomonal infections or resistant gram-negative infections;</p> <p>(c) Treatment of Gonococcal infections;</p> <p>(d) Treatment of infections in persons allergic to alternative agents (eg. penicillins, cephalosporins and sulphonamides);</p> <p>(e) Treatment of infections in immunocompromised patients;</p> <p>(f) Treatment of diabetic foot infections and complications of orthopaedic surgery; or</p> <p>(g) Treatment of chronic bacterial prostatitis.</p> | <p>b) traitement des infections pseudomonales ou des infections Gram négatif résistantes;</p> <p>c) traitement des gonococcies résistantes;</p> <p>d) traitement des infections chez les personnes allergiques aux agents de relais (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides);</p> <p>e) traitement des infections chez les malades immunodéprimés;</p> <p>f) traitement des infections de pied diabétique et des complications résultant d'une chirurgie orthopédique;</p> <p>g) traitement d'une prostatite bactérienne chronique.</p> |
| <p>– JAMP-CYCLOBENZAPRINE – 10 mg Tablets – As an adjunct to rest and physical therapy for relief of muscle spasm associated with acute, painful musculoskeletal conditions not responding to alternative therapy. Coverage will be provided for up to 126 tablets per benefit year.</p> | <p>– JAMP-CYCLOBENZAPRINE – comprimés, 10 mg – médicament d'appoint au repos et à la physiothérapie visant à soulager les spasmes musculaires associés à des troubles musculo-squelettiques aigus et douloureux que les autres formes de thérapie ne peuvent soulager. Un maximum de 126 comprimés sont pris en charge par année d'indemnisation.</p> |
| <p>– JAMP-FINASTERIDE – 5 mg Tablets – For the treatment of symptomatic benign prostatic hyperplasia.</p> | <p>– JAMP-FINASTERIDE – comprimés, 5 mg – pour le traitement de l'hyperplasie bénigne symptomatique.</p> |
| <p>– JAMP-MONTELUKAST – 10 mg Tablets –</p> <p>(a) Indicated as adjunctive therapy for asthma in cases where:</p> <p style="padding-left: 20px;">(i) maximum doses of inhaled corticosteroids have not effectively controlled symptoms, or</p> <p style="padding-left: 20px;">(ii) evidence of serious adverse effects associated with corticosteroids exists, eg. adrenal suppression, increased lung infections;</p> <p>(b) Indicated as first line therapy for exercise induced asthma.</p> | <p>– JAMP-MONTELUKAST – comprimés, 10 mg –</p> <p>a) traitement d'appoint pour l'asthme dans les cas suivants :</p> <p style="padding-left: 20px;">(i) les doses maximales de corticostéroïdes administrées par inhalation n'ont pas contrôlé les symptômes de façon efficace,</p> <p style="padding-left: 20px;">(ii) des réactions indésirables à l'utilisation de corticostéroïdes sont à craindre, p. ex. suppression surrénale, infection aggravée des poumons;</p> <p>b) thérapie du premier degré pour l'asthme induit par l'exercice.</p> |
| <p>– JAMP-RIZATRIPTAN – 5 and 10 mg Tablets – For the treatment of ACUTE migraine attacks in patients where standard therapy has failed – to a maximum of 144 tablets per benefit year.</p> | <p>– JAMP-RIZATRIPTAN – comprimés, 5 et 10 mg – pour le traitement des migraines AIGÜES lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas. Maximum de 144 comprimés par année d'indemnisation.</p> |

- JAMP-VANCOMYCIN – 125 AND 250 mg Capsules – For treatment of pseudomembranous colitis unresponsive to metronidazole.
- LEVAQUIN – 250 and 500 mg Tablets and 5 and 25 mg/mL Injection –
 - (a) Step-down care following hospital separation in patients treated with parenteral antibiotics;
 - (b) Treatment of gram-negative infections resistant to standard therapy;
 - (c) Treatment of infections in persons allergic to alternative agents (eg. penicillins, cephalosporins and sulfonamides);
 - (d) Treatment of bacterial prostatitis;
 - (e) Treatment of respiratory infections in patients failing or likely to fail or intolerant of penicillins, cephalosporins and/or macrolides;
 - (f) Treatment of diabetic foot infections;
 - (g) Community acquired pneumonia with co-morbid illness or failure of first-line therapy;
 - (h) Pneumonia in long-term care patients.
- LUPRON – 5 mg Subcutaneous Injection and LUPRON DEPOT – 3.75, 7.5, 11.25, 22.5 and 30 mg/vial Intramuscular Injection – For the treatment of:
 - (a) gynecological disorders excepting fertility disorders;
 - (b) for the treatment of children with precocious puberty.
- MACROBID – 100 mg (Nitrofurantoin Macrocrystals) Capsules – For patients not tolerating Microcrystalline Nitrofurantoin
- MACRODANTIN – 25 mg (Nitrofurantoin Macrocrystals) Capsules – For patients not tolerating Microcrystalline Nitrofurantoin
- JAMP-VANCOMYCIN – capsules, 125 et 250 mg – pour le traitement d'une colite pseudo-membraneuse sur laquelle le métronidazole n'agit pas.
- LEVAQUIN – comprimés, 250 et 500 mg et injection, 5 et 25 mg/ml –
 - a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital pour les malades auxquels des antibiotiques ont été administrés par voie parentérale;
 - b) traitement des infections Gram négatif résistantes aux médicaments ordinaires;
 - c) traitement des infections chez les personnes allergiques aux agents de relais (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides);
 - d) traitement d'une prostatite bactérienne;
 - e) traitement des infections respiratoires chez les malades qui ne réagissent pas, sont susceptibles de ne pas réagir ou sont intolérants aux pénicillines, aux céphalosporines ou aux macrolides;
 - f) traitement des infections de pied diabétique;
 - g) traitement des pneumonies d'origine communautaire chez les patients ayant une maladie concomitante ou qui ne réagissent pas au traitement de première ligne;
 - h) traitement des pneumonies chez les patients qui reçoivent des soins de longue durée.
- LUPRON – injection sous-cutanée, 5 mg et LUPRON DEPOT – injection intramusculaire, 3,75, 7,5, 11,25, 22,5 et 30 mg/ampoule – pour le traitement :
 - a) des affections gynécologiques, à l'exception des troubles de fécondité;
 - b) de la puberté précoce.
- MACROBID – capsules, 100 mg, (macrocristaux de Nitrofurantoïne) – pour les personnes qui ne tolèrent pas la Nitrofurantoïne microcristalline.
- MACRODANTIN – capsules, 25 mg, (macrocristaux de Nitrofurantoïne) – pour les personnes qui ne tolèrent pas la Nitrofurantoïne microcristalline.

- MAR-CIPROFLOXACIN – 250, 500 and 750 mg Tablets –
 - (a) Step-down care following hospital separation in patients treated with parenteral antibiotics;
 - (b) Treatment of pseudomonal infections or resistant gram-negative infections;
 - (c) Treatment of resistant gonococcal infections;
 - (d) Treatment of infections in persons allergic to alternative agents (eg. penicillins, cephalosporins and sulfonamides).

- MAR-MONTELUKAST – 4, 5 and 10 mg Tablets –
 - (a) Indicated as adjunctive therapy for asthma in cases where:
 - (i) maximum doses of inhaled corticosteroids have not effectively controlled symptoms, or
 - (ii) evidence of serious adverse effects associated with corticosteroids exists. eg. adrenal suppression, increased lung infections;
 - (b) Indicated as first line therapy for exercise induced asthma.

- MAXALT RPD and MAXALT – 5 and 10 mg Wafers, 5 mg and 10 mg Tablets – For treatment of ACUTE migraine attacks in patients where standard therapy has failed – to a maximum of 144 wafers or tablets per benefit year.

- MINOCYCLINE (SANIS) – 50 and 100 mg Tablets –
 - (a) for treatment of acne unresponsive to tetracycline or erythromycin;
 - (b) for rheumatoid arthritis patients who have failed two other second line agents.

- MAR-CIPROFLOXACIN – comprimés, 250, 500 et 750 mg –
 - a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital pour les malades auxquels des antibiotiques ont été administrés par voie parentérale;
 - b) traitement des infections pseudomonales ou des infections Gram négatif résistantes;
 - c) traitement des gonococcies résistantes;
 - d) traitement des infections chez les personnes allergiques aux agents de relais (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides).

- MAR-MONTELUKAST – comprimés, 4, 5 et 10 mg –
 - a) traitement d'appoint pour l'asthme dans les cas suivants :
 - (i) les doses maximales de corticostéroïdes administrées par inhalation n'ont pas contrôlé les symptômes de façon efficace,
 - (ii) des réactions indésirables à l'utilisation de corticostéroïdes sont à craindre, p. ex. suppression surrénale, infection aggravée des poumons;
 - b) thérapie du premier degré pour l'asthme induit par l'exercice.

- MAXALT RPD et MAXALT – cachets, 5 et 10 mg, comprimés, 10 et 20 mg – pour le traitement des migraines AIGUËS lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas. Maximum de 144 cachets ou comprimés par année d'indemnisation.

- MINOCYCLINE (SANIS) – comprimés, 50 et 100 mg – pour le traitement :
 - a) de l'acné sur laquelle la tétracycline et l'érythromycine n'agissent pas;
 - b) des malades atteints d'arthrite rhumatismale qui ont déjà essayé sans succès deux autres médicaments de deuxième intention.

- | | |
|---|---|
| <p>- MINT-CIPROFLOXACIN – 250, 500 and 750 mg Tablets –</p> <p>(a) step down care following hospital separation in patients treated with parenteral antibiotics;</p> <p>(b) treatment of Pseudomonal infections or resistant gram-negative infections;</p> <p>(c) treatment of resistant Gonococcal infections;</p> <p>(d) treatment of infections in persons allergic to alternative agents (eg. penicillins, cephalosporins and sulfonamides);</p> <p>(e) treatment of infections in immunocompromised patients;</p> <p>(f) treatment of diabetic foot infections and complications of orthopedic surgery;</p> <p>(g) treatment of chronic bacterial prostatitis.</p> | <p>- MINT-CIPROFLOXACINE – comprimés, 250, 500 et 750 mg –</p> <p>a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital pour les malades auxquels des antibiotiques ont été administrés par voie parentérale;</p> <p>b) traitement des infections pseudomonales ou des infections Gram négatif résistantes;</p> <p>c) traitement des gonococcies résistantes;</p> <p>d) traitement des infections chez les personnes allergiques aux agents de relais (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides);</p> <p>e) traitement des infections chez les malades immunodéprimés;</p> <p>f) traitement des infections de pied diabétique et des complications résultant d'une chirurgie orthopédique;</p> <p>g) traitement d'une prostatite bactérienne chronique.</p> |
| <p>- MINT-FINASTERIDE – 5 MG TABLETS – For the treatment of symptomatic benign prostatic hyperplasia.</p> | <p>- MINT-FINASTERIDE – comprimés, 5 mg – pour le traitement de l'hyperplasie bénigne symptomatique.</p> |
| <p>- MINT-MONTELUKAST – 4, 5 and 10 mg Tablets –</p> <p>(a) Indicated as adjunctive therapy for asthma in cases where:</p> <p style="padding-left: 20px;">(i) maximum doses of inhaled corticosteroids have not effectively controlled symptoms, or</p> <p style="padding-left: 20px;">(ii) evidence of serious adverse effects associated with corticosteroids exists. Eg. Adrenal suppression, increased lung infections;</p> <p>(b) Indicated as first line therapy for exercise induced asthma.</p> | <p>- MINT-MONTELUKAST – comprimés, 4, 5 et 10 mg –</p> <p>a) traitement d'appoint pour l'asthme dans les cas suivants :</p> <p style="padding-left: 20px;">(i) les doses maximales de corticostéroïdes administrées par inhalation n'ont pas contrôlé les symptômes de façon efficace,</p> <p style="padding-left: 20px;">(ii) des réactions indésirables à l'utilisation de corticostéroïdes sont à craindre, p. ex. suppression surrénale, infection aggravée des poumons;</p> <p>b) thérapie du premier degré pour l'asthme induit par l'exercice.</p> |
| <p>- MIRAPEX – 0.25, 0.5, 1 AND 1.5 MG TABLETS – For treatment of idiopathic Parkinson's Disease.</p> | <p>- MIRAPEX – 0,25, 0,5, 1 ET 1,5 MG, COMPRIMÉS – pour le traitement de la maladie de Parkinson idiopathique.</p> |

- MONTELUKAST (SANIS) – 4, 5 and 10 mg Tablets –

(a) Indicated as adjunctive therapy for asthma in cases where:

(i) maximum doses of inhaled corticosteroids have not effectively controlled symptoms, or

(ii) evidence of serious adverse effects associated with corticosteroids exists. eg. adrenal suppression, increased lung infections;

(b) Indicated as first line therapy for exercise induced asthma.

- MONTELUKAST (SIVEM) – 4 and 5 mg Tablets –

(a) Indicated as adjunctive therapy for asthma in cases where:

(i) maximum doses of inhaled corticosteroids have not effectively controlled symptoms, or

(ii) evidence of serious adverse effects associated with corticosteroids exists. Eg. Adrenal suppression, increased lung infections;

(b) Indicated as first line therapy for exercise induced asthma.

- MONTELUKAST (SIVEM) – 10 mg Tablets –

(a) Indicated as adjunctive therapy for asthma in cases where:

(i) maximum doses of inhaled corticosteroids have not effectively controlled symptoms, or

(ii) evidence of serious adverse effects associated with corticosteroids exists (eg. adrenal suppression, increased lung infections);

(b) Indicated as first line therapy for exercise induced asthma.

- MONTELUKAST (SANIS) – comprimés, 4, 5 et 10 mg –

a) traitement d'appoint pour l'asthme dans les cas suivants :

(i) les doses maximales de corticostéroïdes administrées par inhalation n'ont pas contrôlé les symptômes de façon efficace,

(ii) des réactions indésirables à l'utilisation de corticostéroïdes sont à craindre, p. ex. suppression surrénale, infection aggravée des poumons;

b) thérapie du premier degré pour l'asthme induit par l'exercice.

- MONTELUKAST (SIVEM) – comprimés, 4 et 5 mg –

a) traitement d'appoint pour l'asthme dans les cas suivants :

(i) les doses maximales de corticostéroïdes administrées par inhalation n'ont pas contrôlé les symptômes de façon efficace,

(ii) des réactions indésirables à l'utilisation de corticostéroïdes sont à craindre, p. ex. suppression surrénale, infection aggravée des poumons;

b) thérapie du premier degré pour l'asthme induit par l'exercice.

- MONTELUKAST (SIVEM) – comprimés, 10 mg –

a) traitement d'appoint pour l'asthme dans les cas suivants :

(i) les doses maximales de corticostéroïdes administrées par inhalation n'ont pas contrôlé les symptômes de façon efficace,

(ii) des réactions indésirables à l'utilisation de corticostéroïdes sont à craindre, p. ex. suppression surrénale, infection aggravée des poumons;

b) thérapie du premier degré pour l'asthme induit par l'exercice.

- MYLAN-AZITHROMYCIN – 250 mg Tablets – For the treatment of patients:
 - (a) not responding to or intolerant of alternative antibiotics (eg. amoxicillin and erythromycin);
 - (b) with mycobacterial infections due to mycobacterium avium and mycobacterium intracellulare;
 - (c) with sexually transmitted disease due to Chlamydia;
 - (d) Pneumonia;
 - (e) Infections requiring a macrolide (including CAP in patients 65 and older) with documented intolerance to erythromycin.
- MYLAN-CIPROFLOXACIN – 250, 500 and 750 mg Tablets –
 - (a) Step-down care following hospital separation in patients treated with parenteral antibiotics;
 - (b) Treatment of Pseudomonal infections or resistant gram-negative infections;
 - (c) Treatment of resistant Gonococcal infections;
 - (d) Treatment of infections in persons allergic to alternative agents (eg. penicillins, cephalosporins and sulfonamides);
 - (e) Treatment of infections in immunocompromised patients;
 - (f) Treatment of diabetic foot infections and complications of orthopedic surgery;
 - (g) Treatment of chronic bacterial prostatitis.
- MYLAN-CLARITHROMYCIN – 250 and 500 mg Tablets – For treatment of patients:
 - (a) not responding to or intolerant of alternative antibiotics (eg. amoxicillin and erythromycin);
- MYLAN-AZITHROMYCINE – comprimés, 250 mg – pour le traitement :
 - a) des malades qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais ou qui ne les tolèrent pas (p. ex. amoxicilline et érythromycine);
 - b) des malades ayant des mycobactérioses provoquées par le mycobacterium avium et le mycobacterium intracellulare;
 - c) des maladies transmises sexuellement causées par la chlamydia;
 - d) des pneumonies;
 - e) des infections exigeant des macrolides (y compris les pneumonies d'origine communautaire contractées par des personnes d'au moins 65 ans) chez les patients qui ne tolèrent pas l'érythromycine.
- MYLAN-CIPROFLOXACIN – comprimés, 250, 500 et 750 mg –
 - a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital pour les malades auxquels des antibiotiques ont été administrés par voie parentérale;
 - b) traitement des infections pseudomonales ou des infections Gram négatif résistantes;
 - c) traitement des gonococcies résistantes;
 - d) traitement des infections chez les personnes allergiques aux agents de relais (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides);
 - e) traitement des infections chez les malades immunodéprimés;
 - f) traitement des infections de pied diabétique et des complications résultant d'une chirurgie orthopédique;
 - g) traitement d'une prostatite bactérienne chronique.
- MYLAN-CLARITHROMYCIN – comprimés, 250 et 500 mg – pour le traitement :
 - a) des malades qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais ou qui ne les tolèrent pas (p. ex. amoxicilline et érythromycine);

- (b) with mycobacterial infections due to mycobacterium avium and mycobacterium intracellulare;
- (c) in combination therapy in the treatment of H. pylori;
- (d) Pneumonia;
- (e) Infections requiring a macrolide (including CAP in patients 65 and older) with documented intolerance to erythromycin.
- MYLAN-CYCLOBENZAPRINE – 10 mg Tablets – As an adjunct to rest and physical therapy for relief of muscle spasm associated with acute, painful musculoskeletal conditions not responding to alternative therapy. Coverage will be provided for up to 126 tablets per benefit year.
- MYLAN-FENTANYL MATRIX – 12, 25, 50, 75 and 100 mcg Patches – For the treatment of pain in patients unable to tolerate analgesics or when there is failure to adequately control pain with oral analgesics, or in patients for whom oral analgesics are deemed inappropriate.
- MYLAN-FINASTERIDE – 5 mg Tablets – For the treatment of symptomatic benign prostatic hyperplasia.
- MYLAN-FLUCONAZOLE – 50 and 100 mg Tablets – For the prophylaxis and treatment of
- (a) oropharyngeal and esophageal candidiasis in immunocompromised patients; and
- (b) systemic fungal infections other than oropharyngeal candidiasis.
- MYLAN-LEVOFLOXACIN – 250 and 500 mg Tablets –
- (a) Step-down care following hospital separation in patients treated with parenteral antibiotics;
- (b) Treatment of gram-negative infections resistant to standard therapy;
- b) des malades ayant des mycobactérioses provoquées par le mycobacterium avium et le mycobacterium intracellulare;
- c) des ulcères causés par l'hélicobacter pylori chez les malades qui subissent une pharmacothérapie mixte;
- d) des pneumonies;
- e) des infections exigeant des macrolides (y compris les pneumonies d'origine communautaire contractées par des personnes d'au moins 65 ans) chez les patients qui ne tolèrent pas l'érythromycine.
- MYLAN-CYCLOBENZAPRINE – comprimés, 10 mg – médicament d'appoint au repos et à la physiothérapie visant à soulager les spasmes musculaires associés à des troubles musculo-squelettiques aigus et douloureux que les autres formes de thérapie ne peuvent soulager. Un maximum de 126 comprimés sont pris en charge par année d'indemnisation.
- MYLAN-FENTANYL MATRIX – timbres, 12, 25, 50, 75 et 100 mcg – pour le traitement de la douleur chez les malades qui ne peuvent supporter les analgésiques administrés par voie orale ou pour lesquels ils ne sont pas recommandés ou lorsque ces derniers ne peuvent réduire suffisamment la douleur.
- MYLAN-FINASTERIDE – comprimés, 5 mg – pour le traitement de l'hyperplasie bénigne symptomatique.
- MYLAN-FLUCONAZOLE – comprimés, 50 et 100 mg – en guise de traitement prophylactique et pour le traitement :
- a) des candidoses oropharyngées et oesophagiennes chez les malades immunodéprimés;
- b) des infections fongiques systémiques autres que la candidose oropharyngée.
- MYLAN-LEVOFLOXACIN – comprimés, 250 et 500 mg –
- a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital pour les malades auxquels des antibiotiques ont été administrés par voie parentérale;
- b) traitement des infections Gram négatif résistantes aux médicaments ordinaires;

- | | |
|--|--|
| <p>(c) Treatment of infections in persons allergic to alternative agents (eg. penicillins, cephalosporins and sulfonamides);</p> <p>(d) Treatment of bacterial prostatitis;</p> <p>(e) Treatment of respiratory infections in patients failing or likely to fail or intolerant of penicillins, cephalosporins and/or macrolides;</p> <p>(f) Treatment of diabetic foot infections;</p> <p>(g) Community acquired pneumonia with co-morbid illness or failure of first-line therapy;</p> <p>(h) Pneumonia in long-term care patients.</p> | <p>c) traitement des infections chez les personnes allergiques aux agents de relais (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides);</p> <p>d) traitement d'une prostatite bactérienne;</p> <p>e) traitement des infections respiratoires chez les malades qui ne réagissent pas, sont susceptibles de ne pas réagir ou sont intolérants aux pénicillines, aux céphalosporines ou aux macrolides;</p> <p>f) traitement des infections de pied diabétique;</p> <p>g) traitement des pneumonies d'origine communautaire chez les patients ayant une maladie concomitante ou qui ne réagissent pas au traitement de première ligne;</p> <p>h) traitement des pneumonies chez les patients qui reçoivent des soins de longue durée.</p> |
| <p>– MYLAN-MINOCYCLINE – 50 and 100 mg Capsules:</p> <p>(a) For treatment of acne unresponsive to tetracycline or erythromycin;</p> <p>(b) For rheumatoid arthritis patients who have failed two other second line agents.</p> | <p>– MYLAN-MINOCYCLINE – capsules, 50 et 100 mg – pour le traitement :</p> <p>a) de l'acné sur laquelle la tétracycline et l'érythromycine n'agissent pas;</p> <p>b) des malades atteints d'arthrite rhumatoïdale qui ont déjà essayé sans succès deux autres médicaments de deuxième intention.</p> |
| <p>– MYLAN-MONTELUKAST – 4, 5 and 10 mg Tablets –</p> <p>(a) Indicated as adjunctive therapy for asthma in cases where:</p> <p>(i) maximum doses of inhaled corticosteroids have not effectively controlled symptoms, or</p> <p>(ii) evidence of serious adverse effects associated with corticosteroids exists, eg. adrenal suppression, increased lung infections;</p> <p>(b) Indicated as first line therapy for exercise induced asthma.</p> | <p>– MYLAN-MONTELUKAST – comprimés, 4, 5 et 10 mg –</p> <p>a) traitement d'appoint pour l'asthme dans les cas suivants :</p> <p>(i) les doses maximales de corticostéroïdes administrées par inhalation n'ont pas contrôlé les symptômes de façon efficace,</p> <p>(ii) des réactions indésirables à l'utilisation de corticostéroïdes sont à craindre, p. ex. suppression surrénale, infection aggravée des poumons;</p> <p>b) thérapie du premier degré pour l'asthme induit par l'exercice.</p> |
| <p>– MYLAN-PRAMIPEXOLE – 0.25, 0.5, 1 and 1.5 mg Tablets – For the treatment for idiopathic Parkinson's Disease.</p> | <p>– MYLAN-PRAMIPEXOLE – comprimés, 0,25, 0,5, 1 et 1,5 mg – pour le traitement de la maladie de Parkinson idiopathique.</p> |

- MYLAN-RIZATRIPTAN ODT – 5 and 10 mg Controlled Release Tablets – For the treatment of ACUTE migraine attacks in patients where standard therapy has failed – to a maximum of 144 tablets per benefit year.

- MYLAN-SUMATRIPTAN – 50 and 100 mg Tablets – For the treatment of ACUTE migraine attacks in patients where standard therapy has failed – to a maximum of 144 tablets per benefit year.

- MYLAN-TICLOPIDINE – 250 mg – Tablets – Gen-Ticlopidine will be re-imbursed for patients:

(a) For the secondary prevention of vascular ischemic events ie, myocardial infarction, or stroke;

(i) who are known to be or become intolerant to ASA, or

(ii) who continue to have TIA or stroke symptoms or myocardial infarction while being treated with ASA or clopidogrel;

NOTE: ASA should be first line for the secondary prevention of vascular ischemic events such as myocardial infarction or stroke. Before abandoning ASA, efforts should be made to improve tolerability of ASA by reducing the dose, taking it with food and using enteric coated ASA.

(b) Post coronary stent implantation x 28 days in combination with ASA.

- MYLAN-ZOLMITRIPTAN – 2.5 mg Tablets – For the treatment of ACUTE migraine attacks in patients where standard therapy has failed – to a maximum of 144 tablets per benefit year.

- MYLAN-ZOLMITRIPTAN ODT – 2.5 mg Tablets – For the treatment of ACUTE migraine attacks in patients where standard therapy has failed – to a maximum of 144 tablets per benefit year.

- MYLAN-RIZATRIPTAN ODT – comprimés à libération contrôlée, 5 et 10 mg – pour le traitement des migraines AIGUËS lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas. Maximum de 144 comprimés par année d'indemnisation.

- MYLAN-SUMATRIPTAN – comprimés, 50 et 100 mg – pour le traitement des migraines AIGUËS lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas. Maximum de 144 comprimés par année d'indemnisation.

- MYLAN-TICLOPIDINE – 250 mg – comprimés – un remboursement est accordé au malade :

(a) pour la prévention secondaire de pénombres ischémiques vasculaires, c.-à-d., infarctus du myocarde ou accident cérébrovasculaire :

(i) chez les malades qui sont ou deviennent intolérants à l'AAS,

(ii) chez les malades qui continuent à avoir des symptômes d'accident ischémique transitoire ou d'infarctus du myocarde pendant qu'ils suivent un traitement à l'AAS ou au clopidogrel;

NOTA : L'AAS est le médicament du premier degré à administrer pour la prévention secondaire de pénombres ischémiques vasculaires tels qu'un infarctus du myocarde ou un accident cérébrovasculaire. Avant d'abandonner le traitement à l'AAS, il faut s'efforcer d'améliorer la tolérance du malade à l'AAS en réduisant la dose, en le faisant prendre avec de la nourriture et en l'administrant sous forme de comprimé à enrobage entérosoluble.

b) après l'implantation d'un stent coronarien, pendant 28 jours avec de l'AAS.

- MYLAN-ZOLMITRIPTAN – comprimés, 2.5 mg – pour le traitement des migraines AIGUËS lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas. Maximum de 144 comprimés par année d'indemnisation.

- MYLAN-ZOLMITRIPTAN ODT – comprimés, 2,5 mg – pour le traitement des migraines AIGUËS lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas. Maximum de 144 comprimés par année d'indemnisation.

- NIDAGEL – 0.75% Vaginal Gel – For treatment of bacterial vaginosis for patients who fail oral metronidazole or are intolerant to oral metronidazole, or are pregnant in the second and third trimester.
- NOVO-AZITHROMYCIN – 20 mg/mL and 40 mg/mL Oral Suspension – For the treatment of otitis media in patients not responding to or intolerant of alternative antibiotics (eg. amoxicillin and erythromycin).
- NOVO-AZITHROMYCIN – 250 mg Tablets – For the treatment of patients:
 - (a) not responding to or intolerant to alternative antibiotics (eg. amoxicillin and erythromycin);
 - (b) with mycobacterial infections due to mycobacterium avium and mycobacterium with intracellulare;
 - (c) with sexually transmitted disease due to Chlamydia;
 - (d) Pneumonia;
 - (e) Infections requiring a macrolide (including CAP in patients 65 and older) with documented intolerance to erythromycin.
- NOVO-CIPROFLOXACIN – 250, 500 and 750 mg Tablets –
 - (a) Step-down care following hospital separation in patients treated with parenteral antibiotics;
 - (b) Treatment of Pseudomonal infections or resistant gram-negative infections;
 - (c) Treatment of resistant Gonococcal infections;
 - (d) Treatment of infections in persons allergic to alternative agents (eg. penicillins, cephalosporins and sulfonamides);
 - (e) Treatment of infections in immunocompromised patients;
- NIDAGEL – gel vaginal, 0,75 % – pour le traitement de vaginoses bactériennes chez les malades qui ne réagissent pas au métronidazole oral ou qui ne tolèrent pas le métronidazole oral ou qui ont atteint le deuxième ou troisième trimestre de leur grossesse.
- NOVO-AZITHROMYCINE – 20 et 40 mg/ml, suspension orale – pour le traitement de l'otite moyenne chez les malades qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais ou qui ne les tolèrent pas (p.ex. amoxicilline et érythromycine).
- NOVO-AZITHROMYCINE – comprimés, 250 mg – pour le traitement :
 - a) des malades qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais ou qui ne les tolèrent pas (p. ex. amoxicilline et érythromycine);
 - b) des malades ayant des mycobactérioses provoquées par le mycobacterium avium et le mycobacterium intracellulare;
 - c) des maladies transmises sexuellement causées par la chlamydia;
 - d) des pneumonies;
 - e) des infections exigeant des macrolides (y compris les pneumonies d'origine communautaire contractées par des personnes d'au moins 65 ans) chez les patients qui ne tolèrent pas l'érythromycine.
- NOVO-CIPROFLOXACIN – comprimés, 250, 500 et 750 mg –
 - a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital pour les malades auxquels des antibiotiques ont été administrés par voie parentérale;
 - b) traitement des infections pseudomonales ou des infections Gram négatif résistantes;
 - c) traitement des gonococcies résistantes;
 - d) traitement des infections chez les personnes allergiques aux agents de relais (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides);
 - e) traitement des infections chez les malades immunodéprimés;

- | | |
|---|--|
| <p>(f) Treatment of diabetic foot infections and complications of orthopedic surgery;</p> <p>(g) Treatment of chronic bacterial prostatitis.</p> | <p>f) traitement des infections de pied diabétique et des complications résultant d'une chirurgie orthopédique;</p> <p>g) traitement d'une prostatite bactérienne chronique.</p> |
| <p>- NOVO-CLAVAMOXIN – 875 mg/125 mg Tablets –</p> <p>(a) Treatment of patients not responding to alternative antibiotics (e.g. amoxicillin);</p> <p>(b) Treatment of patients with infections caused by organisms known to be resistant to alternative antibiotics (e.g. amoxicillin).</p> | <p>- NOVO-CLAVAMOXIN – comprimés, 875 mg/125 mg –</p> <p>a) traitement des malades qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais (p. ex. amoxicilline);</p> <p>b) traitement des malades ayant des infections causées par des germes résistants aux antibiotiques de relais (p. ex. amoxicilline).</p> |
| <p>- NOVO-CYCLOPRINE – 10 mg Tablets – As an adjunct to rest and physical therapy for relief of muscle spasm associated with acute, painful musculoskeletal conditions not responding to alternative therapy. Coverage will be provided for up to 126 tablets per benefit year.</p> | <p>- NOVO-CYCLOPRINE – comprimés, 10 mg – médicament d'appoint au repos et à la physiothérapie visant à soulager les spasmes musculaires associés à des troubles musculo-squelettiques aigus et douloureux que les autres formes de thérapie ne peuvent soulager. Un maximum de 126 comprimés sont pris en charge par année d'indemnisation.</p> |
| <p>- NOVO-DESMOPRESSIN – 0.1 and 0.2 mg Tablets – For treatment of</p> <p>(a) diabetes insipidus; and</p> <p>(b) enuresis in children refractory to alternative agents.</p> | <p>- NOVO-DESMOPRESSIN – comprimés, 0,1 et 0,2 mg – pour le traitement :</p> <p>a) du diabète insipide;</p> <p>b) de l'énurésie chez les enfants qui sont réfractaires aux autres agents de traitement.</p> |
| <p>- NOVO-FINASTERIDE – 5 mg Tablets – For the treatment of symptomatic benign prostatic hyperplasia.</p> | <p>- NOVO-FINASTERIDE – comprimés, 5 mg – pour le traitement de l'hyperplasie bénigne symptomatique.</p> |
| <p>- NOVO-FLUCONAZOLE – 50 and 100 mg Tablets – For the prophylaxis and treatment of</p> <p>(a) oropharyngeal and esophageal candidiasis in immunocompromised patients; and</p> <p>(b) systemic fungal infections other than oropharyngeal candidiasis.</p> | <p>- NOVO-FLUCONAZOLE – comprimés, 50 et 100 mg – en guise de traitement prophylactique et pour le traitement :</p> <p>a) des candidoses oropharyngées et oesophagiennes chez les malades immunodéprimés;</p> <p>b) des infections fongiques systémiques autres que la candidose oropharyngée.</p> |
| <p>- NOVO-FURANTOIN – 50 and 100 mg Capsules – For patients not tolerating Microcrystalline Nitrofurantoin.</p> | <p>- NOVO-FURANTOIN – capsules, 50 et 100 mg – pour les personnes qui ne tolèrent pas la Nitrofurantoïne microcristalline.</p> |

- NOVO-KETOTIFEN – 0.2 mg/mL Oral Solution – For treatment of pediatric patients with asthma who are unresponsive to or unable to administer alternative prophylactic agents listed in the Formulary.
- NOVO-KETOTIFEN – solution orale, 0,2 mg/ml – pour le traitement de l'asthme chez les enfants qui ne réagissent pas aux autres agents de prophylaxie énumérés dans la *Liste* ou qui sont incapables de les prendre.
- NOVO-LEVOFLOXACIN – 250 and 500 mg Tablets –
 - (a) Step-down care following hospital separation in patients treated with parenteral antibiotics;
 - (a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital pour les malades auxquels des antibiotiques ont été administrés par voie parentérale;
 - (b) Treatment of gram-negative infections resistant to standard therapy;
 - (b) traitement des infections Gram négatif résistantes aux médicaments ordinaires;
 - (c) Treatment of infections in persons allergic to alternative agents (eg. penicillins, cephalosporins and sulfonamides);
 - (c) traitement des infections chez les personnes allergiques aux agents de relais (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides);
 - (d) Treatment of bacterial prostatitis;
 - (d) traitement d'une prostatite bactérienne;
 - (e) Treatment of respiratory infections in patients failing or likely to fail or intolerant of penicillins, cephalosporins and/or macrolides;
 - (e) traitement des infections respiratoires chez les malades qui ne réagissent pas, sont susceptibles de ne pas réagir ou sont intolérants aux pénicillines, aux céphalosporines ou aux macrolides;
 - (f) Treatment of diabetic foot infections;
 - (f) traitement des infections de pied diabétique;
 - (g) Community acquired pneumonia with co-morbid illness or failure of first-line therapy;
 - (g) traitement des pneumonies d'origine communautaire chez les patients ayant une maladie concomitante ou qui ne réagissent pas au traitement de première ligne;
 - (h) Pneumonia in long-term care patients.
 - (h) traitement des pneumonies chez les patients qui reçoivent des soins de longue durée.
- NOVO-MINOCYCLINE – 50 and 100 mg Capsules –
 - (a) For treatment of acne unresponsive to tetracycline or erythromycin.
 - (a) de l'acné sur laquelle la tétracycline et l'érythromycine n'agissent pas;
 - (b) For rheumatoid arthritis patients who have failed two other second line agents.
 - (b) des malades atteints d'arthrite rhumatoïdale qui ont déjà essayé sans succès deux autres médicaments de deuxième intention.
- NOVO-NARATRIPTAN – 1 and 2.5 mg Tablets – For the treatment of ACUTE migraine attacks in patients where standard therapy has failed – to a maximum of 144 tablets per benefit year.
- NOVO-NARATRIPTAN – comprimés, 1 et 2,5 mg – pour le traitement des migraines AIGUËS lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas. Maximum de 144 comprimés par année d'indemnisation.

- NOVO-NORFLOXACIN – 400 mg Tablets –
 - (a) For treatment of urinary tract infections caused by *Pseudomonas aeruginosa*;
 - (b) For treatment of urinary tract infections not responding to alternative therapy (eg. penicillins, cephalosporins and sulfonamides);
 - (c) For treatment of urinary tract infections in persons allergic to alternative agents (eg. penicillins, cephalosporins and sulfonamides);
 - (d) For treatment of chronic bacterial prostatitis.

 - NOVO-OFLOXACIN – 200 and 300 mg Tablets
 - (a) Step-down care following hospital separation in patients treated with parenteral antibiotics;
 - (b) Treatment of *Pseudomonas* infections or resistant gram-negative infections;
 - (c) Treatment of resistant Gonococcal infections;
 - (d) Treatment of infections in persons allergic to alternative agents (e.g. penicillins, cephalosporins and sulfonamides);
 - (e) Treatment of infections in immunocompromised patients;
 - (f) Treatment of diabetic foot infections and complications of orthopedic surgery;
 - (g) Treatment of chronic bacterial prostatitis.

 - NOVO-SUMATRIPTAN – 100 mg Tablets – For the treatment of ACUTE migraine attacks in patients where standard therapy has failed – to a maximum of 144 tablets per benefit year.

 - NOVO-SUMATRIPTAN DF – 50 and 100 mg Tablets – For the treatment of ACUTE migraine attacks in patients where standard therapy has failed – to a maximum of 144 tablets per benefit year.
- NOVO-NORFLOXACIN – comprimés, 400 mg –
 - a) pour le traitement des infections des voies urinaires causées par le *pseudomonas aeruginosa*;
 - b) pour le traitement des infections des voies urinaires sur lesquelles les autres méthodes de thérapie n'agissent pas (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides);
 - c) pour le traitement des infections des voies urinaires chez les personnes allergiques aux agents de relais (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides);
 - d) pour le traitement d'une prostatite bactérienne chronique.

 - NOVO-OFLOXACIN – comprimés, 200 et 300 mg –
 - a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital pour les malades auxquels des antibiotiques ont été administrés par voie parentérale;
 - b) traitement des infections pseudomonales ou des infections Gram négatif résistantes;
 - c) traitement des gonococcies résistantes;
 - d) traitement des infections chez les personnes allergiques aux agents de relais (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides);
 - e) traitement des infections chez les malades immunodéprimés;
 - f) traitement des infections de pied diabétique et des complications résultant d'une chirurgie orthopédique;
 - g) traitement d'une prostatite bactérienne chronique.

 - NOVO-SUMATRIPTAN – comprimés, 100 mg – pour le traitement des migraines AIGUËS lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas. Maximum de 144 comprimés par année d'indemnisation.

 - NOVO-SUMATRIPTAN DF – 50 et 100 mg, comprimés – pour le traitement des migraines AIGUËS lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas. Maximum de 144 comprimés par année d'indemnisation.

- NOVO-TICLOPIDINE – 250 mg Tablets – Novo-Ticlopidine will be reimbursed for patients:

(a) For the secondary prevention of vascular ischemic events ie. myocardial infarction, or stroke

(i) who are known to be or become intolerant to ASA, or

(ii) who continue to have TIA or stroke symptoms or myocardial infarction while being treated with ASA or clopidogrel.

NOTE: ASA should be first line for the secondary prevention of vascular ischemic events such as myocardial infarction or stroke. Before abandoning ASA, efforts should be made to improve tolerability of ASA by reducing the dose, taking it with food and using enteric coated ASA.

(b) Post coronary stent implantation x 28 days in combination with ASA.

- NUTROPIN AQ – 5 mg/mL Pen Cartridge

(a) For the long term management of children who have growth failure due to an inadequate secretion of normal endogenous growth hormone;

(b) For treatment of children who have growth failure associated with chronic renal failure insufficiency up to the time of renal transplant;

(c) For treatment of short stature associated with Turner Syndrome in patients whose epiphyses are not closed.

- NUTROPIN AQ NUSPIN – 5 mg/2 mL, 10 mg/2 mL and 20 mg/2 mL Injection –

(a) For the long term management of children who have growth failure due to an inadequate secretion of normal endogenous growth hormone;

- NOVO-TICLOPIDINE – comprimés, 250 mg – un remboursement est accordé au malade :

a) pour la prévention secondaire de pénombres ischémiques vasculaires, c.-à-d., infarctus du myocarde ou accident cérébrovasculaire :

(i) chez les malades qui sont ou deviennent intolérants à l'AAS,

(ii) chez les malades qui continuent à avoir des accidents ischémiques transitoires ou des infarctus du myocarde pendant qu'ils suivent un traitement à l'AAS ou au clopidogrel;

NOTA : L'AAS est le médicament du premier degré à administrer pour la prévention secondaire de pénombres ischémiques vasculaires tels qu'un infarctus du myocarde ou un accident cérébrovasculaire. Avant d'abandonner le traitement à l'AAS, il faut s'efforcer d'améliorer la tolérance du malade à l'AAS en réduisant la dose, en le faisant prendre avec de la nourriture et en l'administrant sous forme de comprimé à enrobage entérosoluble.

b) après l'implantation d'un stent coronarien, pendant 28 jours avec de l'AAS.

- NUTROPIN AQ – 5mg/ml, stylo injecteur

a) pour le traitement à long terme des enfants ayant des troubles de croissance causés par une sécrétion insuffisante de l'hormone de croissance endogène normale;

b) pour le traitement des enfants ayant des troubles de croissance liés à une insuffisance rénale chronique jusqu'au moment de la transplantation rénale;

c) pour le traitement d'une insuffisance staturale liée au syndrome de Turner chez les malades dont les épiphyses ne sont pas fermées.

- NUTROPIN AQ NUSPIN – injection, 5 mg/2 ml, 10 mg/2 ml et 20 mg/2 ml –

a) pour le traitement à long terme des enfants ayant des troubles de croissance causés par une sécrétion insuffisante de l'hormone de croissance endogène normale;

- (b) For the treatment of children who have growth failure associated with chronic renal failure insufficiency up to the time of renal transplant;
- (c) For treatment of short stature associated with Turner Syndrome in patients whose epiphyses are not closed.
- OCUFLOX – 0.3% Ophthalmic Solution – For the treatment of ophthalmic infections caused by gram-negative organisms or those not responding to alternative agents.
- OESCLIM – 25 mcg, 50 mcg – Transdermal Patch – For patients
- (a) who are smokers (current);
- (b) with increased triglycerides;
- (c) with a history of cholelithiasis; or
- (d) who cannot tolerate oral estrogens due to intolerable side effects (eg. GI upset, irregular bleeding, etc) or who cannot take any medications by mouth. Patients should have tried at least two different oral estrogen products (eg. Premarin, Estrace, Ogen).
- OFLOXACIN (AA PHARMA) – 200, 300 and 400 mg Tablets –
- (a) Step-down care following hospital separation in patients treated with parenteral antibiotics;
- (b) Treatment of Pseudomonal infections or resistant gram-negative infections;
- (c) Treatment of resistant Gonococcal infections;
- (d) Treatment of infections in persons allergic to alternative agents (eg. penicillins, cephalosporins and sulfonamides);
- (e) Treatment of infections in immunocompromised patients;
- b) pour le traitement des enfants ayant des troubles de croissance liés à une insuffisance rénale chronique jusqu'au moment de la transplantation rénale;
- c) pour le traitement d'une insuffisance staturale liée au syndrome de Turner chez les malades dont les épiphyses ne sont pas fermées.
- OCUFLOX – solution ophtalmique, 0,3 % – pour le traitement des infections ophtalmiques causées par des germes Gram négatif ou des organismes sur lesquels les agents de relais n'agissent pas.
- OESCLIM – 25 mcg, 50 mcg – timbre transdermique – pour les malades :
- a) qui sont fumeuses;
- b) ayant une augmentation du nombre de triglycérides;
- c) ayant des antécédents de lithiase biliaire;
- d) qui ne peuvent prendre d'œstrogènes administrés oralement en raison d'effets secondaires intolérables (p. ex. : troubles gastro-intestinaux, saignements irréguliers, etc.) ou qui ne peuvent prendre de médicaments par voie orale; les malades devraient avoir essayé de prendre par voie orale au moins deux médicaments œstrogènes différents (p. ex. : Premarin, Estrace ou Ogen).
- OFLOXACIN (AA PHARMA) – comprimés, 200, 300 et 400 mg –
- a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital pour les malades auxquels des antibiotiques ont été administrés par voie parentérale;
- b) traitement des infections pseudomonales ou des infections Gram négatif résistantes;
- c) traitement des gonococcies résistantes;
- d) traitement des infections chez les personnes allergiques aux agents de relais (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides);
- e) traitement des infections chez les malades immunodéprimés;

- | | |
|--|--|
| <p>(f) Treatment of diabetic foot infections and complicated orthopedic surgery;</p> <p>(g) Treatment of chronic bacterial prostatitis.</p> | <p>f) traitement des infections de pied diabétique et des complications résultant d'une chirurgie orthopédique;</p> <p>g) traitement d'une prostatite bactérienne chronique.</p> |
| <p>- OMNITROPE (SANDOZ) – 5 mg/1.5 mL and 10 mg/1.5 mL Injection – For the long term management of children who have growth failure due to inadequate secretion of normal endogenous growth hormone.</p> | <p>- OMNITROPE (SANDOZ) – injection, 5 mg et 10 mg/1,5 ml – pour le traitement à long terme des enfants ayant des troubles de croissance causés par une sécrétion insuffisante de l'hormone de croissance endogène normale.</p> |
| <p>- ONE ALPHA – 0.25 and 1.0 ug Capsules and 0.2 ug/ml Solution – For the management of hypocalcemia and osteodystrophy in patients with chronic renal failure undergoing dialysis and in the management of hypocalcemia in clinical manifestations associated with post surgical hypoparathyroidism, idiopathic hypoparathyroidism, pseudohypoparathyroidism, and Vitamin D resistant rickets.</p> | <p>- ONE ALPHA – capsules, 0,25 et 1 ug, et solution, 0,2 ug/ml – pour le traitement de l'hypocalcémie et de l'ostéodystrophie chez les malades souffrant d'une insuffisance rénale chronique et recourant à la dialyse et pour le traitement des malades atteints d'hypocalcémie et démontrant des symptômes cliniques liés à l'hypoparathyroïdie idiopathique, à la pseudohypoparathyroïdie et au rachitisme résistant à la vitamine D.</p> |
| <p>- PMS-AZITHROMYCIN – 20 and 40 mg/mL Oral Solution – For the treatment of otitis media in patients not responding to or intolerant of alternative antibiotics (eg. amoxicillin and erythromycin).</p> | <p>- PMS-AZITHROMYCINE – 20 et 40 mg/ml, solution orale – pour le traitement de l'otite moyenne chez les malades qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais ou qui ne les tolèrent pas (p.ex. amoxicilline et érythromycine).</p> |
| <p>- PMS-AZITHROMYCIN – 250 mg Tablets – For the treatment of patients:</p> <p>(a) not responding to or intolerant of alternative antibiotics (eg. amoxicillin and erythromycin);</p> <p>(b) with mycobacterial infections due to mycobacterium avium and mycobacterium intracellulare;</p> <p>(c) with sexually transmitted disease due to Chlamydia;</p> <p>(d) Pneumonia;</p> <p>(e) Infections requiring a macrolide (including CAP in patients 65 and older) with documented intolerance to erythromycin.</p> | <p>- PMS-AZITHROMYCINE – comprimés, 250 mg – pour le traitement :</p> <p>a) des malades qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais ou qui ne les tolèrent pas (p. ex. amoxicilline et érythromycine);</p> <p>b) des malades ayant des mycobactérioses provoquées par le mycobacterium avium et le mycobacterium intracellulare;</p> <p>c) des maladies transmises sexuellement causées par la chlamydia;</p> <p>d) des pneumonies;</p> <p>e) des infections exigeant des macrolides (y compris les pneumonies d'origine communautaire contractées par des personnes d'au moins 65 ans) chez les patients qui ne tolèrent pas l'érythromycine.</p> |

- PMS-AZITHROMYCIN – 600 mg Tablets – For the treatment of patients with mycobacterium avium and mycobacterium intracellulare.
- PMS-CIPROFLOXACIN – 0.3% Ophthalmic Solution – For the treatment of ophthalmic infections caused by gram-negative organisms or those not responding to alternative agents.
- PMS-CIPROFLOXACIN – 250, 500 and 750 mg Tablets
 - (a) Step-down care following hospital separation in patients treated with parenteral antibiotics;
 - (b) Treatment of Pseudomonal infections or resistant gram-negative infections;
 - (c) Treatment of resistant Gonococcal infections;
 - (d) Treatment of infections in persons allergic to alternative agents (eg. penicillins, cephalosporins and sulfonamides);
 - (e) Treatment of infections in immunocompromised patients;
 - (f) Treatment of diabetic foot infections and complications of orthopedic surgery;
 - (g) Treatment of chronic bacterial prostatitis.
- PMS-CLARITHROMYCIN – 250 and 500 mg Tablets – For treatment of patients:
 - (a) not responding to or intolerant of alternative antibiotics (eg. amoxicillin and erythromycin);
 - (b) with mycobacterial infections due to mycobacterium avium and mycobacterium intracellulare;
 - (c) in combination therapy in the treatment of H. pylori;
 - (d) Pneumonia;
- PMS-AZITHROMYCINE – comprimés, 600 mg – pour le traitement des malades ayant des mycobactérioses provoquées par le mycobacterium avium et le mycobacterium intracellulare.
- PMS-CIPROFLOXACIN – solution ophtalmique, 0,3 % – pour le traitement des infections ophtalmiques causées par des germes Gram négatif ou des organismes sur lesquels les agents de relais n'agissent pas.
- PMS-CIPROFLOXACIN – comprimés, 250, 500 et 750 mg
 - a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital pour les malades auxquels des antibiotiques ont été administrés par voie parentérale;
 - b) traitement des infections pseudomonales ou des infections Gram négatif résistantes;
 - c) traitement des gonococcies résistantes;
 - d) traitement des infections chez les personnes allergiques aux agents de relais (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides);
 - e) traitement des infections chez les malades immunodéprimés;
 - f) traitement des infections de pied diabétique et des complications résultant d'une chirurgie orthopédique;
 - g) traitement d'une prostatite bactérienne chronique.
- PMS-CLARITHROMYCIN – comprimés, 250 et 500 mg – pour le traitement :
 - a) des malades qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais ou qui ne les tolèrent pas (p. ex. amoxicilline et érythromycine);
 - b) des malades ayant des mycobactérioses provoquées par le mycobacterium avium et le mycobacterium intracellulare;
 - c) des ulcères causés par l'hélicobacter pylori chez les malades qui subissent une pharmacothérapie mixte;
 - d) des pneumonies;

- (e) Infections requiring a macrolide (including CAP in patients 65 and older) with documented intolerance to erythromycin.
- e) des infections exigeant des macrolides (y compris les pneumonies d'origine communautaire contractées par des personnes d'au moins 65 ans) chez les patients qui ne tolèrent pas l'érythromycine.
- PMS-CYCLOBENZAPRINE – 10 mg Tablets – As an adjunct to rest and physical therapy for relief of muscle spasm associated with acute, painful musculoskeletal conditions not responding to alternative therapy. Coverage will be provided for up to 126 tablets per benefit year.
 - PMS-CYCLOBENZAPRINE – comprimés, 10 mg – médicament d'appoint au repos et à la physiothérapie visant à soulager les spasmes musculaires associés à des troubles musculosquelettiques aigus et douloureux que les autres formes de thérapie ne peuvent soulager. Un maximum de 126 comprimés sont pris en charge par année d'indemnisation.
 - PMS-FENTANYL MTX – 12, 25, 50, 75 and 100 mcg Patches – For the treatment of pain in patients unable to tolerate analgesics or when there is failure to adequately control pain with oral analgesics or in patients for whom oral analgesics are deemed inappropriate.
 - PMS-FENTANYL MTX – timbres, 12, 25, 50, 75 et 100 mcg – pour le traitement de la douleur chez les malades qui ne peuvent supporter les analgésiques administrés par voie orale ou pour lesquels ils ne sont pas recommandés ou lorsque ces derniers ne peuvent réduire suffisamment la douleur.
 - PMS-FINASTERIDE – 5 mg Tablets – For the treatment of symptomatic benign prostatic hyperplasia.
 - PMS-FINASTERIDE – comprimés, 5 mg – pour le traitement de l'hyperplasie bénigne symptomatique.
 - PMS-FLUCONAZOLE – 150 mg Capsules – For a single dose treatment of vaginal candidiasis in patients who fail or are intolerant to topical antifungal therapy.
 - PMS-FLUCONAZOLE – capsules, 150 mg – pour le traitement, par dose unique, de candidases vaginales chez les malades qui ne réagissent pas au traitement antifongique topique ou qui ne tolèrent pas.
 - PMS-FLUCONAZOLE – 50 and 100 mg Tablets – For the prophylaxis and treatment of
 - (a) oropharyngeal and esophageal candidiasis in immunocompromised patients; and
 - (b) systemic fungal infections other than oropharyngeal candidiasis.
 - PMS-FLUCONAZOLE – comprimés, 50 et 100 mg – en guise de traitement prophylactique et pour le traitement :
 - a) des candidoses oropharyngées et oesophagiennes chez les malades immunodéprimés;
 - b) des infections fongiques systémiques autres que la candidose oropharyngée.
 - PMS-KETOTIFEN – 1 mg/5 mL Syrup – For treatment of pediatric patients with asthma who are unresponsive to or unable to administer alternative prophylactic agents listed in the Formulary.
 - PMS-KETOTIFEN – sirop, 1 mg/5 ml – pour le traitement de l'asthme chez les enfants qui ne réagissent pas aux autres agents de prophylaxie énumérés dans la *Liste des médicaments* ou qui sont incapables de les prendre.
 - PMS-LEVOFLOXACIN – 250 and 500 mg Tablets –
 - (a) Step-down care following hospital separation in patients treated with parenteral antibiotics;
 - PMS-LEVOFLOXACIN – comprimés, 250 et 500 mg –
 - a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital pour les malades auxquels des antibiotiques ont été administrés par voie parentérale;

- (b) Treatment of gram-negative infections resistant to standard therapy;
- (c) Treatment of infections in persons allergic to alternative agents (eg. penicillins, cephalosporins and sulfonamides);
- (d) Treatment of bacterial prostatitis;
- (e) Treatment of respiratory infections in patients failing or likely to fail or intolerant of penicillins, cephalosporins and/or macrolides;
- (f) Treatment of diabetic foot infections;
- (g) Community acquired pneumonia with co-morbid illness or failure of first-line therapy;
- (h) Pneumonia in long-term care patients.
- PMS-METHYLPHENIDATE – 5, 10 and 20 mg Tablets – For treatment of attention deficit disorder and narcolepsy.
- PMS-MINOCYCLINE – 50 and 100 mg Capsules –
- (a) For treatment of acne unresponsive to tetracycline or erythromycin;
- (b) For rheumatoid arthritis patients who have failed two other second line agents.
- PMS-MONTELUKAST – 4, 5 and 10 mg Tablets –
- (a) Indicated as adjunctive therapy for asthma in cases where:
- (i) maximum doses of inhaled corticosteroids have not effectively controlled symptoms, or
- (ii) evidence of serious adverse effects associated with corticosteroids exists (eg. adrenal suppression, increased lung infections);
- (b) Indicated as first line therapy for exercise induced asthma.
- b) traitement des infections Gram négatif résistantes aux médicaments ordinaires;
- c) traitement des infections chez les personnes allergiques aux agents de relais (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides);
- d) traitement d'une prostatite bactérienne;
- e) traitement des infections respiratoires chez les malades qui ne réagissent pas, sont susceptibles de ne pas réagir ou sont intolérants aux pénicillines, aux céphalosporines ou aux macrolides;
- f) traitement des infections de pied diabétique;
- g) traitement des pneumonies d'origine communautaire chez les patients ayant une maladie concomitante ou qui ne réagissent pas au traitement de première ligne;
- h) traitement des pneumonies chez les patients qui reçoivent des soins de longue durée.
- PMS-METHYLPHENIDATE – comprimés, 5, 10 et 20 mg – pour le traitement de la narcolepsie et des déficits de la capacité d'attention.
- PMS-MINOCYCLINE – capsules, 50 et 100 mg – pour le traitement :
- a) de l'acné sur laquelle la tétracycline et l'érythromycine n'agissent pas;
- b) des malades atteints d'arthrite rhumatismale qui ont déjà essayé sans succès deux autres médicaments de deuxième intention.
- PMS-MONTELUKAST – comprimés, 4, 5 et 10 mg –
- a) traitement d'appoint pour l'asthme dans les cas suivants :
- (i) les doses maximales de corticostéroïdes administrées par inhalation n'ont pas contrôlé les symptômes de façon efficace,
- (ii) des réactions indésirables à l'utilisation de corticostéroïdes sont à craindre, p. ex. suppression surrénale, infection aggravée des poumons;
- b) thérapie du premier degré pour l'asthme induit par l'exercice.

- PMS-NORFLOXACIN – 400 mg Tablets –

(a) For treatment of urinary tract infections caused by *Pseudomonas aeruginosa*;

(b) For treatment of urinary tract infections not responding to alternative therapy (eg. penicillins, cephalosporins and sulfonamides);

(c) For treatment of urinary tract infections in persons allergic to alternative agents (eg. penicillins, cephalosporins and sulfonamides);

(d) For treatment of chronic bacterial prostatitis.
- PMS-NORFLOXACIN – comprimés, 400 mg –

a) pour le traitement des infections des voies urinaires causées par le *pseudomonas aeruginosa*;

b) pour le traitement des infections des voies urinaires sur lesquelles les autres méthodes de thérapie n'agissent pas (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides);

c) pour le traitement des infections des voies urinaires chez les personnes allergiques aux agents de relais (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides);

d) pour le traitement d'une prostatite bactérienne chronique.
- PMS-OFLOXACIN – 0.3% Ophthalmic Solution – For the treatment of ophthalmic infections caused by gram-negative organisms or those not responding to alternative agents.
- PMS-OFLOXACIN – solution ophtalmique, 0,3 % – pour le traitement des infections ophtalmiques causées par des germes Gram négatif ou des organismes sur lesquels les agents de relais n'agissent pas.
- PMS-PRAMIPEXOLE – 0.25, 0.5, 1 AND 1.5 MG TABLETS – For treatment of idiopathic Parkinson's Disease.
- PMS-PRAMIPEXOLE – 0.25, 0.5, 1 ET 1.5 MG, COMPRIMÉS – pour le traitement de la maladie de Parkinson idiopathique.
- PMS-RIZATRIPTAN RDT – 5 and 10 mg Tablets – For the treatment of ACUTE migraine attacks in patients where standard therapy has failed – to a maximum of 144 tablets per benefit year.
- PMS-RIZATRIPTAN RDT – comprimés, 5 et 10 mg – pour le traitement des migraines AIGUËS lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas. Maximum de 144 comprimés par année d'indemnisation.
- PMS-SUMATRIPTAN – 50 and 100 mg Tablets – For the treatment of ACUTE migraine attacks in patients where standard therapy has failed – to a maximum of 144 tablets per benefit year.
- PMS-SUMATRIPTAN – comprimés, 50 et 100 mg – pour le traitement des migraines AIGUËS lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas. Maximum de 144 comprimés par année d'indemnisation.
- PMS-TOBRAMYCIN – 3 mg/mL Ophthalmic Solution – For treatment of highly suspected or proven Pseudomonal ophthalmic infections.
- PMS-TOBRAMYCINE – solution ophtalmique, 3 mg/ml – pour le traitement des infections ophtalmiques pseudomonales soupçonnées ou avérées.
- PMS-ZOLMITRIPTAN, PMS-ZOLMITRIPTAN ODT – 2.5 mg Tablets – For the treatment of ACUTE migraine attacks in patients where standard therapy has failed – to a maximum of 144 tablets per benefit year.
- PMS-ZOLMITRIPTAN, PMS-ZOLMITRIPTAN ODT – comprimés, 2,5 mg – pour le traitement des migraines AIGUËS lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas. Maximum de 144 comprimés par année d'indemnisation.
- PROMETRIUM – 100 mg Capsules – For the treatment of post-menopausal patients unable to tolerate oral medroxyprogesterone or in patients with low High Density Lipoprotein Cholesterol.
- PROMETRIUM – capsules, 100 mg – pour le traitement des ménopausées qui ne tolèrent pas le médroxyprogestérone oral ou chez les malades qui ont un faible taux de cholestérol à lipoprotéines de haute densité.

- PROSCAR – 5 mg Tablets – For the treatment of symptomatic benign prostatic hyperplasia.
- RAN-CEFPROZIL – 125 mg/5 mL and 250 mg/5 mL Powder for Suspension and 250 and 500 mg Tablets –
 - (a) Step-down care following hospital separation in patients treated with intravenous cephalosporins;
 - (b) Treatment of patients with infections not responding to alternative antibiotics (eg. amoxicillin);
 - (c) Treatment of infections caused by organisms known to be resistant to alternative antibiotics (eg. amoxicillin);
 - (d) Treatment of patients known to be allergic or unresponsive to alternative antibiotics (eg. penicillin or sulfonamides).
- RAN-CLARITHROMYCIN – 250 and 500 mg Tablets – For the treatment of patients:
 - (a) not responding to or intolerant of alternative antibiotics (eg. amoxicillin and erythromycin);
 - (b) with mycobacterial infections due to mycobacterium avium and mycobacterium intracellular;
 - (c) in combination therapy in the treatment of H.Pylori;
 - (d) Pneumonia;
 - (e) Infections requiring a macrolide (including CAP in patients 65 and older) with documented intolerance to erythromycin.
- RAN-FENTANYL MATRIX – 12, 25, 50, 75 and 100 mcg Patches – For the treatment of pain in patients unable to tolerate analgesics or when there is failure to adequately control pain with oral analgesics or in patients for whom oral analgesics are deemed inappropriate.
- PROSCAR – comprimés, 5 mg – pour le traitement de l'hyperplasie prostatique bénigne symptomatique.
- RAN-CEFPROZIL – poudre pour suspension, 125 mg/5 ml et 250 mg/5 ml et comprimés, 250 et 500 mg –
 - a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital chez les malades auxquels de la céphalosporine a été administrée par voie intraveineuse;
 - b) traitement des malades ayant des infections sur lesquelles les antibiotiques de relais n'agissent pas (p. ex. amoxicilline);
 - c) traitement des infections causées par des germes résistants aux antibiotiques de relais (p. ex. amoxicilline);
 - d) traitement des malades qui ne réagissent pas ou qui sont allergiques aux antibiotiques de relais (p. ex. pénicillines et sulfonamides).
- RAN-CLARITHROMYCIN – comprimés, 250 et 500 mg –
 - a) traitement des malades qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais ou qui ne les tolèrent pas (p. ex. amoxicilline et érythromycine);
 - b) traitement des malades ayant des mycobactérioses provoquées par le mycobacterium avium et le mycobacterium intracellulare;
 - c) traitement des ulcères causés par l'hélicobacter pylori chez les malades qui subissent une pharmacothérapie mixte;
 - d) traitement des pneumonies;
 - e) traitement des infections exigeant des macrolides (y compris les pneumonies d'origine communautaire contractées par des personnes d'au moins 65 ans) chez les patients qui ne tolèrent pas l'érythromycine.
- RAN-FENTANYL MATRIX – timbres, 12, 25, 50, 75 et 100 mcg – pour le traitement de la douleur chez les malades qui ne peuvent supporter les analgésiques ou pour lesquels les analgésiques par voie orale ne sont pas recommandés ou lorsque ces derniers ne peuvent réduire suffisamment la douleur.

- RAN-FINASTERIDE – 5 mg Tablets – For the treatment of symptomatic benign prostatic hyperplasia.
- RAN-FINASTERIDE – comprimés, 5 mg – pour le traitement de l'hyperplasie bénigne symptomatique.
- RAN-MONTELUKAST – 4, 5 AND 10 MG TABLETS –
- RAN-MONTELUKAST – comprimés, 4, 5 et 10 mg –
- (a) Indicated as adjunctive therapy for asthma in cases where:
- a) traitement d'appoint pour l'asthme dans les cas suivants :
- (i) maximum doses of inhaled corticosteroids have not effectively controlled symptoms, or
- (i) les doses maximales de corticostéroïdes administrées par inhalation n'ont pas contrôlé les symptômes de façon efficace,
- (ii) evidence of serious adverse effects associated with corticosteroids exists (eg. adrenal suppression, increased lung infections);
- (ii) des réactions indésirables à l'utilisation de corticostéroïdes sont à craindre (p. ex. suppression surrénale, infection aggravée des poumons);
- (b) Indicated as first line therapy for exercise induced asthma.
- b) thérapie du premier degré pour l'asthme induit par l'exercice.
- RATIO-AMOXI CLAV – 875 mg/125 mg Tablets –
- RATIO-AMOXI CLAV – comprimés, 875 mg/125 mg –
- (a) For treatment of patients not responding to alternative antibiotics (eg. amoxicillin);
- a) pour le traitement des malades qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais (p. ex. amoxicilline);
- (b) For treatment of patients with infections caused by organisms known to be resistant to alternative antibiotics (eg. amoxicillin).
- b) pour le traitement des malades ayant des infections causées par des germes résistant aux antibiotiques de relais (p. ex. amoxicilline).
- RATIO-AMOXI CLAV 125 F – 25/6.25 mg and 250 F – 50/12.5 mg Suspension
- RATIO-AMOXI CLAV 125 F – suspension, 25/6,25 mg et 250 F – 50/12,5 mg –
- (a) For treatment of patients not responding to alternative antibiotics (eg. amoxicillin);
- a) pour le traitement des malades qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais (p. ex. amoxicilline);
- (b) For treatment of patients with infections caused by organisms known to be resistant to alternative antibiotics (eg. amoxicillin).
- b) pour le traitement des malades ayant des infections causées par des germes résistants aux antibiotiques de relais (p. ex. amoxicilline).
- RATIO-AMOXI CLAV 250 – 250/125 mg and 500 – 500/125 mg Tablets
- RATIO-AMOXI CLAV 250 – comprimés, 250/125 mg et 500 – 500/125 mg –
- (a) For treatment of patients not responding to alternative antibiotics (eg. amoxicillin);
- a) pour le traitement des malades qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais (p. ex. amoxicilline);
- (b) For treatment of patients with infections caused by organisms known to be resistant to alternative antibiotics (eg. amoxicillin).
- b) pour le traitement des malades ayant des infections causées par des germes résistants aux antibiotiques de relais (p. ex. amoxicilline).

- RATIO-AZITHROMYCIN – 250 mg Tablets – For the treatment of patients:
 - (a) not responding to or intolerant of alternative antibiotics (eg. amoxicillin and erythromycin);
 - (b) with mycobacterial infections due to mycobacterium avium and mycobacterium intracellulare;
 - (c) with sexually transmitted disease due to Chlamydia;
 - (d) Pneumonia;
 - (e) Infections requiring a macrolide (including CAP in patients 65 and older) with documented intolerance to erythromycin.

- RATIO-CEFUROXIME – 250 and 500 mg Tablets –
 - (a) Step-down care following hospital separation in patients treated with intravenous cephalosporins;
 - (b) Treatment of patients with infections not responding to alternative antibiotics (eg. amoxicillin);
 - (c) Treatment of infections caused by organisms known to be resistant to alternative antibiotics (eg. amoxicillin);
 - (d) Treatment of patients known to be allergic or unresponsive to alternative antibiotics (eg. penicillin or sulfonamides).

- RATIO-CIPROFLOXACIN – 250, 500 and 750 mg Tablets
 - (a) Step-down care following hospital separation in patients treated with parenteral antibiotics;
 - (b) Treatment of Pseudomonal infections or resistant gram-negative infections;
 - (c) Treatment of resistant Gonococcal infections;
 - (d) Treatment of infections in persons allergic to alternative agents (eg. penicillins, cephalosporins and sulfonamides);

- RATIO-AZITHROMYCINE – comprimés, 250 mg – pour le traitement :
 - a) des malades qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais ou qui ne les tolèrent pas (p. ex. amoxicilline et érythromycine);
 - b) des malades ayant des mycobactérioses provoquées par le mycobacterium avium et le mycobacterium intracellulare;
 - c) des maladies transmises sexuellement causées par la chlamydia;
 - d) des pneumonies;
 - e) des infections exigeant des macrolides (y compris les pneumonies d'origine communautaire contractées par des personnes d'au moins 65 ans) chez les patients qui ne tolèrent pas l'érythromycine.

- RATIO-CEFUROXIME – comprimés, 250 mg et 500 mg –
 - a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital chez les malades auxquels de la céphalosporine a été administrée par voie intraveineuse;
 - b) traitement des malades ayant des infections sur lesquelles les antibiotiques de relais n'agissent pas (p. ex. amoxicilline);
 - c) traitement des infections causées par des germes résistants aux antibiotiques de relais (p. ex. amoxicilline);
 - d) traitement des malades qui ne réagissent pas ou qui sont allergiques aux antibiotiques de relais (p. ex. pénicillines et sulfonamides).

- RATIO-CIPROFLOXACIN – comprimés, 250, 500 et 750 mg –
 - a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital pour les malades auxquels des antibiotiques ont été administrés par voie parentérale;
 - b) traitement des infections pseudomonales ou des infections Gram négatif résistantes;
 - c) traitement des gonococcies résistantes;
 - d) traitement des infections chez les personnes allergiques aux agents de relais (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides);

- | | |
|--|---|
| <p>(e) Treatment of infections in immunocompromised patients;</p> <p>(f) Treatment of diabetic foot infections and complications of orthopedic surgery;</p> <p>(g) Treatment of chronic bacterial prostatitis.</p> | <p>e) traitement des infections chez les malades immunodéprimés;</p> <p>f) traitement des infections de pied diabétique et des complications résultant d'une chirurgie orthopédique;</p> <p>g) traitement d'une prostatite bactérienne chronique.</p> |
| <p>– RATIO-CLARITHROMYCIN – 250 and 500 mg Tablets – For treatment of patients:</p> <p>(a) not responding to or intolerant of alternative antibiotics (eg. amoxicillin and erythromycin);</p> <p>(b) with mycobacterial infections due to mycobacterium avium and mycobacterium intracellulare;</p> <p>(c) in combination therapy in the treatment of H. pylori;</p> <p>(d) Pneumonia;</p> <p>(e) Infections requiring a macrolide (including CAP in patients 65 and older) with documented intolerance to erythromycin.</p> | <p>– RATIO-CLARITHROMYCIN – comprimés, 250 et 500 mg – pour le traitement :</p> <p>a) des malades qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais ou qui ne les tolèrent pas (p. ex. amoxicilline et érythromycine);</p> <p>b) des malades ayant des mycobactérioses provoquées par le mycobacterium avium et le mycobacterium intracellulare;</p> <p>c) des ulcères causés par l'hélicobacter pylori chez les malades qui subissent une pharmacothérapie mixte;</p> <p>d) des pneumonies;</p> <p>e) des infections exigeant des macrolides (y compris les pneumonies d'origine communautaire contractées par des personnes d'au moins 65 ans) chez les patients qui ne tolèrent pas l'érythromycine.</p> |
| <p>– RATIO-CYCLOBENZAPRINE – 10 mg Tablets – As an adjunct to rest and physical therapy for relief of muscle spasm associated with acute, painful musculoskeletal conditions not responding to alternative therapy. Coverage will be provided for up to 126 tablets per benefit year.</p> | <p>– R A T I O - C Y C L O B E N Z A P R I N E – comprimés, 10 mg – médicament d'appoint au repos et à la physiothérapie visant à soulager les spasmes musculaires associés à des troubles musculo-squelettiques aigus et douloureux que les autres formes de thérapie ne peuvent soulager. Un maximum de 126 comprimés sont pris en charge par année d'indemnisation.</p> |
| <p>– RATIO-FENTANYL – 12, 25, 50, 75 and 100 mcg Transdermal Patch – For the treatment of pain in patients unable to tolerate oral analgesics or when there is failure to adequately control pain with oral analgesics or in patients in whom oral analgesics are deemed inappropriate.</p> | <p>– R A T I O - F E N T A N Y L – systèmes transdermiques, 12, 25, 50, 75 et 100 mcg – pour le traitement de la douleur chez les malades qui ne peuvent supporter les analgésiques administrés par voie orale ou pour lesquels ils ne sont pas recommandés ou lorsque ces derniers ne peuvent réduire suffisamment la douleur.</p> |
| <p>– RATIO-MINOCYCLINE – 50 and 100 mg Capsules –</p> <p>(a) For treatment of acne unresponsive to tetracycline or erythromycin;</p> | <p>– RATIO-MINOCYCLINE – capsules, 50 et 100 mg – pour le traitement :</p> <p>a) de l'acné sur laquelle la tétracycline et l'érythromycine n'agissent pas;</p> |

(b) For rheumatoid arthritis patients who have failed two other second line agents.

- RATIO-SUMATRIPTAN – 50 and 100 mg Tablets
– For the treatment of ACUTE migraine attacks in patients where standard therapy has failed – to a maximum of 144 tablets per benefit year.
- RELENZA – 5 mg Blister Dry Powder for oral inhalation –

(a) for the treatment of patients who show influenza-like illness and meet one or more of the following risk factors:

- (i) persons 65 years of age or older,
- (ii) persons under 65 years of age who are frail, have mobility problems or live alone,
- (iii) persons with chronic diseases (e.g. lung disease including asthma, heart disease, kidney disease, central nervous system diseases including neuromuscular diseases, endocrine system diseases including diabetes mellitus),
- (iv) persons with immune disorders or immunosuppression (e.g. cancer patients on treatment, patients with autoimmune diseases or rheumatologic diseases on TNF inhibitors or corticosteroids, transplant patients, patients with HIV infection),
- (v) children younger than 19 years of age having conditions treated with long-term acetylsalicylic acid (ASA),
- (vi) persons who are malnourished or severely obese,
- (vii) persons with other conditions (e.g. smoking, substance abuse, alcoholism, homelessness) that may increase the risk of complications from influenza or be associated with delays in seeking or receiving care for mild or severe influenza-like illness,
- (viii) persons of aboriginal ancestry,

b) des malades atteints d'arthrite rhumatismale qui ont déjà essayé sans succès deux autres médicaments de deuxième intention.

- RATIO-SUMATRIPTAN – comprimés, 50 et 100 mg – pour le traitement des migraines AIGUËS lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas. Maximum de 144 comprimés par année d'indemnisation.
- RELENZA – coque de poudre sèche pour inhalation orale, 5 mg – pour le traitement :

a) des malades qui présentent des syndromes grippaux et un ou plusieurs des facteurs de risque suivants :

- (i) ils sont âgés de 65 ans et plus,
- (ii) ils ont moins de 65 ans et ont une santé fragile, des problèmes de mobilité ou vivent seuls,
- (iii) ils ont une maladie chronique (notamment des poumons, y compris l'asthme, du cœur, des reins, du système nerveux central, y compris une maladie neuromusculaire, ou de l'appareil endocrinien, y compris le diabète sucré),
- (iv) ils ont un déficit immunitaire ou une immunosuppression (notamment un cancer faisant l'objet d'un traitement, une maladie auto-immune ou une pathologie rhumatologique traitée au moyen d'anti-FNT ou de corticostéroïdes, une greffe ou une infection au VIH),
- (v) ils ont moins de 19 ans et ont une affection faisant l'objet d'un traitement de longue durée à l'acide acétylsalicylique (AAS),
- (vi) ils souffrent de malnutrition ou sont gravement obèses,
- (vii) ils ont d'autres problèmes (notamment l'usage du tabac, l'abus des drogues, l'alcoolisme ou le sans-abrisme) qui peuvent augmenter les risques de complications de la grippe ou entraîner des délais en ce qui a trait à la demande ou à l'obtention de soins en cas de syndromes grippaux légers ou graves,
- (viii) ils sont d'ascendance autochtone,

(ix) pregnant women and women within six weeks postpartum;

(b) for preventive or chemoprophylactic purposes for persons who are severely immunocompromised and have a history of contact with a person with suspected or confirmed pandemic H1N1 virus.

NOTE: For Relenza to be effective as a treatment, it should be administered as early as possible and preferably within 48 hours of onset of illness. For chemoprophylactic use, Relenza should be used within 48 hours of exposure to pandemic H1N1 influenza.

- RITALIN – 10 and 20 mg Tablets and 20 mg Sustained Release Tablet – For treatment of attention deficit disorder and narcolepsy.
- ROCALTROL – 0.25 and 0.5 ug Capsules and 1 mcg/ml Solution – The management of hypocalcemia and osteodystrophy in patients with chronic renal failure undergoing dialysis and in the management of hypocalcemia in clinical manifestations associated with post surgical hypoparathyroidism, idiopathic hypoparathyroidism, pseudohypoparathyroidism, and Vitamin D resistant rickets.
- SAB-TOBRAMYCIN – 3 mg/mL Ophthalmic Solution – For treatment of highly suspected or proven pseudomonas ophthalmic infections.
- SAIZEN – 3.33, 5 and 8.8 mg/vial and 6, 12 and 20 mg cartridge Injections –

(a) For the long term management of children who have growth failure due to an inadequate secretion of normal endogenous growth hormone;

(b) For the treatment of children who have growth failure associated with chronic renal failure insufficiency up to the time of renal transplant;

(c) For treatment of short stature associated with Turner Syndrome in patients whose epiphyses are not closed.

(ix) elles sont enceintes ou ont accouché dans les 6 dernières semaines;

b) à des fins de prévention ou de chimioprophylaxie, des personnes qui sont gravement immunodéprimées et qui ont été en contact avec des malades qui ont ou pourraient avoir le virus de la pandémie de la grippe A(H1N1).

NOTA : Pour être efficace, le Relenza doit être administré le plus tôt possible et préférablement dans les 48 heures suivant le début de la maladie. S'il est utilisé à des fins de chimioprophylaxie, il doit l'être dans les 48 heures suivant l'exposition à la pandémie de la grippe A(H1N1).

- RITALIN – comprimés, 10 et 20 mg et comprimés à libération progressive, 20 mg – pour le traitement de la narcolepsie et des déficits de la capacité d'attention.
- ROCALTROL – capsules, 0,25 et 0,5 ug et solution, 1 mcg/ml – pour le traitement de l'hypocalcémie et de l'ostéodystrophie chez les malades souffrant d'une insuffisance rénale chronique et recourant à la dialyse et pour le traitement des malades atteints d'hypocalcémie et démontrant des symptômes cliniques liés à l'hypoparathyroïdie postopératoire, à l'hypoparathyroïdie idiopathique, à la pseudohypoparathyroïdie et au rachitisme résistant à la vitamine D.
- SAB-TOBRAMYCINE – solution ophtalmique, 3 mg/ml – pour le traitement des infections ophtalmiques pseudomonales soupçonnées ou avérées.
- SAIZEN – fiole de préparation injectable, 3,33, 5 et 8,8 mg, et cartouche de préparation injectable, 6, 12 et 20 mg –
 - a) pour le traitement à long terme des enfants ayant des troubles de croissance causés par une sécrétion insuffisante de l'hormone de croissance endogène normale;
 - b) pour le traitement des enfants ayant des troubles de croissance liés à une insuffisance rénale chronique jusqu'au moment de la transplantation rénale;
 - c) pour le traitement d'une insuffisance staturale liée au syndrome de Turner chez les malades dont les épiphyses ne sont pas fermées.

NOTE: Use the appropriate vial strength, based on the weight of the patient, in order to avoid wastage.

- SANDOZ AZITHROMYCIN – 100 mg/5 mL and 200 mg/5 mL Oral Suspension – For the treatment of patients:

(a) not responding to or intolerant of alternative antibiotics (eg. amoxicillin and erythromycin);

(b) with mycobacterial infections due to mycobacterium avium and mycobacterium intracellulare;

(c) with sexually transmitted disease due to chlamydia.

- SANDOZ AZITHROMYCIN – 250 mg Tablets – For the treatment of patients:

(a) not responding to or intolerant of alternative antibiotics (eg. amoxicillin and erythromycin);

(b) with mycobacterial infections due to mycobacterium avium and mycobacterium intracellulare;

(c) with sexually transmitted disease due to Chlamydia;

(d) Pneumonia;

(e) Infections requiring a macrolide (including CAP in patients 65 and older) with documented intolerance to erythromycin.

- SANDOZ CEFPROZIL – 125 mg/5 mL and 250 mg/5 mL Powder for Suspension and 250 and 500 mg Tablets –

(a) step-down care following hospital separation in patients treated with intravenous cephalosporins;

(b) treatment of patients with infections not responding to alternative antibiotics (eg. amoxicillin);

(c) treatment of infections caused by organisms known to be resistant to alternative antibiotics (eg. amoxicillin);

NOTA : Il faut choisir l'ampoule dont la quantité convient au poids du malade afin d'éviter le gaspillage.

- SANDOZ AZITHROMYCINE – 100 mg/5 mL et 200 mg/5 mL, suspension orale – pour le traitement :

a) des malades qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais ou qui ne les tolèrent pas (p. ex. amoxicilline et érythromycine);

b) des malades ayant des mycobactérioses provoquées par le mycobacterium avium et le mycobacterium intracellulare;

c) des maladies transmises sexuellement causées par la chlamydia.

- SANDOZ AZITHROMYCINE – comprimés, 250 mg – pour le traitement :

a) des malades qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais ou qui ne les tolèrent pas (p. ex. amoxicilline et érythromycine);

b) des malades ayant des mycobactérioses provoquées par le mycobacterium avium et le mycobacterium intracellulare;

c) des maladies transmises sexuellement causées par la chlamydia;

d) des pneumonies;

e) des infections exigeant des macrolides (y compris les pneumonies d'origine communautaire contractées par des personnes d'au moins 65 ans) chez les patients qui ne tolèrent pas l'érythromycine.

- SANDOZ CEFPROZIL – poudre pour suspension, 125 mg/5 mL et 250 mg/5 mL et comprimés 250 et 500 mg –

a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital chez les malades auxquels de la céphalosporine a été administrée par voie intraveineuse;

b) traitement des malades ayant des infections sur lesquelles les antibiotiques de relais n'agissent pas (p. ex. amoxicilline);

c) traitement des infections causées par des germes résistants aux antibiotiques de relais (p. ex. amoxicilline);

- (d) treatment of patients known to be allergic or unresponsive to alternative antibiotics (eg. penicillin or sulfonamides).
- SANDOZ CIPROFLOXACIN – 0.3% Ophthalmic Solution – For the treatment of ophthalmic infections caused by gram-negative organisms or those not responding to alternative agents.
- SANDOZ CIPROFLOXACIN – 250, 500 and 750 mg Tablets –
- (a) Step-down care following hospital separation in patients treated with parenteral antibiotics;
- (b) Treatment of Pseudomonal infections or resistant gram-negative infections;
- (c) Treatment of resistant Gonococcal infections;
- (d) Treatment of infections in persons allergic to alternative agents (eg. penicillins, cephalosporins and sulfonamides);
- (e) Treatment of infections in immunocompromised patients;
- (f) Treatment of diabetic foot infections and complications of orthopedic surgery;
- (g) Treatment of chronic bacterial prostatitis.
- SANDOZ CLARITHROMYCIN – 250 and 500 mg Tablets – For treatment of patients:
- (a) not responding to or intolerant of alternative antibiotics (eg. amoxicillin and erythromycin);
- (b) with mycobacterial infections due to mycobacterium avium and mycobacterium intracellulare;
- (c) in combination therapy in the treatment of H. pylori;
- (d) Pneumonia;
- d) traitement des malades qui ne réagissent pas ou qui sont allergiques aux antibiotiques de relais (p. ex. pénicillines et sulfonamides).
- SANDOZ CIPROFLOXACIN – solution ophtalmique, 0,3 % – pour le traitement des infections ophtalmiques causées par des germes Gram négatif ou des organismes sur lesquels les agents de relais n'agissent pas.
- SANDOZ CIPROFLOXACIN – comprimés, 250, 500 et 750 mg –
- a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital pour les malades auxquels des antibiotiques ont été administrés par voie parentérale;
- b) traitement des infections pseudomonales ou des infections Gram négatif résistantes;
- c) traitement des gonococcies résistantes;
- d) traitement des infections chez les personnes allergiques aux agents de relais (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides);
- e) traitement des infections chez les malades immunodéprimés;
- f) traitement des infections de pied diabétique et des complications résultant d'une chirurgie orthopédique;
- g) traitement d'une prostatite bactérienne chronique.
- SANDOZ CLARITHROMYCIN – comprimés, 250 et 500 mg – pour le traitement :
- a) des malades qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais ou qui ne les tolèrent pas (p. ex. amoxicilline et érythromycine);
- b) des malades ayant des mycobactérioses provoquées par le mycobacterium avium et le mycobacterium intracellulare;
- c) des ulcères causés par l'hélicobacter pylori chez les malades qui subissent une pharmacothérapie mixte;
- d) des pneumonies;

- (e) Infections requiring a macrolide (including CAP in patients 65 and older) with documented intolerance to erythromycin.
- SANDOZ ESTRADIOL DERM – 50, 75 and 100 mcg Transdermal Patch – For patients:
- (a) who are smokers (current);
- (b) with increased triglycerides;
- (c) with a history of cholelithiasis; or
- (d) who cannot tolerate oral estrogens due to intolerable side effects (eg. GI upset, irregular bleeding, etc.) or who cannot take any medications by mouth.
- Patients should have tried at least two different oral estrogen products (eg. Premarin, Estrace, Ogen).
- SANDOZ FENTANYL – 12, 25, 50, 75 and 100 mcg Patches – For the treatment of pain in patients unable to tolerate analgesics or when there is failure to adequately control pain with oral analgesics or in patients for whom oral analgesics are deemed inappropriate.
- SANDOZ FINASTERIDE – 5 mg Tablets – For the treatment of symptomatic benign prostatic hyperplasia.
- SANDOZ LEVOFLOXACIN – 250 and 500 mg Tablets –
- (a) Step-down care following hospital separation in patients treated with parenteral antibiotics;
- (b) Treatment of gram-negative infections resistant to standard therapy;
- (c) Treatment of infections in persons allergic to alternative agents (eg. penicillins, cephalosporins and sulfonamides);
- (d) Treatment of bacterial prostatitis;
- e) des infections exigeant des macrolides (y compris les pneumonies d'origine communautaire contractées par des personnes d'au moins 65 ans) chez les patients qui ne tolèrent pas l'érythromycine.
- SANDOZ ESTRADIOL DERM – timbre transdermique, 50, 75 et 100 mcg – pour les malades :
- a) qui sont fumeuses;
- b) ayant une augmentation du nombre de triglycérides;
- c) ayant des antécédents de lithiase biliaire;
- d) qui ne peuvent prendre d'œstrogènes administrés oralement en raison d'effets secondaires intolérables (p. ex. : troubles gastro-intestinaux, saignements irréguliers, etc.) ou qui ne peuvent prendre de médicaments par voie orale; les malades devraient avoir essayé de prendre par voie orale au moins deux médicaments œstrogènes différents (p. ex. : Premarin, Estrace ou Ogen).
- SANDOZ FENTANYL – timbres, 12, 25, 50, 75 et 100 mcg – pour le traitement de la douleur chez les malades qui ne peuvent supporter les analgésiques ou pour lesquels les analgésiques par voie orale ne sont pas recommandés ou lorsque ces derniers ne peuvent réduire suffisamment la douleur.
- SANDOZ FINASTERIDE – comprimés, 5 mg – pour le traitement de l'hyperplasie bénigne symptomatique.
- SANDOZ LEVOFLOXACIN – comprimés, 250 et 500 mg –
- a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital pour les malades auxquels des antibiotiques ont été administrés par voie parentérale;
- b) traitement des infections Gram négatif résistantes aux médicaments ordinaires;
- c) traitement des infections chez les personnes allergiques aux agents de relais (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides);
- d) traitement d'une prostatite bactérienne;

- | | |
|--|---|
| <p>(e) Treatment of respiratory infections in patients failing or likely to fail or intolerant of penicillins, cephalosporins and/or macrolides;</p> <p>(f) Treatment of diabetic foot infections;</p> <p>(g) Community acquired pneumonia with co-morbid illness or failure of first-line therapy;</p> <p>(h) Pneumonia in long-term care patients.</p> | <p>e) traitement des infections respiratoires chez les malades qui ne réagissent pas, sont susceptibles de ne pas réagir ou sont intolérants aux pénicillines, aux céphalosporines ou aux macrolides;</p> <p>f) traitement des infections de pied diabétique;</p> <p>g) traitement des pneumonies d'origine communautaire chez les patients ayant une maladie concomitante ou qui ne réagissent pas au traitement de première ligne;</p> <p>h) traitement des pneumonies chez les patients qui reçoivent des soins de longue durée.</p> |
| <p>– SANDOZ METHYLPHENIDATE SR – 20 mg Tablets – For the treatment of attention deficit disorder and narcolepsy.</p> | <p>– SANDOZ METHYLPHENIDATE SR – comprimés, 20 mg – pour le traitement de la narcolepsie et des déficits de la capacité d'attention.</p> |
| <p>– SANDOZ MINOCYCLINE – 50 and 100 mg Capsules –</p> <p>(a) For treatment of acne unresponsive to tetracycline or erythromycin;</p> <p>(b) For rheumatoid arthritis patients who have failed two other second line agents.</p> | <p>– SANDOZ MINOCYCLINE – capsules, 50 et 100 mg – pour le traitement :</p> <p>a) de l'acné sur laquelle la tétracycline et l'érythromycine n'agissent pas;</p> <p>b) des malades atteints d'arthrite rhumatoïdale qui ont déjà essayé sans succès deux autres médicaments de deuxième intention.</p> |
| <p>– SANDOZ MONTELUKAST – 4 mg Granules –</p> <p>(a) Indicated as adjunctive therapy for asthma in cases where:</p> <p>(i) Maximum doses of inhaled corticosteroids have not effectively controlled symptoms, or</p> <p>(ii) Evidence of serious adverse effects associated with corticosteroids exists. eg. adrenal suppression, increased lung infections;</p> <p>(b) Indicated as first line therapy for exercise induced asthma.</p> | <p>– SANDOZ MONTELUKAST – granules, 4 mg –</p> <p>a) traitement d'appoint pour l'asthme dans les cas suivants :</p> <p>(i) les doses maximales de corticostéroïdes administrées par inhalation n'ont pas contrôlé les symptômes de façon efficace;</p> <p>(ii) des réactions indésirables à l'utilisation de corticostéroïdes sont à craindre, p. ex. suppression surrénale, infection aggravée des poumons.</p> <p>b) thérapie du premier degré pour l'asthme induit par l'exercice.</p> |
| <p>– SANDOZ MONTELUKAST – 4, 5 and 10 mg Tablets –</p> <p>(a) Indicated as adjunctive therapy for asthma in cases where:</p> <p>(i) maximum doses of inhaled corticosteroids have not effectively controlled symptoms, or</p> | <p>– SANDOZ MONTELUKAST – comprimés, 4, 5 et 10 mg –</p> <p>a) traitement d'appoint pour l'asthme dans les cas suivants :</p> <p>(i) les doses maximales de corticostéroïdes administrées par inhalation n'ont pas contrôlé les symptômes de façon efficace,</p> |

- (ii) evidence of serious adverse effects associated with corticosteroids exists, eg. adrenal suppression, increased lung infections;
- (b) Indicated as first line therapy for exercise induced asthma.
- SANDOZ NARATRIPTAN – 2.5 mg Tablets – For the treatment of ACUTE migraine attacks in patients where standard therapy has failed – to a maximum of 144 tablets per benefit year.
- SANDOZ OFLOXACIN – 0.3% Ophthalmic Solution – For the treatment of ophthalmic infections caused by gram-negative organisms or those not responding to alternative agents.
- SANDOZ PRAMIPEXOLE – 0.25, 0.5, 1 and 1.5 mg Tablets – For treatment of idiopathic Parkinson's Disease.
- SANDOZ RIZATRIPTAN ODT – 5 and 10 mg Tablets – For the treatment of ACUTE migraine attacks in patients where standard therapy has failed – to a maximum of 144 tablets per benefit year.
- SANDOZ SUMATRIPTAN – 50 and 100 mg Tablets – For the treatment of ACUTE migraine attacks in patients where standard therapy has failed – to a maximum of 144 tablets per benefit year.
- SANDOZ TICLOPIDINE – 250 mg Tablets – Sandoz Ticlopidine will be reimbursed for patients:
 - (a) For the secondary prevention of vascular ischemic events ie. myocardial infarction, or stroke in patients
 - (i) who are known to be or become intolerant to ASA, or
 - (ii) who continue to have TIA or stroke symptoms or myocardial infarction while being treated with ASA or clopidogrel;

- (ii) des réactions indésirables à l'utilisation de corticostéroïdes sont à craindre, p. ex. suppression surrénale, infection aggravée des poumons;
- b) thérapie du premier degré pour l'asthme induit par l'exercice.
- SANDOZ NARATRIPTAN – comprimés, 2,5 mg – pour le traitement des migraines AIGÜES lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas. Maximum de 144 comprimés par année d'indemnisation.
- SANDOZ OFLOXACIN – solution ophtalmique, 0,3 % – pour le traitement des infections ophtalmiques causées par des germes Gram négatif ou des organismes sur lesquels les agents de relais n'agissent pas.
- SANDOZ PRAMIPEXOLE – comprimés, 0,25, 0,5, 1 et 1,5 mg – pour le traitement de la maladie de Parkinson idiopathique.
- SANDOZ RIZATRIPTAN ODT – comprimés, 5 et 10 mg – pour le traitement des migraines AIGÜES lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas. Maximum de 144 comprimés par année d'indemnisation.
- SANDOZ SUMATRIPTAN – comprimés, 50 et 100 mg – pour le traitement des migraines AIGÜES lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas. Maximum de 144 comprimés par année d'indemnisation.
- SANDOZ TICLOPIDINE – comprimés, 250 mg – un remboursement est accordé aux malades :
 - a) pour la prévention secondaire de pénombres ischémiques vasculaires, c.-à-d., infarctus du myocarde ou accident cérébrovasculaire :
 - (i) chez les malades qui sont ou deviennent intolérants à l'AAS,
 - (ii) chez les malades qui continuent à avoir des accidents ischémiques transitoires ou des infarctus du myocarde pendant qu'ils suivent un traitement à l'AAS ou au clopidogrel;

NOTE: ASA should be first line for the secondary prevention of vascular ischemic events such as myocardial infarction or stroke. Before abandoning ASA, efforts should be made to improve tolerability of ASA by reducing the dose, taking it with food and using enteric coated ASA.

(b) Post coronary stent implantation x 28 days in combination with ASA.

- SANDOZ ZOLMITRIPTAN, SANDOZ ZOLMITRIPTAN ODT – 2.5 mg Tablets – For the treatment of ACUTE migraine attacks in patients where standard therapy has failed – to a maximum of 144 tablets per benefit year.

- SEPTA-CIPROFLOXACIN – 250, 500 and 750 mg Tablets –

(a) Step-down care following hospital separation in patients treated with parenteral antibiotics;

(b) Treatment of pseudomonal infections or resistant gram-negative infections;

(c) Treatment of resistant gonococcal infections;

(d) Treatment of infections in persons allergic to alternative agents (eg. penicillins, cephalosporins and sulfonamides).

- SINGULAIR – 4 and 5 mg Chewable Tablets, 10 mg Film Coated Tablets and 4 mg Oral Granules

(a) Indicated as adjunctive therapy for asthma in cases where:

(i) maximum doses of inhaled corticosteroids have not effectively controlled symptoms, or

(ii) evidence of serious adverse effects associated with corticosteroids exists, eg. adrenal suppression, increased lung infections;

(b) Indicated as first line therapy for exercise induced asthma.

NOTA : L'AAS est le médicament du premier degré à administrer pour la prévention secondaire de pénombres ischémiques vasculaires tels qu'un infarctus du myocarde ou un accident cérébrovasculaire. Avant d'abandonner le traitement à l'AAS, il faut s'efforcer d'améliorer la tolérance du malade à l'AAS en réduisant la dose, en le faisant prendre avec de la nourriture et en l'administrant sous forme de comprimé à enrobage entérosoluble.

b) après l'implantation d'un stent coronarien, pendant 28 jours avec de l'AAS.

- SANDOZ ZOLMITRIPTAN, SANDOZ ZOLMITRIPTAN ODT – comprimés, 2,5 mg – pour le traitement des migraines AIGUËS lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas. Maximum de 144 comprimés par année d'indemnisation.

- SEPTA-CIPROFLOXACIN – comprimés, 250, 500 et 750 mg –

a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital pour les malades auxquels des antibiotiques ont été administrés par voie parentérale;

b) traitement des infections pseudomonales ou des infections Gram négatif résistantes;

c) traitement des gonococcies résistantes;

d) traitement des infections chez les personnes allergiques aux agents de relais (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides).

- SINGULAIR – comprimés masticables, 4 et 5 mg, comprimés enrobés d'une pellicule, 10 mg et granules orales, 4 mg

a) traitement d'appoint pour l'asthme dans les cas suivants :

(i) les doses maximales de corticostéroïdes administrées par inhalation n'ont pas contrôlé les symptômes de façon efficace;

(ii) des réactions indésirables à l'utilisation de corticostéroïdes sont à craindre, p. ex. suppression surrénale, infection aggravée des poumons.

b) thérapie du premier degré pour l'asthme induit par l'exercice.

- SPORANOX – 100 mg Capsules and 10 mg/mL Oral Solution – For the prophylaxis and treatment of
 - (a) onychomycosis, oropharyngeal and esophageal candidiasis in immunocompromised patients; and
 - (b) systemic fungal infections other than oropharyngeal candidiasis.
- SUMATRIPTAN (SANIS) – 50 and 100 mg Tablets – For the treatment of acute migraine attacks in patients where standard therapy has failed – to a maximum of 144 tablets per benefit year.
- SUPRAX – 20 mg/mL Suspension and 200 and 400 mg Tablets –
 - (a) Step-down care following hospital separation in patients treated with intravenous cephalosporins;
 - (b) Treatment of patients with infections not responding to alternative antibiotics (eg. amoxicillin);
 - (c) Treatment of infections caused by organisms known to be resistant to alternative antibiotics (eg. amoxicillin);
 - (d) Treatment of patients known to be allergic or unresponsive to alternative antibiotics (eg. penicillin or sulfonamides).
- SUPREFACT – 1 mg/mL subcutaneous and intranasal and 6.3 and 9.45 mg Depot – For the treatment of gynecological disorders excepting fertility disorders.
- SYNAREL – 2 mg/mL Nasal Spray – For hormonal management of endometriosis.
- TAMIFLU – 30, 45 and 75 mg Capsules and 6 mg/mL Oral Suspension – For the treatment OR prevention of Influenza in persons who meet one or more of the following risk factors:
 - (a) asthma or other chronic pulmonary disease, including bronchopulmonary dysplasia, cystic fibrosis, chronic bronchitis and emphysema;
- SPORANOX – capsules, 100 mg et solution orale, 10 mg/ml – en guise de traitement prophylactique et pour le traitement :
 - a) des onychomycoses, des candidoses oropharyngées et oesophagiennes chez les malades immunodéprimés;
 - b) des infections fongiques systémiques autre que la candidose oropharyngée.
- SUMATRIPTAN (SANIS) – comprimés, 50 et 100 mg – pour le traitement des migraines AIGUËS lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas. Maximum de 144 comprimés par année d'indemnisation.
- SUPRAX – suspension, 20 mg/ml et comprimés, 200 et 400 mg –
 - a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital chez les malades qui ont reçu de la céphalosporine par voie intraveineuse;
 - b) traitement des malades ayant des infections sur lesquelles les antibiotiques de relais n'agissent pas (p. ex. amoxicilline);
 - c) traitement des infections causées par des germes résistants aux antibiotiques de relais (p. ex. amoxicilline);
 - d) traitement des malades qui ne réagissent pas ou qui sont allergiques aux antibiotiques de relais (p. ex. pénicillines et sulfonamides).
- SUPREFACT – sous-cutané et intranasal, 1 mg/ml et dépôt, 6,3 et 9,45 mg – pour le traitement des affections gynécologiques, à l'exception des troubles de fécondité.
- SYNAREL – vaporisateur nasal, 2 mg/ml – pour le traitement hormonal de l'endométriose.
- TAMIFLU – capsules, 30, 45 et 75 mg et suspension orale, 6 mg/mL – pour le traitement ou la prévention de la grippe chez les personnes qui présentent un ou plusieurs des facteurs de risque suivants :
 - a) asthme ou autre maladie pulmonaire chronique, notamment la dysplasie broncho-pulmonaire, la fibrose kystique, la bronchite chronique et l'emphysème;

(b) cardiovascular disease (excluding isolated hypertension), including congenital and acquired heart disease such as congestive heart failure, and symptomatic coronary artery disease;

(c) malignancy;

(d) chronic renal insufficiency;

(e) chronic liver disease;

(f) diabetes mellitus or other metabolic diseases;

(g) hemoglobinopathies such as sickle cell disease;

(h) immunosuppression or immunodeficiency due to disease (eg. HIV infection, or iatrogenic due to medication);

(i) rheumatologic diseases, including rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, psoriatic arthritis, antiphospholipid syndrome, scleroderma, spondyloarthropathies, Sjorgen's syndrome, dermatomyositis, vasculitis, sarcoidosis and polyarteritis nodosa;

(j) neurological disease or neurodevelopmental disorders that compromise handling of respiratory secretions (eg. cognitive dysfunction, spinal cord injury, seizure disorders, neuromuscular disorders, cerebral palsy, metabolic disorders);

(k) children younger than 2 years of age;

(l) individuals 65 years of age or older;

(m) individuals of any age who are residents of nursing homes or other chronic care facilities;

(n) pregnant women and women up to 2 weeks post partum regardless of how the pregnancy ended;

(o) individuals younger than 18 years of age who are on chronic aspirin therapy;

b) maladie cardiovasculaire (à l'exclusion de l'hypertension isolée), y compris les maladies cardiaques congénitales et acquises telles que l'insuffisance cardiaque congestive et la coronaropathie symptomatique;

c) malignité;

d) insuffisance rénale chronique;

e) maladie chronique du foie;

f) diabète sucré ou autre maladie métabolique;

g) hémoglobinopathie, notamment la drépanocytose;

h) immunosuppression ou immunodéficience causée par une maladie (notamment infection à VIH et affection iatrogène);

i) pathologies rhumatologiques, notamment la polyarthrite rhumatoïde, le lupus érythémateux disséminé, la polyarthrite psoriasique, le syndrome antiphospholipide, la sclérodermie, la spondylarthropathie, le syndrome de Sjögren, la dermatomyosite, la vascularite, la sarcoidose et la polyartérite noueuse;

j) affection neurologique ou troubles neurologiques du développement qui compromettent l'évacuation des sécrétions respiratoires (notamment un dysfonctionnement cognitif, un traumatisme médullaire, des troubles convulsifs, des maladies neuromusculaires, une infirmité motrice cérébrale et un trouble métabolique);

k) âge — enfants de moins de 2 ans;

l) âge — personnes de 65 ans ou plus;

m) lieu de résidence — personnes qui demeurent dans une unité de soins de longue durée, notamment une maison de soins infirmiers, quel que soit leur âge;

n) grossesse et période de 2 semaines suivant l'accouchement, quelle que soit l'issue de la grossesse;

o) thérapeutique d'aspirine à long terme — personnes de moins de 18 ans;

- (p) morbid obesity (BMI 40 or greater);
- (q) persons of aboriginal ancestry, including Indian, Inuit or Metis ancestry.
- TARO-CIPROFLOXACIN – 250 and 500 mg Tablets –
- (a) Step-down care following hospital separation in patients treated with parenteral antibiotics;
- (b) treatment of pseudomonal infections or resistant gram-negative infections;
- (c) treatment of resistant Gonococcal infections;
- (d) treatment of infections in persons allergic to alternative agents (eg. penicillins, cephalosporins and sulfonamides);
- (e) treatment of infections in immunocompromised patients;
- (f) treatment of diabetic foot infections and complications or orthopedic surgery.
- TARO-FLUCONAZOLE – 50 and 100 mg Tablets – For the prophylaxis and treatment of:
- (a) oropharyngeal and esophageal candidiasis in immunocompromised patients; and
- (b) systemic fungal infections other than oropharyngeal candidiasis.
- TEVA-CLARITHROMYCIN – 250 and 500 mg Tablets – For the treatment of patients:
- (a) not responding to or intolerant of alternative antibiotics (eg. amoxicillin and erythromycin);
- (b) with mycobacterial infections due to mycobacterium avium and mycobacterium intracellulare;
- (c) in combination therapy in the treatment of H. Pylori;
- (d) with pneumonia;
- p) obésité morbide (IMC de 40 ou plus);
- q) ascendance autochtone, notamment amérindienne, inuite et métisse.
- TARO-CIPROFLOXACIN – comprimés, 250 et 500 mg –
- a) deuxième étape de soins à la sortie de l'hôpital pour les malades auxquels des antibiotiques ont été administrés par voie parentérale;
- b) traitement des infections pseudomonales ou des infections Gram négatif résistantes;
- c) traitement des gonococcies résistantes;
- d) traitement des infections chez les personnes allergiques aux agents de relais (p. ex. pénicillines, céphalosporines et sulfonamides);
- e) traitement des infections chez les malades immunodéprimés;
- f) traitement des infections de pied diabétique et des complications résultant d'une chirurgie orthopédique.
- TARO-FLUCONAZOLE – comprimés, 50 et 100 mg – en guise de traitement prophylactique et pour le traitement :
- a) des candidoses oropharyngées et oesophagiennes chez les malades immunodéprimés;
- b) des infections fongiques systémiques autres que la candidose oropharyngée.
- TEVA-CLARITHROMYCIN – comprimés, 250 et 500 mg – pour le traitement :
- a) des malades qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais ou qui ne les tolèrent pas (p. ex. amoxicilline et érythromycine);
- b) des malades ayant des mycobactérioses provoquées par le mycobacterium avium et le mycobacterium intracellulare;
- c) des ulcères causés par l'hélicobacter pylori chez les malades qui subissent une pharmacothérapie mixte;
- d) des pneumonies;

- (e) with infections requiring a macrolide (including CAP in patients 65 and older) with documented intolerance to erythromycin.
- e) des infections exigeant des macrolides (y compris les pneumonies d'origine communautaire contractées par des personnes d'au moins 65 ans) chez les patients qui ne tolèrent pas l'érythromycine.
- TEVA-MONTELUKAST – 4, 5 and 10 mg Tablets –
- TEVA-MONTELUKAST – comprimés, 4, 5 et 10 mg –
- (a) Indicated as adjunctive therapy for asthma in cases where:
- a) traitement d'appoint pour l'asthme dans les cas suivants :
- (i) Maximum doses of inhaled corticosteroids have not effectively controlled symptoms, or
- (i) les doses maximales de corticostéroïdes administrées par inhalation n'ont pas contrôlé les symptômes de façon efficace;
- (ii) Evidence of serious adverse effects associated with corticosteroids exists. eg. adrenal suppression, increased lung infections;
- (ii) des réactions indésirables à l'utilisation de corticostéroïdes sont à craindre, p. ex. suppression surrénale, infection aggravée des poumons.
- (b) Indicated as first line therapy for exercise induced asthma.
- b) thérapie du premier degré pour l'asthme induit par l'exercice.
- TEVA-PRAMIPEXOLE – 0.25, 0.5, 1 AND 1.5 MG TABLETS – For treatment of idiopathic Parkinson's Disease.
- TEVA-PRAMIPEXOLE – 0,25, 0,5, 1 ET 1,5 MG, COMPRIMÉS – pour le traitement de la maladie de Parkinson idiopathique.
- TEVA-ZOLMITRIPTAN – 2.5 mg Tablets – For the treatment of ACUTE migraine attacks in patients where standard therapy has failed – to a maximum of 144 tablets per benefit year.
- TEVA-ZOLMITRIPTAN – comprimés, 2,5 mg – pour le traitement des migraines AIGUËS lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas. Maximum de 144 comprimés par année d'indemnisation.
- TEVA-ZOLMITRIPTAN OD – 2.5 mg Orally Disintegrating Tablets – For the treatment of ACUTE migraine attacks in patients where standard therapy has failed – to a maximum of 144 tablets per benefit year.
- TEVA-ZOLMITRIPTAN OD – comprimés à dissolution orale, 2,5 mg – pour le traitement des migraines AIGUËS lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas. Maximum de 144 comprimés par année d'indemnisation.
- TICLID – 250 mg Tablets – Ticlid will be re-imbursed for patients:
- TICLID – comprimés, 250 mg – un remboursement est accordé au malade :
- (a) For the secondary prevention of vascular ischemic events ie. myocardial infarction, or stroke
- a) pour la prévention secondaire de pénombres ischémiques vasculaires, c.-à-d., infarctus du myocarde ou accident cérébrovasculaire :
- (i) who are known to be or become intolerant to ASA, or
- (i) chez les malades qui sont ou deviennent intolérants à l'AAS,
- (ii) who continue to have TIA or stroke symptoms or myocardial infarction while being treated with ASA or clopidogrel.
- (ii) chez les malades qui continuent à avoir des accident ischémique transitoires ou des infarctus du myocarde pendant qu'ils suivent un traitement à l'AAS ou au clopidogrel;

NOTE: ASA should be first line for the secondary prevention of vascular ischemic events such as myocardial infarction or stroke. Before abandoning ASA, efforts should be made to improve tolerability of ASA by reducing the dose, taking it with food and using enteric coated ASA.

(b) Post coronary stent implantation x 28 days in combination with ASA.

- TICLOPIDINE (SANIS) – 250 mg Tablets – Ticlopidine will be reimbursed for patients:

(a) for the secondary prevention of vascular ischemic events ie. myocardial infarction, or stroke in patients

- (i) who are known to be or become intolerant to ASA, or
- (ii) who continue to have TIA or stroke symptoms or myocardial infarction while being treated with ASA or clopidogrel;

NOTE: ASA should be first line for the secondary prevention of vascular ischemic events such as myocardial infarction or stroke. Before abandoning ASA, efforts should be made to improve tolerability of ASA by reducing the dose, taking it with food and using enteric coated ASA.

(b) post coronary stent implantation x 28 days in combination with ASA.

- TOBRADEX – 0.3%/0.1% Ophthalmic Suspension and Ointment – For treatment of ophthalmic infections not responding to therapeutic alternatives.
- TOBREX – 3 mg/mL Ophthalmic Solution and 3mg/gm ophthalmic ointment – For treatment of highly suspected or proven pseudomonas ophthalmic infections.
- VANCOCIN – 125 and 250 mg Capsules – For treatment of pseudomembranous colitis unresponsive to metronidazole.

NOTA : L'AAS est le médicament du premier degré à administrer pour la prévention secondaire de pénombres ischémiques vasculaires tels qu'un infarctus du myocarde ou un accident cérébrovasculaire. Avant d'abandonner le traitement à l'AAS, il faut s'efforcer d'améliorer la tolérance du malade à l'AAS en réduisant la dose, en le faisant prendre avec de la nourriture et en l'administrant sous forme de comprimé à enrobage entérosoluble.

b) après l'implantation d'un stent coronarien, pendant 28 jours avec de l'AAS.

- TICLOPIDINE (SANIS) – comprimés, 250 mg – un remboursement est accordé au malade :

a) pour la prévention secondaire de pénombres ischémiques vasculaires, c.-à-d., infarctus du myocarde ou accident cérébrovasculaire :

- (i) chez les malades qui sont ou deviennent intolérants à l'AAS,
- (ii) chez les malades qui continuent à avoir des accident ischémique transitoires ou des infarctus du myocarde pendant qu'ils suivent un traitement à l'AAS ou au clopidogrel;

NOTA : L'AAS est le médicament du premier degré à administrer pour la prévention secondaire de pénombres ischémiques vasculaires tels qu'un infarctus du myocarde ou un accident cérébrovasculaire. Avant d'abandonner le traitement à l'AAS, il faut s'efforcer d'améliorer la tolérance du malade à l'AAS en réduisant la dose, en le faisant prendre avec de la nourriture et en l'administrant sous forme de comprimé à enrobage entérosoluble.

b) après l'implantation d'un stent coronarien, pendant 28 jours avec de l'AAS.

- TOBRADEX – suspension ophtalmique et pommade, 0,3 %/0,1 % – pour le traitement des infections ophtalmiques sur lesquelles les autres moyens thérapeutiques n'ont aucun effet.
- TOBREX – solution ophtalmique, 3 mg/ml, et pommade ophtalmique, 3 mg/gm – pour le traitement des infections ophtalmiques pseudomonas soupçonnées ou avérées.
- VANCOCIN – capsules, 125 et 250 mg – pour le traitement d'une colite pseudo-membraneuse sur laquelle le métronidazole n'agit pas.

- VANCOMYCIN HCL (PHARMACEUTICAL PARTNERS OF CANADA) – 125 and 250 mg Capsules – For the treatment of pseudomembranous colitis unresponsive to metronidazole.
- ZADITEN – 1 mg Tablets – For treatment of pediatric patients with asthma who are unresponsive to or unable to administer alternative prophylactic agents listed in the Formulary.
- ZITHROMAX – 250 mg Tablets – For treatment of patients:
 - (a) Not responding to or intolerant of alternative antibiotics (eg. amoxicillin and erythromycin);
 - (b) With mycobacterial infections due to mycobacterium avium and mycobacterium intracellulare;
 - (c) With sexually transmitted diseases due to Chlamydia;
 - (d) Pneumonia;
 - (e) Infections requiring a macrolide (including CAP in patients 65 and older) with documented intolerance to erythromycin.
- ZITHROMAX – 600 mg Tablets – For the treatment of patients with mycobacterial infections due to mycobacterium avium and mycobacterium intracellulare.
- ZITHROMAX POS – 20 and 40 mg/mL – for the treatment of otitis media in patients not responding to or intolerant of alternative antibiotics (e.g. amoxicillin and erythromycin).
- ZOLADEX – 10.8 mg Depot – For the treatment of gynecological disorders excepting fertility disorders.
- ZOLADEX – 3.6 mg Injection – For the treatment of:
 - (a) gynecological disorders excepting fertility disorders;
- VANCOMYCINE HCL (PHARMACEUTICAL PARTNERS OF CANADA) – capsules, 125 et 250 mg – pour le traitement d'une colite pseudo-membraneuse sur laquelle le métronidazole n'agit pas.
- ZADITEN – comprimés, 1 mg – pour le traitement de l'asthme chez les enfants qui ne réagissent pas aux autres agents de prophylaxie énumérés dans la *Liste de médicaments* ou qui sont incapables de les prendre.
- ZITHROMAX – comprimés, 250 mg – pour le traitement des malades :
 - a) qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais (p. ex. amoxicilline et érythromycine) ou qui manifestent de l'intolérance à leur égard;
 - b) ayant des mycobactérioses provoquées par le mycobacterium avium et le mycobacterium intracellulare;
 - c) ayant des maladies transmises sexuellement et causées par la Chlamydia) ayant des pneumonies;
 - d) ayant des pneumonies;
 - e) ayant des infections exigeant des macrolides (y compris les pneumonies d'origine communautaire contractées par des personnes d'au moins 65 ans) s'ils ne tolèrent pas l'érythromycine.
- ZITHROMAX – comprimés, 600 mg – pour le traitement des malades ayant des mycobactérioses provoquées par le mycobacterium avium et le mycobacterium intracellulare.
- ZITHROMAX POS – 20 et 40 mg/mL – pour le traitement de l'otite moyenne chez les malades qui ne réagissent pas aux antibiotiques de relais ou qui ne les tolèrent pas (p.ex. amoxicilline et érythromycine).
- ZOLADEX – dépôt, 10,8 mg – pour le traitement des affections gynécologiques, à l'exception des troubles de fécondité.
- ZOLADEX – injection, 3,6 mg –
 - a) pour le traitement des affections gynécologiques, à l'exception des troubles de fécondité;

(b) for the palliative treatment of advanced breast cancer in pre- and perimenopausal women whose tumor contains estrogen and/or progesterone receptors.

- ZOMIG – 5 mg Nasal spray – For treatment of ACUTE migraine attacks in patients where standard therapy has failed – to a maximum of 144 sprays per benefit year.
- ZOMIG, ZOMIG RAPIMELT – 2.5 mg Tablets – For treatment of ACUTE migraine attacks in patients where standard therapy has failed – to a maximum of 144 tablets per benefit year.

b) pour le traitement palliatif d'un cancer avancé du sein chez les patientes préménopausiques et péréménopausiques dont la tumeur renferme des récepteurs œstrogéniques et progestéroniques.

- ZOMIG – vaporisateur nasal, 5 mg – pour le traitement des migraines AIGUËS lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas. Maximum de 144 vaporisateurs par année d'indemnisation.
- ZOMIG, ZOMIG RAPIMELT – comprimés, 2,5 mg – pour le traitement des migraines AIGUËS lorsque les médicaments ordinaires n'agissent pas. Maximum de 144 comprimés par année d'indemnisation.

PART 3

A drug or other item not listed in Part 1, or a specified drug listed in Part 2 for use in a different condition, may be considered for eligibility if

(a) it is ordinarily administered only to hospital in-patients and is being administered outside of a hospital;

(b) it is not ordinarily prescribed or administered in Manitoba but is being prescribed because it is required in the treatment of a patient having an illness, disability or condition rarely found in Manitoba; or

(c) evidence, including therapeutic and economic evidence, provided to the minister in accordance with the criteria established by him or her, supports a specific treatment regime which includes use of the drug or other item;

and, if approved, is eligible from the date of application.

M.R. 109/95; 188/95; 61/96; 119/96; 243/96; 129/97; 161/97; 14/98; 67/98; 92/98; 178/98; 207/98; 46/99; 84/99; 106/99; 127/99; 157/99; 163/99; 172/99; 14/2000; 46/2000; 87/2000; 89/2000; 116/2000; 155/2000; 163/2000; 14/2001; 36/2001; 82/2001; 118/2001; 123/2001; 137/2001; 5/2002; 19/2002; 52/2002; 96/2002; 187/2002; 80/2003; 136/2003; 216/2003; 12/2004; 50/2004; 72/2004; 73/2004; 100/2004; 138/2004; 155/2004; 163/2004; 224/2004; 33/2005; 120/2005; 10/2006; 28/2006; 114/2006; 158/2006; 220/2006; 10/2007; 19/2007; 170/2007; 33/2008; 82/2008; 126/2008; 126/2008; 15/2009; 113/2009; 122/2009; 185/2009; 13/2010; 31/2010; 108/2010; 133/2010; 173/2011; 44/2012; 112/2012; 167/2012; 26/2013; 31/2013; 82/2013; 138/2013; 196/2013; 59/2014; 91/2014

PARTIE 3

Les médicaments ou les autres articles dont le nom ne figure pas à la partie 1 et les médicaments indiqués à la partie 2 qui sont administrés dans d'autres circonstances sont couverts à compter de la date de la demande d'indemnisation s'ils ont été approuvés et si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) ils sont administrés d'ordinaire uniquement aux malades hospitalisés et ils sont administrés à l'extérieur de l'hôpital;

b) ils ne sont généralement pas prescrits ou administrés au Manitoba, mais ils sont prescrits parce qu'ils sont nécessaires au traitement d'une affection, d'une déficience ou d'un état pathologique qui se rencontre rarement au Manitoba;

c) il est prouvé au ministre, notamment du point de vue thérapeutique et économique, et en fonction des critères qu'il fixe, que l'utilisation des médicaments ou des autres articles est nécessaire au traitement.

R.M. 109/95; 188/95; 61/96; 119/96; 243/96; 129/97; 161/97; 14/98; 67/98; 92/98; 178/98; 207/98; 46/99; 84/99; 106/99; 127/99; 157/99; 163/99; 172/99; 14/2000; 46/2000; 87/2000; 89/2000; 116/2000; 155/2000; 163/2000; 14/2001; 36/2001; 82/2001; 118/2001; 123/2001; 137/2001; 5/2002; 19/2002; 52/2002; 96/2002; 187/2002; 80/2003; 136/2003; 216/2003; 12/2004; 50/2004; 72/2004; 73/2004; 100/2004; 138/2004; 155/2004; 163/2004; 224/2004; 33/2005; 120/2005; 10/2006; 28/2006; 114/2006; 158/2006; 220/2006; 10/2007; 19/2007; 170/2007; 33/2008; 82/2008; 126/2008; 15/2009; 113/2009; 122/2009; 185/2009; 13/2010; 31/2010; 108/2010; 133/2010; 173/2011; 44/2012; 112/2012; 167/2012; 26/2013; 31/2013; 82/2013; 138/2013; 196/2013; 59/2014; 91/2014

SCHEDULE B

ANNEXE B

MONITORED DRUGS

MÉDICAMENTS CONTRÔLÉS

Definitions

1 The following definition applies in this Schedule.

"**ATC Code**" means the Anatomical Therapeutic Chemical classification system, published by the World Health Organization Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, as amended from time to time. (« code ATC »)

M.R. 51/2012

Monitored drugs

2 The specified drugs or classes of specified drugs included in any of the following are hereby designated as monitored drugs:

— Under the ATC Code N — Nervous System:

- N01A Anesthetics, General
- N02 Analgesics
- N05C Hypnotics and Sedatives
- N06B Psychostimulants, Agents Used for ADHD and Nootropics

M.R. 51/2012

Définition

1 La définition qui suit s'applique à la présente annexe.

« **code ATC** » Dernière version du système de classification anatomique, thérapeutique et chimique, publiée par le Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology de l'Organisation mondiale de la Santé. ("ATC Code")

R.M. 51/2012

Médicaments contrôlés

2 Sont désignés à titre de médicaments contrôlés les médicaments couverts et les catégories de médicaments couverts compris dans l'un ou l'autre des sous-groupes suivants :

code ATC — section N — système nerveux :

- N01A Anesthésiques généraux
- N02 Analgésiques
- N05C Hypnotiques et sédatifs
- N06B Psychostimulants, agents utilisés en cas de troubles d'hyperactivité et de manque d'attention et nootropiques

R.M. 51/2012

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba